

毒性本草类纂

主编 陈仁寿 吴昌国 唐德才

国家古籍整理出版资助项目

『十二五』国家重点图书



人民军医出版社

毒性本草类纂

DUXING BENCAO LEIZUAN

主 编 陈仁寿 吴昌国 唐德才

副主编 (以姓氏笔画为序)

王旭光 吴承艳 张稚鲲 范欣生 杭爱武

顾宁一 郭瑞华

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 尉 王全利 王瑞平 卞 正 卞雅莉

邓 勇 史 雪 刘小兵 刘丹丹 许 可

苏文文 杜晓娜 李 芸 李 群 李 缨

李传行 李冰冰 李军伟 李晓琴 杨 环

杨 萌 宋洪伟 张畅斌 陈晓明 陈菁菁

范嘉祺 季丹丹 周 卫 周 健 周秩群

房玉玲 赵 凡 姚惠萍 殷沈华 栾世杰

高 雨 黄亚俊 曹 宜 蒋辰雪 韩福康

程 茜 蔡 云 臧文华 颜纯淳



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京



|| 内容提要 ||

本书是一部毒性本草类文献著作，收录历代文献中“大毒、有毒、小毒”的毒性药物共 196 味，以药物为纲，按药名、药性、功能、主治、配伍、用法用量、使用注意、附方、药论、中毒症状与解毒方法等为类别进行编排、校注、鉴评。本书适合中医药科研、临床、教学工作者阅读，特别是对于认识和使用有毒中药具有重要参考价值。





|| 前 言 ||

“是药三分毒”。中医历来重视药物之毒性，一方面防止毒性损害人体，以保障中药使用的安生性，一方面中药之“毒性”正是中药性味的主要内涵之一，如何巧妙地利用好中药的“毒性”，以达到治病的目的，也是中药研究的重要内容之一。

在临床中，一些具有小毒、有毒或大毒的中药属于常用中药，如附子、乌头、关木通、马钱子、大黄、生半夏、天南星、甘遂、大戟、商陆、芫花、雄黄等。在海内外对中医的认可度越来越高，中药治病的受众者越来越多的情况下，中药的安全性成为摆在我们面前的一项重大课题。目前关于中药毒副反应的临床报道时有出现，引起了人们对中药安全性的质疑，甚至影响了对中医药行业的信任程度。为了确定中药的安全性，近年来关于中药“毒性”的实验研究正在广泛开展，中药制剂的临床试验也得到了高度重视。然而，对中药的认识还是离不开传统医药文献的记载。事实上，中医历代十分强调对中药毒性的认识，在古代文献中，有毒中药的品种、药性（特别是毒性）、用法用量（特别是剂量）、配伍减毒均有严格的要求，只是现代的中医药工作者往往对此忽视。

近年来，国内外关于毒性中药处理方法争议较大，但为了避免争议，对于影响较大的毒性药物往往一禁了之，如前几年因为龙胆泻肝丸出现肾毒性的大量报道，是因为其中的关木通含有具肾毒性的马兜铃酸，后来自 2005 年版国家药典起即将含有马兜铃酸的关木通、青木香、广防己一概去掉；新加坡曾因为有报道服用黄连而出现小儿黄疸，导致该国卫生部下令一律禁用黄连。这些情况都是由于对中药毒性的认识不够和不充分而导致，其实只要重视毒性中药的毒性分级（大毒、有毒和小毒）、配伍减毒、用法用量等，即使有毒药物也能安全地发挥较好的临床疗效。

鉴于目前对中药毒性的认识不够全面，有关毒性药物的文献著作也不是很多，因此编纂一部内容齐全、形式新颖的全面反映毒性本草内容的著作显得十分必要，为此笔者与人民军医出版社共同申报了 2011 年国家古籍出版资助项目《毒性本草类纂》，获得立项。

通过多次论证和召开编委会工作会议，在广泛听取意见的基础上确定了编纂计划、编

写体例和编写要求。本书主要选取 1911 年前古代医药文献中的毒性药物的内容进行整理，以药物为纲，按药名、药性、功能、主治、应用、用法用量、炮制、附方、药论、中毒症状、解毒方法等进行分类编排。以最佳文献版本为底本，参考其他版本或有关文献的相关内容，进行校勘，特别是对其中的疑难字词和有异议的内容进行校勘注解，并在每一味药物之后进行适当评价，以诠释毒性药物的源流、注意事项及现代认识。

书中收录的为历代文献中“大毒、有毒、小毒”的药物和现代有中毒报道的传统中药，如附子、乌头、天雄、巴豆、大黄、雷公藤、雄黄、马钱子、闹羊花、升药、轻粉等，以及肉苁蓉、补骨脂、白附子、苦杏仁、桃仁等。二者或有交叉，但以古代文献记录和现代临床中毒报道为收入标准。

本书是一部毒性本草类文献著作，适合中医药科研、临床、教学工作者阅读，特别是对于认识和使用有毒中药具有重要参考价值。

《毒性本草类纂》编委会

2012 年 1 月



|| 凡 例 ||

一、本书收录古代文献中“大毒、有毒、小毒”药性的药物及现代有中毒报道的传统中药共 196 味。

二、各项目收载内容主要为 1911 年前包括本草、方书、医经、医案等医药文献中的有关毒性药物的药性、功能、主治、应用、用法用量、炮制、附方、药论、中毒症状、解毒方法等。

三、每一项目中文献按成书年代排列，前后文献重复较多者，保留成书年代较前的著作内容，删除后世著作的重复内容，如后世内容论述精彩者可“删前留后”。

四、原文均需标注出处，出处标注至卷数及门类。

五、凡引用文献均选自珍本、善本，原则上以《中国中医古籍总目》中收载的第一版本为主要底本，适当参考一些古籍影印本和质量较好的校勘本。

六、全书文字为规范化简体字本，异体字、避讳字、通借字和俗字等予以迳改。部分疑难字词和有异义的内容进行校勘和注解。

七、每一味药设正名、药性、功能主治、配伍应用、禁忌、炮制、使用方法、方选、解毒、药论、集解、按语。

1. 正名 即条目名。以《中华人民共和国药典》《中华本草》《中药大辞典》（第 2 版）书中的药物名称为本书正名，其他别名在按语中叙述。药名出处为始载本草书名的全称。

2. 药性 主要收录有关药物四气五味、归经、毒性、升降沉浮、气味厚薄、强弱、趋向等药性内容。

3. 功能主治 主要收录有关药物的功能及主治（适应证）等方面的内容。

4. 配伍应用 主要收录有关该药的七情配伍、药对使用、与其他药同用等配伍后增加疗效或扩大疗效的内容。

5. 炮制 主要收录药物的炮制加工、调剂制作等方面的内容。

6. 禁忌 主要收录药物的配伍禁忌、使用禁忌、妊娠禁忌等方面的内容。

7. 方选 收录古代文献中以该药为主要药物的单方或复方，复方以五味药以内为主，一些以该药为主药的五味药组成以上的复方可适当收录。方名附在书名之后。同一种病证收方最多2～3首。

8. 解毒 主要收录各种解毒方法，主要为使用其他药物进行解毒的内容。

9. 药论 主要收录对药物的药性、功能主治、配伍、禁忌、使用注意等方面的有关原理分析等文献的阐述性文字。

10. 集解 主要收录有关药物资源、品种、产地、采收、史料等方面的内容。

以上可以缺项，少量内容并存或分界不清者，根据主要内容录于相关项目中。

11. 按语 用主文的形式论述药物的别名、释名、历史演变、来源、产地、炮制、药性、功能主治、临床应用、中毒原理、解毒方法等现代认识。



目 录

二 画

八角莲（鬼臼）..... 1

三 画

干漆..... 9
土鳖虫（虻虫）..... 30
大黄..... 40
大戟..... 68
大风子..... 88
山豆根..... 95
山慈菇..... 106
千金子（续随子）..... 115
川乌..... 124
川楝子..... 169
及己..... 192
女娄..... 195
马勃..... 200
马钱子（番木鳖）..... 207
马鞭草..... 220

四 画

天雄..... 225

天仙子（莨菪子）..... 234
天花粉（栝蒌根）..... 241
天南星..... 254
无患子（皮）..... 268
云实..... 271
木通..... 274
木鳖子..... 294
五灵脂..... 302
五倍子..... 310
牛黄..... 320
毛茛..... 330
升麻..... 333
乌柏木（乌柏根皮）..... 345
乌梢蛇..... 350
巴豆..... 355
水银..... 368

五 画

甘遂..... 379
石南（石楠）..... 388
石蒜..... 394
石龙子（蜥蜴）..... 397
石龙芮..... 402
石榴皮..... 407



龙葵·····	418
仙茅·····	422
白芷·····	431
白英（白毛藤）·····	454
白矾（矾石）·····	457
白果·····	474
白头翁·····	481
白花蛇·····	488
白附子（关白附）·····	500
白降丹（降丹、降药）·····	513
瓜蒂·····	519
半夏·····	527

六 画

百部·····	551
肉桂·····	562
朱砂·····	576
朱砂莲·····	609
延胡索·····	611
全蝎·····	627
羊蹄·····	650
红娘子（樗鸡）·····	654

七 画

芫花·····	659
芫青·····	668
花椒·····	670
苍耳·····	696
苍耳子·····	700
芦荟·····	705
杏仁·····	711
吴茱萸·····	721
牡鼠粪（两头尖）·····	731

皂荚·····	734
补骨脂·····	743
附子·····	761

八 画

青藤·····	775
青木香·····	777
青鱼胆·····	780
苦参·····	782
苦楝子·····	793
苦楝皮·····	795
茅膏菜·····	798
松萝·····	799
鸢尾·····	803
使君子·····	805
金箔·····	810
金精石·····	815
金钱白花蛇·····	818
乳香·····	819
鱼腥草·····	828
闹羊花·····	832
油桐子·····	837
空青·····	839
细辛·····	843
贯众·····	853
虎耳草·····	859

九 画

尧花·····	862
草乌·····	866
茵芋·····	887
荭草·····	892
荭草花·····	895

相思子·····	896
砒石·····	898
砒霜·····	904
牵牛子·····	907
轻粉·····	915
鸦片·····	924
鸦胆子·····	928
虻虫·····	933
钩吻·····	940
鬼箭羽·····	945
胆矾·····	952
独一味·····	960
急性子·····	961
洋金花·····	965
穿山甲·····	968
扁青·····	975
重楼(蚤休)·····	978
威灵仙·····	984

十 画

莽草·····	991
桃仁·····	997
铅·····	1006
铅丹·····	1012
铅粉·····	1023
铅霜·····	1032
徐长卿·····	1040
狼毒·····	1044
拳参·····	1050
烟草·····	1057
消石·····	1064
海芋·····	1088
海红豆·····	1090

十一画

黄矾·····	1092
黄藤·····	1095
黄药子·····	1097
黄颌蛇·····	1103
豉虫·····	1104
硃砂·····	1106
常山·····	1116
野芋·····	1126
野烟·····	1128
蚺蛇肉·····	1130
蚺蛇胆·····	1133
蚺蛇膏·····	1136
蛇莓·····	1138
蛇床子·····	1141
铜绿·····	1149
银朱·····	1153
麻黄·····	1161
商陆·····	1176
密陀僧·····	1184
密蒙花·····	1194
绿青·····	1199

十二画

斑蝥·····	1202
博落回·····	1213
葛上亭长·····	1215
葶苈子·····	1218
萱草根·····	1228
棉花子·····	1231
硫黄·····	1234
紫堇·····	1249

八角莲（鬼臼）

（《植物名实图考》）

【药性】

《神农本草经·下品》

味辛，温。

《名医别录·卷三》

微温，有毒。

《本草经集注·卷五》

白而味甘，温，有毒。

《本草品汇精要·卷十四》

色白。味辛，性微温，散。气之厚者，阳也。臭^①朽^②。

《本草蒙筌·卷三》

味辛，气微温。有毒。

《本草从新·卷九》

苦、辛，温，毒烈。

【功能主治】

《神农本草经·下品》

主杀蛊毒鬼疰精物，辟恶气不祥，逐邪，解百毒。

《名医别录·卷三》

疗咳嗽喉结，风邪，烦惑，失魄，妄见，去目中肤翳，杀大毒。

《本草经集注·卷五》

治风邪鬼疰蛊毒。

《药性论·卷二》

主尸疰、殭殍^③劳疾，传尸瘦疾，主辟邪气，逐鬼。

《太平圣惠方·卷二》

堕胎。

① 臭（xiù）：同嗅，气味。

② 朽：腐烂的味道。

③ 殭殍（yè dié）：骨蒸、传尸之异名，或指传尸之初起不甚者。



《本草蒙筌·卷三》

辟瘟疫恶气不祥，杀蛊毒鬼疰精物。
去目赤肤翳，疗喉结风邪。

《本草纲目·卷十七》

下死胎，治邪疰，痈疽，蛇毒，射工毒。

《万病回春·卷一》

辟瘟除恶，杀虫驱蛊，风邪烦惑。

《本草崇原·卷下》

主治杀虫毒，鬼疰精物，辟恶气，不祥，
逐邪，解百毒。

《本经逢原·卷二》

其治邪痈、阴疽、蛇毒用之。

《绛雪园古方选注·卷十七》

主治鬼疰，百毒，下死胎如神。

《本草从新·卷九》

治麻痹风毒，打扑瘀血停积。

《本草纲目拾遗·卷五》

汪连仕《草药方》：……消一切毒，力
能软坚透脓。

《神农本草经赞·卷三》

啖三白可辟谷也。

《植物名实图考·卷二十四》

下死胎，治射工中人，其力猛峻可知。

【配伍应用】

《本草经疏·卷十一》

鬼臼得丹砂、雄黄、云母、生犀角、丹参、
远志、射干、百部、菖蒲、天门冬，能治

一切怪惑不祥，及诸尸疰、传尸，阴邪为
祟诸异证。

【禁忌】

《名医别录·卷三》

畏垣衣。

《本草经疏·卷十一》

凡病属阳，阳盛热极有似鬼魅为祟，
及烦惑失魂妄见者，不可用。

《本草品汇精要·卷四十二》

妊娠服禁。

《本草从新·卷九》

其气强悍，能开通壅塞，痛淋立止，
虚人慎之。

【炮制】

《名医别录·卷三》

不入汤。

《本草经集注·卷一》

除根毛。

《本草图经·卷九》

七月、八月采根，曝干用。

《本草蒙筌·卷三》

不入汤煎，惟作散用。

【方选】

《小品方·卷十》

射公中人方。取鬼臼目叶一把，纳苦
酒中，沾湿之竟，熟捣绞取汁，服一升，日三。



《备急千金要方·卷九》

雄黄散 辟温气。雄黄五两，朱砂、菖蒲、鬼臼各二两。上四味，治下筛，以涂五心^①、额上、鼻、人中及耳门。

《备急千金要方·卷二十五》

治射工中人寒热，或发疮在一处，有异于常者。方取鬼臼叶一把，纳苦酒渍之，熟捣，绞取汁，服一升，日三。

《太平圣惠方·卷十六》

鬼箭羽丸 治时气瘴疫，辟除毒气。鬼箭羽一两，鬼臼一两（去毛），赤小豆半分（合，炒热），朱砂半两（细研，水飞过），雄黄半两（细研，水飞过）。上件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如豇豆大。如已患者，手掌中水调一丸，涂于口鼻上。又于空腹，温水下一丸。如未染疾者，但涂口鼻。兼以皂囊盛一丸系肘后，亦宜时烧一丸。忌羊血。

《太平圣惠方·卷七十二》

枳壳散 治妇人痔疾，痒痛不可忍。枳壳二两，木香半两，鬼箭羽一（二）两，鬼臼一两，槐子仁二两。上件药，粗捣。以慢火炒令热，用青绢包裹，看冷暖熨之。

《太平圣惠方·卷八十八》

鬼臼丸 治小儿尸疰，劳瘦，或时寒热。鬼臼半两（去毛），川升麻三分，麝香一钱（细研），柴胡一两（去苗）。上件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大。每服以暖水（酒）下十丸，日三服。更量儿大小，分减服之。

《太平圣惠方·卷九十二》

治小儿痔疾，下部痒闷。枳实一两（麸炒微黄），鬼箭羽、木香、鬼臼，以上各一两。上件药，捣粗罗为散。以头醋和匀，炒令热，用青布裹熨，日二用之。

《圣济总录·卷三十三》

赤小豆丸 治辟时行瘟疫瘴疔，令不相染。赤小豆二两，鬼臼、鬼箭羽、丹砂（研）、雄黄（醋煮研）各一两。上五味，捣研为末，再同研匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服五丸，米饮下，不计时候。

雄黄丸 治温病病转相传染。雄黄（醋煮研）、鬼臼、鬼箭羽、赤小豆、丹参各一两。上五味，捣研为末，再同研匀，炼蜜和丸，如小豆大，每服五丸，温水下。

《圣济总录·卷三十七》

豫固丸 治岭南诸瘴。丹砂、雄黄各一两（并水飞，过令干），鬼臼半两（为末），阿魏一分（法酒半升，熬成膏）。上四味，再研匀，阿魏膏和丸，如鸡头大，绯绢袋贮十丸，常执手中频嗅，瘴气内行不着人，遇瘴病者，并华水嚼下三丸，五服可瘥。

《圣济总录·卷六十一》

病人身面黑黄，口唇两颊上有青脉起。出于口角者，十无一生。亦有脉息沉细。吃食不妨，身如土色。宜先烙口中黑脉，次烙百会穴。又烙玉泉、足阳明穴、章门、心俞、下廉，不瘥宜服鬼臼汁方。生鬼臼一两，上一味，捣绞取汁一小盏，服之即瘥。如无生鬼臼，即用干者捣罗为末。每服二钱匕，新汲水调下不拘时。

① 五心：两手心、两脚心及胸心。



《圣济总录·卷一百》

雄黄丸 治五尸注，百毒恶气，飞尸客忤，无所不治。雄黄（研）、鬼臼（去毛炙）、莽草各二两，蜈蚣（去头、足，炙）一枚，巴豆（去皮心膜炒研出油尽）六十枚。上五味，捣研为末，炼蜜丸如小豆大，每服一丸至二丸，米饮下得利即愈。

《圣济总录·卷一百四十七》

五蛊黄丸 治食蟹中毒，烦乱欲死者，服五蛊黄丸，得吐下皆瘥方。雄黄一两（以油从旦至夜煎之，取出别研），莽草（取叶水洗，晒干，炙）一两，蜈蚣（赤足大者）一条（炙令匀），鬼臼一两，巴豆二十枚（去皮心，炒令黄）。上五味，捣罗三味为末，别研巴豆、雄黄和匀，炼蜜为丸，如小豆大，瓷器中盛，每服三丸至五丸，米饮下。

雄黄丸 治蛊毒。雄黄（研）、丹砂各半两，藜芦（去芦头，炙）、鬼臼、巴豆（去皮、心、膜，研去油）各一分。上五味，捣罗为末，炼蜜丸如小豆大，每服三丸，干姜汤下，逐下恶物并蛊毒为效。

《圣济总录·卷一百四十八》

雄黄丸 治百虫啗，毒气内攻。雄黄（研）、朱砂（研）各半两，藜芦（去苗微炒）、巴豆（去皮心研去油）、鬼臼（去须）三味各一分。上五味，捣研为末，炼蜜和丸，如大豆大，每服三丸，空腹煎干姜汤下，当转出恶物并虫等，当烦闷后，以鸭为羹食之。

《严氏济生方·卷五》

丹砂丸 治蛊毒。雄黄（别研）、朱砂（别研）各半两，鬼臼、巴豆（去皮心油）各一两。

上为细末，炼蜜为丸，如大豆大，每服三丸，空心，煎干姜汤送下，当转下恶物并蛊毒等。当烦闷，后以鸭为羹食之。

《妇人良方·卷十七》

一字神散 治子死胎不下中，胞破不生。此方累有效，救人几万数。鬼臼不拘多少，黄色者去毛，碾为末，以手指捻之如粉、极细为度。每服二钱。用无灰酒一盏，同煎至八分，通口服，立生如神。此药用不罗，只碾令极细。

《本草纲目拾遗·卷五》

治疗肿痈疽。以根或醋酒磨涂叶，贴肿痈能消。

治蛇咬。祝氏效方。用独叶一枝花，生溪滩浮土上，根如鼠粪，用根，口嚼搽疮上。

《串雅外编·卷一》

李子建杀鬼丸 辟瘟疫，杀一切鬼魅魍魉。藜藿一两，虎头一两五钱，雄黄、鬼臼、天雄、皂荚、芫荽各五钱。上为末，蜜丸如皂子大。热病时气烧一丸安床头。

《串雅外编·卷四》

骆病。鬼臼、穿山甲、滑石、木通各二两。上为末，小油半斤，温水三升，饥灌之。

《神农本草经赞·卷三》

煮面皮，裹一白吞之，数日不饥。

【药论】

《本草经疏·卷十一》

鬼臼得地之金气，而复阴沉，是以辛温有毒，乃阴草中之散结辟邪者也。故能



入阴分以辟不祥，及诸蛊毒，鬼疰精物，尸疰传尸，烦惑，失魂妄见。然此诸病，何莫非阴邪尸鬼之所为？凡物以类相从，故惟阴草之异品，乃能治乎阴鬼之贼害也。其去目中浮翳，及咳嗽喉结风邪，则辛散之功耳。其药有二种，味甘者胜，苦者稍劣。

《本经逢原·卷二》

以毒攻毒之猛药。

【集解】

《神农本草经·下品》

一名爵犀，一名马目毒公，一名九臼。生山谷。

《名医别录·卷三》

一名天臼，一名解毒。生九真山谷及宛胸。二月、八月采根。

《本草经集注·卷五》

九臼相连，有毛者良，一名九臼。生山谷，八月采，阴干。又似钩吻。今马目毒公如黄精，根臼处似马眼而柔润；鬼臼似射干、术辈。有两种：出钱塘近道者，味甘，上有丛毛，最胜；出会稽、吴兴者，乃大，味苦，无从毛，不如，略乃相似而乖异毒公。今方家多用鬼臼，少用毒公，不知此那复顿尔乖越也。

《新修本草·卷十一》

此药生深山岩石之阴。叶如蓖麻、重楼辈。生一茎，茎端一叶，亦有两歧者。年长一茎，茎枯为一臼。假令生来二十年，则有二十臼，岂惟九臼耶？根肉皮须并似射干。今俗用皆是射干，及江南别送一物，

非真者。今荆州当阳县、硤州远安县、襄州荆山县山中并有之，极难得也。

《本草图经·卷九》

生九真山谷及冤句，今江宁府、滁、舒、商、齐、杭、襄、峡州、荆门军亦有之，多生深山岩石之阴。叶似蓖麻、重楼辈；初生一茎，茎端一叶，亦有两歧者，年长一茎，茎枯为一臼，二十年则二十臼也；花生茎间，赤色，三月开，后结实，根肉皮须，并似射干，俗用皆是射干，当细别之。七月、八月采根，曝干用。古方治五尸、鬼疰、百毒、恶气方用之。一说鬼臼生深山阴地，叶六出或五出，如雁掌。茎端一叶如伞，盖旦时东向，及暮则西倾，盖随日出没也。花红紫如荔枝，正在叶下，常为叶所蔽，未常见日。一年生一叶，既枯则为一臼，及八九年则八九臼矣。然一年一臼生而臼腐，盖陈新相易也，故俗又名曰害母草。如芋魁、乌头辈亦然。新苗生则旧苗死，前年之魁腐矣。而本草注谓全似射干，今射干体状虽相似，然臼形浅薄，大异鬼臼。鬼臼如八、九天南星侧比相叠，而色理正如射干。要者，当使人求苗采之，市中不复有也。

《本草纲目·卷十七》

鬼臼根如天南星相叠之状，故市人通谓小者为南星，大者为鬼臼，殊为谬误。按《黄山谷集》云：唐婆镜叶底开花，俗名羞天花，即鬼臼也。岁生一臼，满十二岁，则可为药。今方家乃以鬼灯檠为鬼臼，误矣。又郑樵《通志》云：鬼臼叶如小荷，形如鸟掌，年长一茎，茎枯则根为一臼，亦名八角盘，以其叶似之也。据此二说，则似是今人所谓独脚莲者也。又名山荷叶、独荷



草、旱荷叶、八角镜。南方处处深山阴密处有之，北方惟龙门山、王屋山有之。一茎独上，茎生叶心而中空。一茎七叶，圆如初生小荷叶，面青背紫，揉其叶作瓜李香。开花在叶下，亦有无花者。其根全似苍术、紫河车。丹炉家采根制三黄、砂、汞。或云其叶八角者更灵。或云其根与紫河车一样，但以白色者为河车，赤色者为鬼臼，恐亦不然。而《庚辛玉册》谓：蚤休阳草，旱荷阴草，亦有分别。陶弘景以马目毒公与鬼臼为二物，殊不知正是一物而有二种也。又唐·独孤滔《丹房镜源》云：术律草有二种，根皆似南星，赤茎直上，茎端生叶。一种叶凡七瓣，一种叶作数层。叶似蓖麻，面青背紫而有细毛。叶下附茎开一花，状如铃铎倒垂，青白色，黄蕊中空，结黄子。风吹不动，无风自摇。可制砂汞。按此即鬼臼之二种也。其说形状甚明。

《玉芝堂杂荟·卷三十五》

绥宁有草，名八角莲，可以服蛇。谚云：识得八角莲，可与蛇共眠。（引自《湖广通志》）

《本草纲目拾遗·卷五》

《稗史》：鄱阳山间生一种草，始萌芽时，便以莲蓬，俗呼为独脚连。移植于居宅隙地及园圃中，蛇虺不敢过其下。王季光宅后榛莽丛中有蛇穴，常出为人害，乃种此草数本于穴外，自是其患不作。至暑月间，穴内臭甚，使园丁掘土访求，得死蛇十数，盖为草气所熏溃也。又一小蛇来到草傍，立化为水矣。

按：《纲目》，鬼臼亦名独脚连，无治疗之说，至集解下注形状，又小有异同，故仍为补之。

庚戌，予在临安，有医士盛天然言其地古城与余杭接界，产独叶花，生山坑，不见天日，其形一叶，中含红花一朵，俨如莲花状。其花从叶心透出，下有根，作独蒜状。其花叶闻人声，辄缩入根内不可见，遇之者记其处掘之，亦止有根，其叶与花，虽剖根觅之，亦无形迹。倘得之者，不论何等毒蛇咬，以根擦摩，蛇毒即尽。如有误服蛇变鳖者，以少许煎汤服之，即瘥。并能解一切毒虫咬螫，一切虫毒草木毒，咽喉一十八症，皆验如神。凡人鼻发红色，生疔瘤^① 焮痒异常，名曰痧虫食鼻。以此根磨涂，立愈。此乃天生神物，有山行遇之者，不论持何物，先掷之以镇住，然后再掘，即不能遁形。凡生独叶花地，四围约尺许无草，其上不可手取，亦勿以铁刀取，须用竹刀掘取，则不伤根。盖此草，蛇最喜蟠其旁，凡蛇咬人，亦中人毒，必退壳，若觅此物，卧其傍一宿，则人毒解，可免退壳之患。大毒蛇都喜蟠其根旁，故土最毒。近人手则手烂，然得其根，反能解百种大恶蛇毒，丐者觅此，以为得宝云。

《植物名实图考·卷二十四》

江西、湖南山中多有，人家亦种之，通呼为独角莲。其叶有角不圆，或曰八角莲。高至四五尺，就茎开花，红紫娇嫩，下垂成簇，外科蓄之。

【按语】

八角莲，其名始见于《植物名实图考》，以鬼臼之名始载于《神农本草经》，列入下

^① 疔瘤 (lěi): 泛指疹样小粒块。

品。又名爵犀、马目毒公、九白（《神农本草经》），天白、解毒（《名医别录》），害母草（《本草图经》），独脚莲、独花草（《土宿本草》），羞天花、术律草、琼田草、山荷叶、旱荷、八角盘（《本草纲目》），金星八角、独叶一枝花（《汪连仕草药方》），八角连（《本草纲目拾遗》）等。

《名医别录》载：“生九真（今湖北汉阳）山谷及宛胸（今山东菏泽）。”《本草图经》曰：“今江宁府、滁、舒、商、齐、杭、襄、峡州、荆门军亦有之。”据此八角莲产于今江苏、安徽、陕西、山东、浙江杭州及湖北襄阳、宜昌等地。

《新修本草》载：“叶如蓖麻、重楼辈。生一茎，茎端一叶，亦有两歧者。”《本草图经》曰：“鬼白生深山阴地，叶六出或五出，如雁掌。茎端一叶如伞，盖旦时东向，及暮则西倾，盖随日出没也。花红紫如荔枝，正在叶下，常为叶所蔽，未常见日。”《本草纲目》云：“一茎独上，茎生叶心而中空。一茎七叶，圆如初生小荷叶，面青背紫，揉其叶作瓜李香。开花在叶下，亦有无花者。其根全似苍术、紫河车。”《本草纲目拾遗》载：“生山坑，不见天日，其形一叶，中含红花一朵，俨如莲花状。其花从叶心透出，下有根，作独蒜状。”《植物名实图考》载：“其叶有角不圆，或曰八角莲。高至四五尺，就茎开花，红紫娇嫩，下垂成簇。”据此考证，其原植物为小檗科八角莲属八角莲。《本草图经》舒州鬼白图和《植物名实图考》鬼白图，均为本种。

现八角莲药材商品为小檗科八角莲属植物八角莲的根及根茎的加工品，其同科属植物六角莲和川八角莲亦作八角莲入药，

功效相同。生长于海拔 300 ~ 2200m 的山坡林下阴湿处，分布于浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。于 9 月至 11 月采收，除去须根，洗净泥沙，晒干或鲜用。

综合历代文献所述，八角莲味苦、辛，温，有毒。功能化痰解毒，祛瘀散结。八角莲“乃阴草中之散结辟邪者”，主治咳嗽，咽喉肿痛，无名肿毒，毒蛇咬伤，跌打损伤，风湿痹痛。

内服：煎汤，3 ~ 12g；磨汁，或入丸、散。外用：适量，磨汁或浸醋、酒涂搽；捣烂敷或研末调敷。孕妇慎用。

八角莲的毒性主要由鬼臼毒素引起，一般为过量服用或误食时出现。鬼臼毒素对正常细胞的微管蛋白具有毒性。中毒症状主要以神经系统、消化系统、循环系统表现为主，即中枢神经系统先兴奋后抑制状态；刺激胃肠道增强蠕动，肠道吸收功能障碍；心血管系统的刺激性损伤作用。从八角莲全草中分离的一种树脂，兔服后引起腹泻，猫用后致呕吐、腹泻及死亡。1980 年浙江省曾有误食云南八角莲中毒死亡报道，患者误将云南八角莲当作竹节三七研粉口服，中毒剂量为 4g。中毒症状：口苦舌麻，喉部烧灼感，胸闷，恶心，呕吐，腹泻，大汗淋漓，瞳孔缩小，渐入昏迷，最终因心力衰竭、呼吸麻痹而死亡。

八角莲中毒预防主要注意两个方面：一是严格控制剂量；二是使用时注意鉴别品种。如出现中毒症状应当及时对症处理。救治措施：①可用 1% ~ 2% 鞣酸溶液或 0.2% 高锰酸钾溶液洗胃。静脉大量补液及维生素