

活人慈航

女科細目

皮料細目

宋史

卷一百一十五

禮集下

家藏袖珍活人慈航女科細目目錄

婦人雜病

已下金匱

妊娠

產後

論經主衝任二脉

已下調經

論心脾為經血之主

論脾胃生血

論經不調由風邪客於胞中

論經不調有三

論三月一來為居經

論師尼寡婦異乎妻妾之治

論調經當抑氣

論調經先去病

論調經大法

論經候愆期

論經水異色

不月期而經先行

經過期後行

一月兩行

數月而經一行

經或前

經水多少

經水紫

卷四

經病疼痛

月水不利

月水不斷

過期不止

經病發熱

往來寒熱

熱入血室

調經脉法

附調經總論

經閉

血崩

帶下

求子

候胎

惡阻

胎動不安

妊娠經來

胎漏下血

子煩

心腹脹滿

即子懸

妊娠心痛

妊娠心腹痛

胎水腫滿

即子腫子滿子氣

妊娠傷寒

妊娠瘧疾

妊娠中風

子瘖子鳴

小便不通

逐月養胎

產期

臨產坐草法

胎死催生

胞衣不下

惡露不下

產後暴崩

產後腹痛

產後腰痛

產後頭痛

產後乍寒乍熱似瘧

子癰

大小便閉

子淋

防胎自墮

鬼胎

產後將調法

血暈

惡露不絕

產後心痛

產後脇痛

遍身疼痛

產後發熱

產後瘧疾



產後腹滿脹悶嘔吐

呃逆

產後鼻衄

乳少

產後心口

產後氣喘

產後泄瀉

吹乳 乳癰

家藏袖珍活人慈航第陸卷

禮集下

福建汀州府長汀縣監生鄭

諱

玉成字紹宗

號

直方纂輯

邑庠生

男

汝恭謹鈔

女科細目

金匱要畧

婦人雜病

婦人之病因虛積冷結氣為諸水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結繞臍寒疝或二脇疼痛與臟相連或結熱中痛在關元脉數無瘡肌若魚鱗時著男子非止女身在下多經候不勻令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脰疼煩奄忽眩冒狀如厥顛或有憂慘悲傷多嘆

非有鬼神此皆帶下久則羸瘦肢虛多寒三十六病千變

萬端審脉陰陽虛實緊弦行其針藥治危得安其雖同病

脉各異源子當辨記勿謂不然此帶下非白帶也并經不調
紫脉三寒弦脉主氣

婦人咽中如有炙燔半夏厚朴湯主之

婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數公伸甘麥大棗湯

主之

問曰婦人年五十所病下血數十日不止暮即發熱少腹裏

急腹滿手掌煩熱脣口乾燥何也師曰此病屬帶下何以

故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其症脣口乾燥

故知之當以溫經湯主之亦主婦人少腹寒久不受胎

兼取崩中去血或月水來過多及至期不來

帶下經水不利少腹滿痛經一月不見者土梔根散主之旋

覆花湯亦主之

口脉弦而大弦則為減大則為亢減則為寒亢則為虛實
虛相搏此名曰革婦人則半產漏下

婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴產後者此為水與血
俱結於血室也大黃甘遂湯主之

婦人中風七八日來續寒熱發作有時經水適斷此為熱入
血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者
此為熱入血室治之勿犯胃氣及上二焦必自愈

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脉遲身涼
和胸脇滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門
隨其實而瀉之

陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨

其實而瀉之澀然汗出則愈

婦人經水不利下抵當湯主之

婦人經水閉而不利臟堅癖不去中自乾血下白物礬石丸主之

婦人六十二種風及腹中血氣刺痛用紅藍花酒主之

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

問曰婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主之

忍尿所致凡婦人病小便不通均宜此丸

婦人陰寒溫中坐藥蛇床子散主之

婦人腹中痛小建中湯主之

少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之胃氣下泄陰虛而正氣亡

人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

妊娠

師曰婦人得平脉陰脉小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠於法六十日當有此症設有醫治逆者卻一月加吐下者絕之宜桂枝湯主之

婦人宿有瘕病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者為瘕瘕害妊娠六月動者前三月經水利時胎也下血者後斷三月衄也所以血不足者其瘕不去故也當下其瘕桂枝茯苓丸主之

婦人懷妊六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子臟開故也當以附子湯溫其臟

師曰婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠

下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

婦人懷妊腹中疼痛當歸芍藥散主之

妊娠嘔吐不止乾姜人參半夏丸主之

妊娠有水氣身重小便不利瀝澼惡寒起則頭眩葵子茯苓

散主之

婦人妊娠宜常服當歸散主之

妊娠養胎白朮散主之

婦人懷胎腹滿不得小便從腰以下重如有水氣狀小便微

利則愈

宜腎氣丸為是

產後

問曰新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱胃三者大便難

何謂也師曰新產血虛多汗亡血風攻令病瘕亡血復

汗寒多故令病瘕亡血

產後冒其脉微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者
血虛而厥厥而冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽
上出故頭汗出所以產婦喜汗者亡陰血虛陽氣獨盛故
當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之病解
能食七八日更發熱者此為胃實大承氣湯主之

產後腹中疼痛當歸生薑羊肉湯主之并治腹中寒疝虛勞
不足

產後煩滿不得臥腹痛枳實芍藥散主之

師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中
有乾血著臍下宜下瘀血湯主之亦王經水不利

產後七八日無太陽症少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁
發熱切脉微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則譫語
至夜則愈宜大承氣湯主之熱在裏結在膀胱也

產後風續之數十日不愈頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦症續在耳可與陽旦湯

產後中風病瘧發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之
產後下利陰虛極白頭翁湯加甘草阿膠主之

方

半夏厚朴湯

半夏三錢厚朴三錢茯苓三錢生姜三錢紫蘇葉二錢水煎溫服

甘草小麥大棗湯

甘草三錢小麥二升大棗十五枚水煎服 亦補脾氣

溫經湯

吳茱萸三錢人參 桂枝 丹皮

阿膠 煎服

土

土梔根 白芍 桂枝 麝香各為細末酒調服二錢

旋覆花湯

旋覆花三錢 葱白切 新絳或紅花代 水煎服

大黃甘遂湯

大黃四兩 甘遂一分 阿膠一分 水煎頓服之其血當下

礬石丸

枯白礬三分 杏仁一分 為末蜜丸棗核大內臍中劇者再內之

紅藍花酒

紅藍花即紅花 用酒煎服未去再服

腎氣丸

乾地黄四兩 肉蓯蓉四兩 山茱萸四兩 澤瀉三兩 茯苓三兩 丹皮三兩

肉桂二兩 附子二兩 為末蜜丸酒下十五丸加至二

日再服丸梧子大

蛇床子散

蛇床子

為末以白粉少許和合相得如棗大綿包內之

自然溫

狼牙湯

狼牙

四兩水煎洗瀝陰中日四次

訶梨勒丸

訶梨勒

陳皮 厚朴 各為末蜜丸梧子大酒服二十丸

桂枝茯苓丸

桂枝

桃仁 芍藥 丹皮 茯苓 等分

為末蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

芎歸膠艾湯

川芎

阿膠 甘草 各二兩 艾葉 當歸 各三兩 芍藥 四兩

乾地黄 各二兩 用酒煎服