

○○第三伯九六方○六氣煎

治痘瘡氣虛痒或不起發不紅活以及倒陷乾枯或寒戰咬牙凡表寒者無論首尾以此方主之

黃蓍

四錢
酒炒

黨參

四兩
酒炒

淮藥

三錢
炒

當歸

二錢
土炒

玉桂

多去粗皮淨用
八分研末冲服

炙草

錢半

如發熱不解或尙未見點者入柴胡一錢以疏表再入防風一錢以佐之○如見點後而痘不起發或起而不貫或貫而漿薄加入乳甜酒共一盞兌入並入糯米一撮同煎○如氣虛癢塌不起者入炒山甲一兩○如紅紫血熱不起加紫草八分○如脾滯者入炒查肉兩半陳皮八分○如胃氣虛寒嘔惡者入炒干姜八分丁香五分○如腹痛兼滯者入木香四分陳皮八分○如寒戰咬牙泄瀉者去當歸入熟附片二三兩干姜一兩○如未起貫而發癢者加白芷兩半熟地七八兩

○○第三伯九七方○九味異功散

治痘症寒戰咬牙倒陷嘔吐泄瀉腹痛口鼻氣冷已出未出或出而不起色白面青或膿清不滿或
貫漿不勻凡屬裏寒中虛陽氣不足以此方主之首尾均宜之

黨參

三錢
炒

炙耆

三錢

熟地

七小

炙草

八分

炮姜

二小

附片

三小

丁香

七分
研沖

當歸

二錢
泄者不用

玉桂

去淨皮八
分研末沖

煎好徐徐服之

如泄瀉甚者加炒淮藥三四小再加鹿茸一小尤妙

〇〇第三伯九八方〇雙解散

治痘症表裏俱實者無論初熱起脹貫漿収靨時但見煩躁狂言大渴咽喉腫痛大小便閉結或溺
血衄血者非此方不能解

防風

一分

川弓

八分

當歸

一分

蓮喬

半分

赤芍

八分

薄荷

五分

大黃

八分

石膏

一分

桔梗

一分

黃岑

八分

芥穗

五分

桂枝

三分

滑石

三分

甘草

二分

煎服

此即防風通聖散去麻黃芫硝白朮梔子加桂枝之變方也

〇〇第三伯九九方〇內托透邪法

此余自製得意之方凡小兒初熱於痘瘡疑似之間或已見未見以

此法治之有毒即托有邪即透較之六物六氣所用者更利於近時之小兒神效極多

生黨參

三分體弱者用五分

生黃耆

二分體弱倍用

防風

一錢

查肉

一錢 炒

乳香

四分

檀香

三分 劈碎

陳皮

五分

用糯米一撮紅棗三枚同煎○如燒熱不甚退者加前胡八分○如口渴甚者加花粉七分○小便短入木通一朮○大便秘結不可妄通祇要結而不脹不痛則愈結愈妙易於貫膿若實係脹痛而閉結難受者入火麻仁八分人乳一酒杯蜂蜜一茶挑和勻兌服

○○第四伯一方○參歸鹿茸湯

治痘不甚起發或顏色淡白或泡不尖或小兒素係大虛或在病後而又出痘氣血大虛急防貫漿不起毒雖外送又或業已貫漿因服寒涼忽然倒陷速用此方投之立見充漿也

炙黨

五七錢 或用人參八分更妙

炙芪

五七錢

當歸

二錢 土炒焦

鹿茸

二錢 酒酥

用生羌二片桂元肉十枚煎服○如手足冷入上玉桂去皮四分丁香三分全為末兌服○如寒戰

咬牙或已出倒陷均宜入熟附片二三錢亦入玉桂四五分○如泄瀉入酒炒白芍二兩炒炙實四
五兩阿子肉二兩半煨木香七分

○○第四伯二方○千金內托散

治起脹托膿痘中極妙之方與前方大有神效凡不能起發者必須用之

炙黨

三錢

炙耆

三錢

當歸

二錢
土炒

白芍

八分
炒

山查

一兩
炒

白止

八分

木香

三分

玉桂

五分
去
皮研仲

厚朴

七分
姜汁炒

防風

八分

用糯米一撮黃豆三十枚煎好用以人乳黃酒一酒杯兌入藥內服之○又法以雄雞冠血數滴兌
入藥內更妙○如尚有欬嗽不可大意加款冬花二兩橘紅一兩桔梗八分去木香白芍二味不用

○○第四伯三方○實漿散

凡痘至九日十日內漿宜飽滿如稍有不甚滿者急服此方卽有漿亦須服之俛收磨無後患也

黨參

三分

炙芪

三錢

焦朮

半分

淮藥

二分

鹿茸

一分

當歸

一分

川弓

五分

白止

八分

山甲

四分

查肉

一分

陳皮

七分

玉桂

五分

用黃豆三十枚糯米一撮煎服二三劑極妙

〇〇第四伯四方〇當歸活血湯

治痘已質膿服實漿散一二劑而頂反不起膿反不足必氣足而血凝用此間服膿必飽

生地

四錢

當歸

三錢

白芍

八分

川弓

七分

壽身小補

黨參

三錢
炙

紅花

五分

升麻

四分
炒

紫草

五分

牛子

半
炒

白止

一
炒

黃豆三十枚糯米一撮煎服

〇〇第四伯五方〇血餘解毒湯

治貫漿時下利膿血此腸胃有粒而痘潰下不可妄作痢病即用此方服數劑即愈

白述

二
炒焦

茯苓

錢半

猪苓

一錢

牛子

二
炒

肉桂

四分
研末

澤瀉

八分

用血餘一團即亂頭髮用皂水洗淨候乾乾燒灰入藥全煎服

〇〇第四伯六方〇滋血祛風湯

治貫漿時手足牽引

大生地

四錢 酒炒

當歸

二錢 酒炒

炙耆

二兩

白芍

錢半

雙鉤藤

一兩

薑蠶

八分

焦朮

錢半

川弓

七分

上玉桂

八分

金銀器全煎服

〇〇第四伯七方〇祛風定痛飲

治貫漿時筋骨疼痛

黨參

三兩 酒炒

當歸

二錢 土炒

川弓

八分

防風

八分

鈎藤

一錢

白止

八分

續斷

錢半

五加皮

二兩

蟬退

五個

生耆

二錢

骨補

兩半

甜酒

一杯

兌服

○○第四伯八方○參砂和胃飲

治痘貫漿時單嘔吐而不泄者

黨參

三小
米炒

砂仁

八分

法夏

六分

焦朮

一錢

雲苓

八分

霍香

三分

陳皮

五分

炙草

四分

用燉生羌三片煎服卽止

○○第四伯九方○參朮湯

治痘貫漿時單瀉而不嘔吐者

焦朮

二錢

炙黨

一小

茯苓

一錢

砂仁

四分

炙草

七分

意米

二錢
炒

神曲

四分

查肉

七分
炒

陳皮

五分

木香

三分
炒

軻子

七分
去皮

連子

二十枚
去心

○○第四伯十方○倒倉法

治大便秘結作痛凡老年人秘結數日而痛者亦宜此法

白密

一杯

猪胆汁

一個

其熬成膏撚成小丸子納入冀門少頃冀必出矣

○○第四伯壹一方○除泡丹

治貫漿如水泡者刺破以此藥搽之內服大劑實漿散不可忽畧

滑石

一兩

白朮

五錢

白止

五錢

共研末搽之

○○第四伯一貳方○拔疔散

治痘見點賊痘並貫漿時成紫黑泡者用銀針刺破以此散搽之旋刺旋生刺而再搽忽畧難救

胭脂米

一兩

明雄黃

五錢

共爲細末搽之

○○第四伯壹三方○扶元活血湯

治痘出黑紫色及貫漿時成紫黑者此毒盛血熱

洋參

三錢
酒炒

黃耆

二錢
酒炒

白芍

八分
炒

伏苓

一錢

紅花

八分

白止

八分

虫退

五個

生地

三錢

牛子

錢半

蓮翹

錢半

川甲

七分

煎服

二三
劑

○○第四伯一四方○兩補救急法

治痘業已起脹行漿忽因泄瀉而頃刻倒陷者急服此方遲則難救

炙黨

四錢○如人參
用七八分更妙

熟附片

小半

炙耆

三小

熟地

八小燒
成炭

准藥

三錢

玉桂

七分去皮
研末沖服

雲苓

二小
羌汁炒

用糯米一撮黃豆四十粒全煎煎好用雞冠血數滴甜酒半盞調勻兌入藥內服之立見紅活起頂

連服貳三劑

〇〇第四伯一五方〇扶元升提法

治痘已出或因清解寒涼之劑太過忽然內陷變白急宜用此方以救之

炙黨

五六錢均可用
或用人參七分

炙芪

三五錢
均可用

當歸

二升
酒炒焦

鹿茸

半升
酒酥

淫羊霍

一升

川弓

八分

玉桂

五分去
皮研沖

炙草

八分

杭白芍

一升
炒

升麻

四分
酒炒

用糯米黃豆共一撮煎服

〇〇第四伯一六方〇補氣解穢法

治痘已出起脹貫漿時或因穢物所觸以及不潔淨等事忽然內陷速用此方救之

炙黨

四升

北耆

三錢
炙

當歸

二升

藿香

三分

玉桂

四分去皮
研末冲服

木香

三分

檀香

三分

丁香

四分
研

用糯米黃豆共一撮煎服立效

〇〇第四伯一七方〇回漿散

治痘已膿足將壓此方萬不可少雖壓時偶有他症而此實為取攻之神劑也

製首烏

七錢

黨參

三小
炙

淮藥

四錢
炒

意米

四錢
炒

焦於朮

二小

白芍

一小
酒炒

伏苓

二錢

炙草

八分

用南棗三枚桂元肉十枚全煎再入燕窩二三錢更妙

〇〇第四伯一八方〇甘露回天飲

又名百沸湯〇治痘漸收壓隨時與服並與回漿散相間服之實為妙極並能退熱收結及治膿漿已足當壓不壓者以此湯不時服之即能結痂收壓神效異常用水多燒極滾自沸以白沙糖調入

服之不拘次數

○○第四百伯一九方○四順清涼飲

治男婦大小表裏俱熱面赤煩渴不安大便秘結以及痘瘡當靨不靨內熱甚者宜之

大黃

三錢或生用或用熟隨時斟酌

當歸

二錢

白芍

二錢或炒用生用隨酌之

甘草

一兩

○○第四百伯二十方○二仙散

治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉以及痘瘡將靨不靨而癰色白者以此合第三伯六

九方服

丁香

九枚

乾姜

一兩

共研細末或用開水調服或兌入六氣煎之藥內同服更妙

○○第四百二二方○敗草散

治痘潰爛或結痂而膿不收潰爛不能著床者以此撲之並撲床上尤妙
用蓋屋上或蓋牆上多年之爛草或曠野自爛者焙枯爲末揅於爛處再鋪於床上臥之尤妙

○○第四百貳貳方○秘傳茶葉方

治痘爛不結痂而膿水淋漓者

用茶葉一二筋撿去粗皮梗入水微煮再攪淨梗乘熱鋪於床上以紙隔一層令兒睡上一夜膿水

自乾

○○第四百貳三方○豆粉散

治痘痂潰爛或大意抓破或痘後舊痂潰爛均效

用綠豆研成細粉於潰爛處乾摻之膿水即收

○○第四百貳四方○托裏消毒散

治痘収靨後生瘡或痘癰而成坑者

炙黨

四小

黃耆

三錢酒

當歸

二錢

川弓

一錢

白芍

一錢炒

白朮

二小炒焦

伏苓

二錢

陳皮

一錢

銀花

一錢

蓮喬

一錢

白止

八分

甘草

七分炙

○○第四百貳五方○解毒防風飲

