

活人慈航

九痛丸 治九種心痛

附子_{二錢} 生狼牙 巴豆_{各半錢} 人參 乾薑

吳茱萸_{各錢} 為末蜜丸桐子大強人初服三九日三服

麻黃桂枝湯_{三因} 治外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急不

得轉側

麻黃 桂枝 芍藥 細辛 乾薑 甘草_{各七錢半}

半夏 香附_{各五錢} 每服五錢生薑三片煎服大便閉加

入大黃量虛實加減

薑梔散

生薑汁浸炒山梔_{二兩} 半夏 茯苓 陳皮

黃連 桃仁_{各五錢} 炮黑乾薑_{五分} 炙甘_{一錢}

為末每服二錢白湯調服 或加枳殼_{三錢}

桂黃散

心腹痛

白芍二兩 甘草五錢 桂枝五錢 大黃兩半

金鈴子散 保命 治熱厥心痛或作或止久不愈者

金鈴子三兩 元胡索二兩 為末每服三錢酒下

紅花加蔥酒 紅花五錢 蔥五根 酒煎服末去再服

大溫經湯 金匱

當歸 川芎 白芍 人參 桂枝 丹皮 阿膠各三錢

甘草 半夏 各 麥冬 一錢 吳茱萸 泡棗三分 生薑 一片

煎服失血門有百合散加味芍歸湯治吐下黑血可參看

煮黃芩 藥古 治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣痞癖刺痛如

神 雄黃一兩 巴豆仁 五錢 白麵二兩 水丸如桐子大酒

餅湯煮十二丸漉入冷酒餅湯內令沈冷每用浸藥冷酒

餅湯下一丸一時服一丸以微利為度不必盡劑

木附湯 活人 治寒厥暴痛脉微氣弱

附子二錢 白朮錢半 炙甘草一錢 生薑三片 棗子三枚

烏沈散 本草治一切氣

香附子二兩 烏藥二兩 甘草二錢 為末每服二錢

沈香降氣散 說約治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘促氣

短又治脾胃留飲噫醋吞酸脇下妨悶

香附子二兩 砂仁二錢 沈香一錢 甘草一錢 為末鹽湯下

四七湯和胸治喜怒哀思悲恐驚之氣中脘痞滿氣不舒快

或痰飲嘔逆惡心

半夏錢半 茯苓錢二分 紫蘇六分 厚朴九分 薑一片 棗二枚

七氣湯和劑治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍者

人參 肉桂 炙甘草五分 半夏二錢半 薑三片

代抵當丸

大黃六錢 朴消二錢 桃仁六錢 山甲二錢 乾漆四錢

心腹痛

義上之下

六三

續三

土別重一錢 肉桂五分 為末蜜丸

下瘀血丸湯金匱

大黃四錢 桃仁二十粒 蟅虫十二枚 為末蜜丸作四丸每服一

丸酒煎服血下如豚肝未下再服

星半安中湯純旨 治痰積作痛

南星半夏 滑石 香附 枳殼 青皮 木香

蒼朮 砂仁 山梔 茯苓 橘皮 各錢五分

白螺丸丹溪 治痰積胃脘作痛

田螺殼煨 滑石 蒼朮 梔子 紅麴 香附

南星各兩 枳殼 青皮 木香 半夏 砂仁各半兩

桃仁三十枚 酒餅糊丸

無芰散 治蛔虫心腹痛婦人產後常有心腹痛非瘀血神

效

上牛二錢

大黃五錢

蕪荑二錢半

雷丸二錢半

枳榔五錢

甘草二錢半

五靈脂二錢半

為末糖湯調服二錢

升消平胃散

蒼朮

陳皮

枳榔

紫蘇

香附各

川芎

白芷

砂仁

半夏

山楂

麥芽

酒麴

藿香

川椒各三錢

為末每服二錢酒餅湯調服

加味枳朮丸

正傳

治痰積食積酒積肉積茶積在胃脘當心

而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞酸吐嘔脾疼等症

白朮

枳實

蒼朮

猪苓

麥芽

酒麴

半夏各面

澤瀉

茯苓

川芎

黃連

螺壳

煨各七錢

砂仁

草薢

黃芩

青皮

萊菔

各五錢

乾薑

陳皮

香附

瓜蒌仁

厚朴

枳榔

各三錢

木香

甘草

各二錢

酒餅糊丸

時常口吐清水加滑石一兩

草豆蔻丸

東垣

治客寒犯胃熱亦可用止可一二服東垣云

脾胃虛而心火乘之不能滋榮上集元氣遇冬腎與膀胱之寒水旺時子能令母實致肺金大腸相輔而來尅心乘脾胃此大復其讐也經曰大勝必大復故皮毛血脉分肉之間元氣已絕於外又大寒大燥二氣并乘之則苦惡風耳鳴及腰背相引胸中而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛目時眩目不欲開腹中為寒水反乘痰涎沫食入反出腹中常痛及心胃痛脇下急縮有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕或腸鳴此脾胃虛之極也胸中氣亂心煩不安而為霍亂之漸隔咽不通噎塞極則有聲喘喝閉塞或曰陽中或暖房內稍緩口吸風寒則復作四肢厥冷身體沈重不能轉側不可回顧小便澀而時燥以草豆蔻丸此主秋冬寒涼大復氣之藥也

草豆蔻一錢四分

吳茱萸

益智仁

僵蚕各八分 當歸

青皮各六分

酒麴

薑黃

各四分

生甘三分

桃仁七個

半夏

一錢 澤瀉一分

麥芽

錢半

炙甘六分

柴胡四分

人參

黃芪

陳皮

各八分

為末酒餅糊丸桐子大每服

三五十九白湯下

神聖復氣湯

東垣

東垣云復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎

水之旺子能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰

背胸膈閉塞疼痛善噦口中涎目中泣鼻中流濁涕不止

或有忽而不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作

陣痛目中流火視物眊眊耳鳴耳聾頭并口鼻或惡風寒

喜日陽夜臥不安常覺痰塞咽隔不通口無滋味而脇急

縮而痛牙齒動搖不能嚼物腰膝間及尻臀膝足寒冷陰

汗前陰冷行步欲側起居艱難掌中寒風痺麻木小便數

心腹病

義上之下

六十四

雜症三

而晝多夜頻而少氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度
婦人白帶陰戶中大痛牽心而痛驚失色男子拉罕牽心
陰陰而痛面如赭色食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏
急而腹皮色白後出餘氣腹不能勞或腸鳴膝下筋急有
胛大痛皆寒水來復火土之讐也

柴胡

羌活

甘草

半夏

升麻

白葵花

五原

常歸

人參

防風

桃仁

郁李仁

各五分

乾薑

附子

各

藁本

各

右水五盞煎至二盞入

黃芪

草豆蔻

各

陳皮

各

入內再煎至一盞再入

黃柏

各

黃連

各

枳殼

各

生地黃

各

已上四味預一日另

用新水浸又次入

細辛

各

川芎

各

京子

各

預一日用水半大盞分作二處

浸此三味并黃柏等藥前正藥作一大盞不去渣入此浸

藥再上火煎至一大盞去渣稍熱服

又能治咬頰咬唇咬舌舌根強硬等症如神

益智和中丸 東垣云季秋心腹中大痛煩躁冷汗自出宜

此

草豆蔻 四錢 益智仁 一錢三分 砂仁 七分 炙甘 二錢半

黃芪 當歸 人參 乾薑 麥冬 酒麴 陳皮 各五分

桂枝 桂子 各錢半 麥芽 三錢半 黃連 生地黃 各一錢

薑黃 二分 木香 二分

為細末酒餅打糊丸白湯下三五十九為散亦可

麻黃草豆蔻丸 東垣云季秋客寒犯胃心胃大痛不可忍

者

麻黃 二錢 草豆蔻 酒麴 各錢 益智仁 八分 麥芽

砂仁 黃芪 半夏 白朮 陳皮 各五分 柴胡

炙甘草 吳茱萸 當歸 青皮 木香 厚朴各三錢

華澄茄 紅花 蘇木 各五分

為末酒餅糊丸每服三五十丸

厚朴湯 東垣云脾胃虛寒心腹滿及秋冬客寒犯胃時作

疼痛

厚朴 陳皮 各兩 炙甘草 乾薑 各五錢 茯苓 兩

每服一兩煎服

準繩云腹痛或大便利或用手重按痛處不痛者為虛宜於

已上東垣治寒病方中選用無寒者宜白芍五錢炙甘草二

錢煎服

香砂理中湯 理中加木香砂仁

枳殼煮散 本事治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脉緊腰

脚重滯兩股筋急兩牽痛四肢不能舉漸至脊脅攣急此

藥大治脇痛

枳殼四兩 細辛 川芎 桔梗 防風 葛根各三兩

甘草一兩 為粗末每服四錢薑棗同煎服

柴胡疎肝散錢五

柴胡 陳皮各二錢 川芎 白芍 枳殼各錢半

甘草五分 香附錢半

復元活血湯發明

柴胡半兩 瓜蒌根 當歸各三錢 紅花 甘草

山甲炒各二錢 大黃一兩 桃仁五十枚 每服一兩加酒煎服

補肝湯滑氏

山茱萸 甘草 肉桂 桃仁 細辛 柏子仁

茯苓 防風 大棗

補肝散滑氏

山茱萸 肉桂 薯蕷 天雄 茯苓 人參 各三錢

川芎 白朮 獨活 加皮 大黃 各七錢 陳皮 三錢

防風 乾薑 丹參 厚朴 細辛 桔梗 各二兩

甘草 菊花 酒麴 麥芽 各二兩 貫眾 半兩 為末服二錢

秦仁補肝散 滑氏

山茱萸肉 當歸 五味子 山藥 黃芪 川芎

木瓜 各半兩 熟地黃 白朮 各錢 獨活 秦仁 各四錢

為末服五錢 棗水煎服

大黃附子湯 金匱下同

大黃 二錢 附子 三錢 細辛 一錢 水煎分作三次服

瓜蒌薤白白酒湯

瓜蒌仁 二兩 薤白 三兩 白酒 半升 煎服

瓜蒌薤白半夏湯

瓜蒌仁二兩 薤白二兩 半夏三錢 白酒半升 煎服

薤苈附子散

薤苈仁二兩 大附子三錢 為末 白湯服二錢 日三服

茯苓杏仁甘草湯

茯苓五錢 杏仁二兩 甘草一錢 水煎服

橘皮枳實生薑湯

橘皮二兩 枳實五錢 生薑五錢 水煎服

枳實薤白桂枝湯

枳實四錢 厚朴二錢 薤白二兩 桂枝一錢 水煎服

人參湯

人參 甘草 乾薑 白朮 各三錢 水煎服

生薑半夏湯

半夏五錢 生薑汁一鍾 煎半夏湯沖生薑汁服

疝氣

骨空論任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚 腎脉生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝

經脉篇足厥陰肝病丈夫癰疝婦人少腹腫 肝所生病為陰泄狐疝 足厥陰之別循脛中上臑結於莖其氣逆則臑腫卒疝實則挺長虛則暴癢取之所別也

脉解篇厥陰所謂癰疝婦人少腹腫也

陰陽別論三陽為病發寒熱其傳為癰疝

經筋篇足陽明之筋病癰疝腹筋急 足太陰之筋病陰器紐痛下引臍兩脇痛 足厥陰之筋病陰器不用傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收

邪氣藏腑病形篇小腸病者小腹痛腰脊控臑而痛時窘之後

玉機真藏論脾傳之腎病名曰疝瘕少腹冤熱而痛出白一名曰蠱

本藏篇腎下則腰尻痛不可以俛仰為旅疝至真要大論陽明司天丈夫癰疝婦人少腹腫陽明之勝外發癰疝太陰在泉民病少腹控臑引腰脊上衝心痛痛太陽之復少腹控臑引腰脊上衝心痛太陰在泉主勝甚則為疝

繆刺論邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指甲上與肉交者各一痛左取右右取左

內經脉法寸口脉沈而弱曰寒熱及疝瘕少腹痛脉急曰疝瘕少腹痛診得心脉而急病名心疝少腹當有形也心脉微滑為心疝引臍小腹鳴肝脉滑甚為瘕疝

脾脉微大為疝氣滑甚為瘕瘕瘕甚為瘕瘕微滿為內

積多下膿血 腎脉滑甚為癰瘰 腎脉大急沈肝脉大

急沈皆為疝 心脉搏滑急為心疝 肺脉沈搏為肺疝

三陽急為瘦三陰急為疝 黃脉之至也大而虛有積

氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法 厥陰滑則病狐

風疝 少陰滑則病肺風疝 太陰滑則病脾風疝 陽

明滑則病心風疝 太陽滑則病腎風疝 少陽滑則病

肝風疝

時珍脉法 尺部脉或弦或緊或遲或牢或結或伏皆為疝

準繩脉法弦急搏皆疝視在何部而知其藏 寸弦而緊為

寒疝 跌陽虛遲為寒疝 肝腎滑甚為癰瘰

全匱腹痛脉弦緊弦則衝氣不行即惡寒緊則不欲食邪正

相搏即為寒疝繞臍痛若發則自汗出手足厥冷大烏頭

煎主之