

藥盒醫學叢書

之九

十二經穴病候撮要


中華民國三十年七月初版

藥食醫學叢書之九

十二經穴病候撮要 一冊

實價國幣二元八角 外埠酌加寄費

版權所有



翻印必究

著作者 武進 惲鐵樵

參校者 江陰 章巨膺

上海牯嶺路人安里十四號

發行者 章巨膺

上海三馬路

寄售處 千頃堂

上海麥家圈

中醫書局

承印處 民友印刷公司

上海勞神父路二一七弄二六號
電話八二三六八號

自序

自今日之眼光觀之。經穴云者。包括生理學。醫化學。內分泌神經系諸端。其基礎建築於形能兩字之上。其成功不知歷幾何年月。積不知幾千萬病人之經驗。故鄙人於此。極端認爲有研究價值之一種學問。惜乎自靈素而後。學者囿於見聞。限於學步。無復有偉大之精神。爲所以然之探討。迄今日因靈素以五行爲說。與科學格不相入。遂欲破壞之。摧殘之。靡所不用其極。若惟恐去惡之不盡也者。其實勿思之甚。鄙意以爲中國醫學而無價值。不待摧殘將自消滅。苟有價值。自然江河不廢。惟余亦非具有偉大之精神。能爲根本探討者。不過爲後此學者之先河。則固竊比於當仁。況吾儕既治中醫。安有經穴可以置之不講者。故不辭譴陋。輯爲此篇。大段節目皆藍本沈氏尊生書。多所刪節。爲學者容易明瞭。省晷刻也。

經穴本鍼灸家所當有事。凡穴有可針者。有不可針者。有可灸者。有不可灸者。穴之部位。以同身寸計。同身寸者。中指中節背面兩端。屈指取之。是爲一同身寸。蓋人身有長短不同。用同身寸。則無不同也。然失之毫釐。謬以千里。且鍼灸愈病。須與氣候相應。其精奧處。多不可曉。世之以針灸爲業者。僅守其師傳。其術既儉約。復不能著書。古書所言。今之鍼灸家。亦多不審。此道不傳。在若存若亡之間。吾儕欲明此絕學。良非易事。今吾爲此。欲學者知其大概。於經絡俞穴。能知其名指其處。爲他日登高自卑之基礎云耳。民國十四年八月鐵樵自序。

武進惲鐵樵遺著

藥盒醫學叢書全目

- | | |
|------|----------|
| 第一種 | 羣經見智錄 |
| 第二種 | 傷寒研究 |
| 第三種 | 傷寒輯義按 |
| 第四種 | 溫病明理 |
| 第五種 | 脈學發微 |
| 第六種 | 保赤新書 |
| 第七種 | 生理新語 |
| 第八種 | 藥盒醫案 |
| 第九種 | 十二經穴病候撮要 |
| 第十種 | 風勞毆病論 |
| 第十一種 | 婦科大略 |
| 第十二種 | 臨證演講錄 |
| 第十三種 | 鐵樵雜著 |

以上各種已出版發行

受業江陰章巨膺經理印行

上海牯嶺路人安里十四號

- | | |
|-------|---------|
| 第十四種 | 神經系病理治要 |
| 第十五種 | 藥物學 |
| 第十六種 | 臨證筆記 |
| 第十七種 | 醫學入門 |
| 第十八種 | 熱病學 |
| 第十九種 | 病理各論 |
| 第二十種 | 病理概要 |
| 第二十一種 | 金匱方論 |
| 第二十二種 | 金匱翼方選按 |
| 第二十三種 | 霍亂新論 |
| 第二十四種 | 驗方新按 |
| 第二十五種 | 梅瘡見垣錄 |

以上各種將陸續印行

藥齋醫學叢書之九

二經穴病候撮要目次

自序

手太陰肺

肺脹 肺萎 肺癰 息賁 欬嗽 哮喘 諸氣 疹子

手陽明大腸

腸癰 臟毒 腸鳴 脫肛 肛門痛癢

足陽明胃

胃癰 胃痛 霍亂 諸萎

足太陰脾

痞氣 嘔吐噦 噎塞反胃 關格 泄瀉 腫脹 痞滿

七

十一

一一

手少陰心

伏梁 心痛 心癰 怔忡 卑慄 驚悸悲喜 健忘

三〇

不寐 癲狂 涕泣

手太陽小腸

小腸氣 小腸癰

四六

足太陽膀胱

膀胱氣 轉胞症 小便窻閉 交腸

四八

藥盒醫學叢書之九

十二經穴病候撮要

武進惲鐵樵輯

受業江陰章巨膺參校

手太陰肺

手太陰之脈起於中焦。

中焦在胃中脘主熟腐水穀精微上注於肺肺行榮衛故十二經脈自此為始所以手太陰之脈起於中焦

下絡大腸。

為肺之雄故肺脈絡大腸

環循胃口。

胃口為胃之上口賁門之位也

上膈屬肺。從肺系橫出腋下。

謂

肱之裏也下循臑內。

臑謂肩肘之間行少陰心主之前。

少陰在後心主處中而太陰行其前

下肘中。

尺澤穴

循臂內上

骨下廉。

上骨謂臂之上骨下廉謂上骨之下廉

入寸口。

經渠穴在寸口中

上魚際。

此故名

出大指之端。

少商穴

其支者。

鍼經曰支而橫者為絡此手太陰之絡別走陽明者也穴名列缺

內廉出其端。

手太陰自此交入手陽明

是動則病。

手太陰常多氣少血今氣先病是謂是動難經曰是動者氣也

肺脹滿膨膨而喘欬。

膨謂氣

缺盆中痛。

缺盆穴名在肩下橫骨陷中謂其處如缺豁之盆故曰缺盆

甚則交兩手而瞀。

太素註云瞀低目也是謂臂

厥。肘前曰臂

主肺所生病者。邪在氣留而不去則傳之於血也血既病矣是氣之所生故云所生病也難經曰所生病者血也

欬嗽上氣喘

渴煩心胸滿臍臂內前廉痛。掌中熱。氣盛有餘則肩背痛風汗出中風小便數

而欠。數頻也欠少也謂小便數而少也

氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變卒遺失無度（下

略）

手太陰肺經左右凡二十二穴

少商

在手大指端內側去爪甲角如韭葉

魚際

在手大指本節後紋中

太淵

在掌後陷中

經渠

在寸口脈中

列缺

在腕後一寸五分

分

孔最

去腕上七寸

尺澤

在肘約紋中

俠白

在天府下二寸動脈中尺澤上五寸

天府

在腋下一寸三寸臂內廉動脈中

雲

門

在巨骨下氣戶旁二寸陷中動脈應手舉臂取之

中府

在雲門下一寸六分按乳頭往中數至第三肋間動脈應手者

手太陰肺之病候曰肺脹。曰肺萎。曰肺癰。曰息賁。曰欬嗽。曰哮喘。曰諸氣。曰疹子。

肺脹

沈氏尊生書云。肺脹。肺家氣分病也。仲景曰。欬而上氣煩躁者。為肺脹。

欲作風水。發汗自愈。又曰欬而上氣。此爲肺脹。其人喘。目如脫狀。脈浮大者。越婢加半夏湯主之。又曰肺脹欬而上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水氣。小青龍湯加石膏主之。丹溪曰。肺脹而嗽。或左或右。不得眠。此痰挾瘀血。凝氣而病。宜養血。俾流動以平氣降火。疏肝以清痰。四物湯加桃仁。訶子。青皮。竹瀝之類。沈金鰲云。肺脹爲肺經氣分之病。故宜以收斂爲主。卽挾痰挾血者。亦不離乎氣。不得專議血。專議痰也。宜清化丸。

清化丸方

貝母一錢

杏仁五錢

青黛一錢

薑汁砂糖丸含化

鐵樵按。嬰兒有猝然喘滿。手脚牽掣。俗名肺喘驚風者。實卽肺脹之候。所謂肺喘驚風。病者之胸背皆高起。此種乃大危險症候。實無善法。保赤新書中有牛黃奪命丸治此病。然亦未曾實驗。恐不能取效。因上膈及背皆骨骼。喘滿至於骨骼變更地位。肺脹之劇烈可見。又有此病有慢性者。可以延喘至十餘年。更

無辦法。謝蘅窗先生之老太太患此。中西名醫畢集。無藥不嘗。卒未得一當也。肺痿。肺痿久欬。肺虛而熱。在上焦病也。其症狀必寒熱往來。自汗。氣急。煩悶。多唾。或帶紅線膿血。宜急治之。宜舉肺湯。元參清肺飲。切忌升散溫熱辛燥。仲景云。或有患此症吐涎沫而欬者。有吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此爲肺中冷。必眩多吐涎。必溫之。宜生薑甘草湯。又有火盛者。宜人參平肺散。有喘急而面浮者。宜葶蘆湯。大約此症總以養氣養肺養血清金降火爲主。若肺萎將變爲癰。又必兼理膿毒。宜紫苑散。

舉肺湯 桔梗 甘草 天冬 竹茹 阿膠 沙參 貝母 百合

元參清肺飲 元參 柴胡 陳皮 桔梗 茯苓 麥冬 苡仁 人參

甘草 檳榔 地骨皮 童便

生薑甘草湯

生薑

炙草

人參

紅棗此方治肺寒欬吐

甘草乾薑湯 炙草 乾薑炭 此方治吐而不效

人參平肺散 桑皮 知母 人參 地骨皮 炙草 天冬 赤苓 青皮

陳皮 五味子 生薑

葶藶湯 炒葶藶爲末大棗十枚煎湯調末服 原注云葶藶末二錢照經驗上言之萬不可用二錢此物甚悍三四分已足

紫苑散 紫苑 人參 知母 五味子 桔梗 貝母 茯苓 阿膠

甘草 生薑

肺癰 肺癰肺熱極而成病也。其症痰中腥臭或帶膿也。宜清金散。是脾虛肺弱。虛火上燄之敗症。故補脾亦是要着。初起時欬嗽氣急。胸中隱痛。吐痰如膿。宜麥冬平肺飲。或欬吐膿痰。胸膈脹滿。氣喘發熱。宜元參清肺飲。或病重不能臥。宜甯肺桔梗湯。或已吐膿血。必以去膿補氣爲要。宜排膿散。勿論已成未成。總當清熱滌痰。使無留壅。自然易愈。凡患肺癰。手掌皮粗。氣急脈數。額紅鼻扇。

不能飲食者皆不治。

清金散 苡仁 橘葉 黃芩 花粉 貝母 桑皮 桔梗 牛蒡 蒺藜

麥冬平肺飲 麥冬 人參 赤芍 檳榔 甘草 赤苓 陳皮 桔梗

元參清肺飲 元參 柴胡 陳皮 桔梗 茯苓 麥冬 苡仁 人參

炙草 檳榔 地骨皮 童便

宵肺桔梗湯 桔梗 貝母 當歸 黃芪 枳壳 桑皮 防己 瓜蒌仁

甘草節 五味子 百合 苡仁 葶藶 杏仁 地骨皮

知母 欬甚者倍百合發熱加柴胡便閉加大黃大黃不過三五分不可多

排膿散 人參 黃芪 白芷 五味子等分

息賁 息賁肺積病也。在右脅下如覆盆狀。令人洒洒然寒熱。背痛嘔逆喘欬。發肺癰。脈必浮而長。肺氣虛痰熱壅結也。當以降氣清熱開痰散結爲主。宜息

賁丸。

息賁丸

川連一兩二錢

厚朴八錢

乾薑

茯苓

紫菀

川椒

錢半

人參二錢

桂枝

桔梗

三稜

天冬

陳皮

川烏

薏仁

青皮各一錢

巴豆霜四分

茯苓另研餘爲末篩過和茯苓研勻再入巴豆霜研勻蜜丸梧子大初服二丸每日加一丸漸加至

大便微溏再從兩丸加服積去大半便勿服

欬嗽

病源方藥詳風勞鼓病論。病理各論。

哮

哮肺病也。哮與喘與短氣三症相似而不同。入門曰。哮以聲響言。喘以氣

息言。

蓋哮無不與痰俱。喉間沙沙有聲。病作時。肺管中皆痰也。古人辨此。說多

而不甚清楚。

茲以吾意說之。氣道窒痰鳴者哮也。氣息壅湧呼吸如不及者喘

也。

或謂擡肩搖身者爲哮。按擡肩云者。卽所謂肩息。搖身者。謂呼吸困難。身爲

動搖。

此二字。哮有之。喘亦有之。若以意會之。恐失之彌遠。惟以寒熱虛實爲辨。

則灼然可見。凡病暴者多實。久者多虛。暴者屬熱。久者屬寒。暴病有屬寒者。乃中寒。陰盛於內。陽亡於外之候。故其症必有汗。久病有屬熱者。乃陰分既虛。水不涵火之候。故其舌必乾絳。兩顙必發赤。哮喘之病。往往完全不見熱象。且此症恆見之於童年。終身不能愈。以云病久。無有更久於此者。秋杪卽劇。春暮乃瘥。其爲肺寒。不勝外界冷空氣壓迫。極爲顯著。故全生集用豆豉白信石治此病。其爲寒證甚確。李士才謂是寒包火。謂於八九月未寒時。用大承氣下其熱。至冬寒無熱可包。便不發作。此說甚不經。患哮喘病者。無有不虛。用大承氣豈非犯虛虛之禁乎。沈金鰲云。哮喘大都感於幼稚之時。客犯鹽醋。透滲氣腕。一遇風寒。便窒塞道路。氣息急促。故多發於冬初。必須淡飲食。行氣化痰爲主。禁涼劑。恐風邪難解也。禁熱劑。恐痰火易升也。蘇子枳壳青皮桑皮桔梗半夏前胡杏仁梔子。皆治哮喘必用之藥。驗方列後。

千金湯 麻黃 桑皮 蘇子 杏仁 白果 黃芩 半夏 甘草 款冬

花 此方能治一切哮喘症

水哮方

芫花

紫背浮萍

米粉和爲顆清水煮熟恣意食之

水哮謂哮喘而兼飲者

皂莢丸

皂莢去皮子弦蜜丸二錢

明礬杏仁白牽牛頭末一錢

紫苑炙草

桑皮石菖蒲半夏各二錢

胆星一錢半

右藥研末用百部一兩二錢煎膏丸此方治久哮喘每服一錢

千縉導痰湯

薑半夏二錢

胆星陳皮赤苓枳壳各一錢

皂莢甘草各一寸

並蜜炙薑五片煎服

此方治風痰哮喘

參蘇溫肺湯

人參

紫蘇

木香

肉桂

五味子

桑皮

陳皮

半夏

白朮

茯苓各一錢

甘草五分

薑三片

煎服

此方治肺寒

而哮喘

諸氣

內經謂諸氣皆屬於肺故凡氣爲病者皆肺經病

中氣 中去聲。如中風之中。中氣暴病也。暴喜傷陽。暴怒傷陰。憂愁怫意。氣多厥逆。皆能致中氣之病。要惟忿怒爲尤甚。怒則肺舉葉張。氣有升而無降。可以痰涎壅塞。牙關緊閉。一時昏倒。不省人事。若以薑湯急灌之。立時可醒。既醒之後。隨症調治。非若中風之病。一發便不易挽救也。入門曰。中氣之病。虛者八味順氣散。實者四七湯。

八味順氣散 人參 白朮 雲苓 炙草 青陳皮 白芷 烏藥

四七湯 薑夏 茯苓 厚朴 蘇葉 生薑

短氣 短氣有虛實兩種。元氣虛乏。呼吸淺促。對面微聞聲息者。當補氣。不可瀉肺。無急病者。當視其所虧何藏。斟酌調理。急病末路。見呼吸出多入少者難治。宜生脈散。仲景曰。平人寒熱短氣不足以息者實也。又曰。短氣有微飲。當從