

中国药用植物

CHINESE MEDICINAL PLANTS

(第二册)

叶华谷 曾飞燕 叶育石 主编



中国科技出版社
http://www.cnki.com



图书在版编目 (CIP) 数据

中国药用植物. 第1册 / 叶华谷, 曾飞燕, 叶育石 主编. - 武汉: 华中科技大学出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5609-8216-8

I. ①中… II. ①叶… ②曾… ③叶… III. ①药用植物-介绍-中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第164352号

中国药用植物 (第一册)

叶华谷 曾飞燕 叶育石 主编

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

地 址: 武汉市武昌珞喻路1037号 (邮编: 430074)

出 版 人: 阮海洪

策划编辑: 王斌

责任监印: 张贵君

责任编辑: 熊纯

装帧设计: 百彤文化

印 刷: 深圳市建融印刷包装有限公司

开 本: 889 mm × 1270 mm 1/32

印 张: 12.5

字 数: 500千字

版 次: 2013年5月第1版 第1次印刷

定 价: 138.00元 (USD 29.99)



投稿热线: (020) 66636689 342855430@qq.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

中国药用植物

CHINESE MEDICINAL
PLANTS

叶华谷 曾飞燕 叶育石 主编

(第一册)



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>


中国·武汉

中国科学院华南植物园药园
西南交通大学生命科学与工程学院

主 编: 叶华谷 曾飞燕 叶育石

副主编: 袁 艺 付 琳



编 委: 于 慧 王发国 王红刚 邓乔华 刘基柱 吴林芳 李书渊 李如良 李泽贤
李素英 张 征 张慧晔 邹 滨 陈玉笋 陈巧明 陈有卿 林锦丰 林慧蓉
秦新生 贾宜军 符同浩 曹照忠 曾显禹 翟俊文 莫结丽 倪静波 钟坤英
摄 影: 王 斌 邓乔华 叶华谷 叶育石 朱 强 李泽贤 林慧蓉 邹 滨 周厚高
袁 艺 曾飞燕



本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项（CZBZX-1）、财政部战略生物资源科技支撑运行专项（KSCX2-YW-Z-1004）、植物园迁地保护植物编目及信息标准化（2009FY120200）”项目资助出版。





前言

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，本书将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类以字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物202种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《华南药用植物》《湖南药物志》《广西药用植物名录》等。

为了避免某些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”、“有毒”、“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域参考使用。

毛相思子	Abrus mollis Hance	008
台湾相思	Acacia confusa Merr.	010
乌头	Aconitum carmichaelii Debx.	012
中华猕猴桃	Actinidia chinensis Planch.	014
长柱沙参	Adenophora stenanthina (Ledeb.) Kitag.	016
红豆蔻	Alpinia galanga (Linn.) Willd.	018
草豆蔻	Alpinia hainanensis K. Schum [A. <i>katsumadai</i> Hayata]	020
山姜	Alpinia japonica (Thunb.) Miq.	022
华山姜	Alpinia oblongifolia Hayata [A. <i>chinensis</i> (Retz.) Rosc.]	024
高良姜	Alpinia officinarum Hance	026
益智	Alpinia oxyphylla Miq.	028
花叶山姜	Alpinia pumila Hook. f.	030
密苞山姜	Alpinia stachyoides Hance	032
艳山姜	Alpinia zerumbet (Pers.) Burt. et Smith	034
秒榕	Alsophila spinulosa (Wall. ex Hook.) Tryon [<i>Cyathea spinulosa</i> Wall.]	036
链珠藤	Alyxia sinensis Champ. ex Benth.	038
砂仁	Amomum villosum Lour.	040
穿心莲	Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees	042
兴安白芷	Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.	044
朱砂根	Ardisia crenata Sims.	046
山血丹	Ardisia lindleyana D. Dietr. [A. <i>punctata</i> Lindl.]	048
五月艾	Artemisia indica Willd.	050
天门冬	Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.	052
短舌紫菀	Aster sampsonii (Hance) Hemsl.	054
假杜鹃	Barleria cristata Linn.	055
龙须藤	Bauhinia championii Benth.	056
首冠藤	Bauhinia corymbosa Roxb. ex DC.	058
鬼针草	Bidens pilosa Linn.	060
木棉	Bombax ceiba Linn. [<i>Gossampinus malabarica</i> (DC.) Merr.]	062
小构树	Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc.	064
黑草	Buchnera cruciata Buch.-Ham.	066
芳香石豆兰	Bulbophyllum ambrosia (Hance) Schltr. [B. <i>watsonianum</i> Reichb. f.]	068
水玉簪	Burmannia disticha Linn.	070
云实	Caesalpinia decapetala (Roth) Alston [C. <i>sepiaria</i> Roxb.]	072
华紫珠	Callicarpa cathayana H. T. Chang	074
白棠子树	Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch	076
杜虹花	Callicarpa formosana Rolfe [Callicarpa <i>pedunculata</i> R. Br.]	078
蕉芋	Canna edulis Ker	080
膜叶槿果藤	Capparis acutifolia Sweet [C. <i>membranacea</i> Gardn. et Champ.]	082
红花	Carthamus tinctorius Linn.	084
兰香草	Caryopteris incana (Thunb.) Miq.	086
板栗	Castanea mollissima Bl.	088
茅栗	Castanea sequinii Dode	090
黄花大苞姜	Caulokaempferia coenobialis (Hance) K. Larsen [<i>Monolophus coenobialis</i> Hance]	092
樟树	Cinnamomum camphora (Linn.) Presl	094
橘红	Citrus grandis (Linn.) Osbeck var. <i>tomentosa</i> Hort.	096
柠檬	Citrus limonia Osbeck	098
佛手	Citrus medica Linn. var. <i>sarcodactylis</i> (Noot.) Swingle	100
柑桔	Citrus reticulata Blanco	102
茶枝柑	Citrus reticulata Blanco cv. Chachi	104
水翁	Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. et Perry	106

山木通	Clematis finetiana Lévl et Vant. [<i>C. pavoliniana</i> Pamp.]	108
肾茶	Clerodendranthus spicatus (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li	110
白花灯笼	Clerodendrum fortunatum Linn.	112
广东大青	Clerodendrum kwangtungense Hand.-Mazz.	114
海通	Clerodendrum mandarinorum Diels	116
黄连	Coptis chinensis Franch.	118
三角叶黄连	Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao	120
峨眉黄连	Coptis omeiensis (Chen) C. Y. Cheng	122
鸡骨香	Croton crassifolius Geisel.	124
蕤苾	Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo & Masamune	126
柘树	Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur. ex Lavallee	128
仙茅	Curculigo orchioidea Gaertn.	130
郁金	Curcuma aromatica Salisb.	132
香茅	Cymbopogon citratus (DC.) Stapf	134
两广黄檀	Dalbergia benthamii Prain	136
尖叶四照花	Dendrobenthamia angustata (Chun) Fang [<i>D. hupehensis</i> Fang]	138
钩状石斛	Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.	140
铁皮石斛	Dendrobium officinale Kimura et Migo [<i>D. candidum</i> Wall. ex Lindl.]	142
山菅兰	Dianella ensifolia (Linn.) DC.	144
褐苞薯蓣	Dioscorea persimilis Prain et Burk.	146
秤钩风	Diploclisia affinis (Oliv.) Diels	148
苍白秤钩风	Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels	150
坡柳	Dodonaea viscosa (Linn.) Jacq.	152
结香	Edgeworthia chrysantha Lindl.	154
厚壳树	Ehretia thyrsoflora (Sieb. et Zucc.) Nakai	156
胡颓子	Elaeagnus pungens Thunb.	158
地胆草	Elephantopus scaber Linn.	160
一点红	Emilia sonchifolia (Linn.) DC.	162
龙牙花	Erythrina corallodendron Linn.	164
古柯	Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron. [<i>E. coca</i> Lam.]	166
东方古柯	Erythroxylum sinense C. Y. Wu [<i>E. kunthianum</i> (Wall.) Kurz]	168
柠檬桉	Eucalyptus citriodora Hook.	170
杜仲	Eucommia ulmoides Oliv.	172
地锦	Euphorbia humifusa Willd.	174
芡实	Euryale ferox Salib. ex König & Sims	176
何首乌	Fallopia multiflora (Thunb.) Harald. [<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.]	178
大吴风草	Farfugium japonicum (Linn. f.) Kitam.	180
无花果	Ficus carica Linn.	182
小叶榕	Ficus microcarpa Linn. f.	184
瓶梨榕	Ficus pyriformis Hook. & Arn.	186
瓜馥木	Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.	188
滇白珠树	Gaultheria yunnanensis (Fr.) Rehd.	190
大茶药	Gelsemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth.	192
毛大丁草	Gerbera piloselloides (Linn.) Cass.	194
舞花姜	Globba racemosa Smith	196
大豆	Glycine max (Linn.) Merr.	198
扁担杆	Grewia biloba G. Don.	200
姜花	Hedychium coronarium Koenig	202
大尾摇	Heliotropium indicum Linn.	204
木芙蓉	Hibiscus mutabilis Linn.	206
风车藤	Hiptage benghalensis (Linn.) Kurz	208

鱼腥草	Houttuynia cordata Thunb.	210
大叶冬青	Ilex latifolia Thunb.	212
披针叶八角	Illicium lanceolatum A. C. Smith	214
线纹香茶菜	Isodon lophanthoides (Ham. ex D. Don) H. Hara [<i>Rabdosia lophanthoides</i>]	216
纤花香茶菜	Isodon lophanthoides (Ham. ex D. Don) H. Hara var. graciliflora (Benth.) H. Hara [<i>Rabdosia lophanthoides</i> var. <i>graciliflora</i>]	218
溪黄草	Isodon serra (Maxim.) Kudô [<i>Rabdosia serra</i> (Maxim.) H. Hara]	220
长叶香茶菜	Isodon walkeri (Arnott) H. Hara [<i>I. stracheyi</i> (Benth. ex Hook. f.) Kudô]	222
鸭嘴花	Justicia adhatoda Linn. [<i>Adhatoda vasica</i> Nees.]	224
小筋骨	Justicia gendarussa Burm. f. [<i>Gendarussa vulgaris</i> Nees.]	226
大筋骨	Justicia ventricosa Wall. [<i>Adhatoda ventricosa</i> (Wall.) Nees]	228
黑老虎	Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith	230
山柰	Kaempferia galanga Linn.	232
马兰	Kalimeris indica (Linn.) Sch.-Bip. [<i>Aster indicus</i> Linn.]	234
鸡眼草	Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.	236
六棱菊	Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Hochst.	238
截叶铁扫帚	Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don	240
川芎	Ligusticum chuanxiong S. H. Qiu et al.	242
藁本	Ligusticum sinense Oliv.	244
紫苏草	Limnophila aromatica (Lam.) Merr.	246
中华补血草	Limonium sinense (Girard) Kuntze [<i>Statice sinensis</i> Girard]	248
神萼草	Lindenbergia philippensis (Champ.) Benth.	250
豺皮樟	Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen	252
华南忍冬	Lonicera confusa (Sweet) DC.	254
大花忍冬	Lonicera macrantha DC.	256
水龙	Ludwigia adscendens (Linn.) Hara [<i>Jussiaea repens</i> Linn.]	258
毛草龙	Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven [<i>Jussiaea suffruticosa</i> Linn.]	260
枸杞	Lycium chinense Mill.	262
海金沙	Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.	264
玉兰	Magnolia denudata Desr.	266
厚朴	Magnolia officinalis Rehd. & Wils.	268
四叶厚朴	Magnolia officinalis Rehd. et Wils. subsp. biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law	270
野牡丹	Melastoma candidum D. Don	272
毛蕊	Melastoma sanguineum Sims	274
苦楝	Melia azedarach Linn.	276
黄兰	Michelia champaca Linn.	278
破布叶	Microcos paniculata Linn. [<i>Grewia microcos</i> Linn.]	280
巴戟天	Morinda officinalis How	282
百眼藤	Morinda parvifolia Bartl. ex DC.	284
大苞水竹叶	Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex Hong	286
九里香	Murraya exotica Linn.	288
竹柏	Nageia nagi (Thunb.) Kuntze [<i>Podocarpus nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.]	290
猪笼草	Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce	292
龙船草	Nosema cochinchinensis (Lour.) Merr.	294
罗勒	Ocimum basilicum Linn.	296
金锦香	Osbeckia chinensis Linn.	298
酢浆草	Oxalis corniculata Linn. [<i>O. repens</i> Thunb.]	300
马甲子	Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.	302
露兜树	Pandanus tectorius Sol.	304
光叶海桐	Pittosporum glabratum Lindl.	306
广藿香	Pogostemon cablin (Blanco) Benth.	308

多花黄精	Polygonatum cyrtoneura Hua [<i>P. multiflorum</i> (Linn.) All. var. <i>longifolium</i> Merr.]	310
扛板归	Polygonum perfoliatum Linn.	312
枳壳	Poncirus trifoliata Raf.	314
石柑子	Pothos chinensis (Raf.) Merr.	316
半边旗	Pteris semipinnata Linn.	318
密花树	Rapanea neriifolia (Sieb. & Zucc.) Mez	320
四叶葶苈木	Rauvolfia tetraphylla Linn.	322
太平杜鹃	Rhododendron championae Hook.	323
云锦杜鹃	Rhododendron fortunei Lindl.	324
广东杜鹃	Rhododendron kwangtungense Merr. et Chun	325
鹿角杜鹃	Rhododendron latoucheae Finet et Franch.	326
紫花杜鹃	Rhododendron mariae Hance	328
满山红	Rhododendron mariesii Hemsl. et Wils.	329
黄花杜鹃	Rhododendron molle (Bl.) G. Don	330
毛棉杜鹃	Rhododendron moultmainense Hook.	332
马银花	Rhododendron ovatum (Lindl.) Planch. ex Maxim.	333
南华杜鹃	Rhododendron simiarum Hance	334
杜鹃	Rhododendron simsii Planch.	336
红花荷	Rhodoleia championi Hook.	338
蓖麻	Ricinus communis Linn.	340
茅莓	Rubus parvifolius Linn.	342
白背清风藤	Sabia discolor Dunn.	344
丹参	Salvia miltiorrhiza Bge.	346
檀香	Santalum album Linn.	348
无患子	Sapindus saponaria Linn. [<i>S. mukorossi</i> Gaertn.]	350
三白草	Saururus chinensis (Lour.) Baill	352
虎耳草	Saxifraga stolonifera W. Curt.	354
野甘草	Scoparia dulcis Linn.	356
深绿卷柏	Selaginella doederleinii Hieron.	357
翠云草	Selaginella uncinata (Desv.) Spring	358
菝葜	Smilax china Linn.	360
龙葵	Solanum nigrum Linn.	362
地蚕	Stachys geobombocys C. Y. Wu	364
七叶莲	Stauntonia chinensis DC.	366
粉防己	Stephania tetrandra S. Moore	368
羊角拗	Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.	370
夜来香	Telosma procumbens (Blanco) Merrill [<i>T. cordata</i> (Burm. f.) Merr.]	372
木蜡树	Toxicodendron succedaneum (Linn.) O. Kuntze [<i>Rhus succedanea</i> Linn.]	373
郁金香	Tulipa gesneriana Linn.	374
扁枝越橘	Vaccinium japonicum Miq. var. <i>sinicum</i> (Nakai) Rehd.	376
朱饭树	Vaccinium sprengelii (G. Don) Sleum.	377
夜香牛	Vernonia cinerea (Linn.) Less.	378
绿豆	Vigna radiata (Linn.) Wilczek [<i>Phaseolus radiatus</i> Linn.]	380
熊蕉	Vitis bryoniaefolia Bunge [<i>V. adstricta</i> Hance]	382
苍耳	Xanthium sibiricum Patr. ex Widder	384
两面针	Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.	386
珊瑚姜	Zingiber corallinum Hance	388
蕺菜	Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.	389
姜	Zingiber officinale Rosc.	390
红球姜	Zingiber zerumbet (Linn.) Smith	392
《中国药用植物》第一册中英文索引		394

毛相思子

Abrus mollis Hance

【别名】毛鸡骨草

【基原】来源于蝶形花科相思子属毛相思子 **Abrus mollis Hance** 的全株入药。

【形态特征】木质小藤本，高 1~2m；主根粗壮，直径可达 12mm；茎细长，嫩时密被黄褐色短粗毛，老时毛脱落。偶数羽状复叶互生，有小叶 7~12 对；托叶成对着生，线状披针形；小叶膜质或薄纸质，长圆形或倒卵状长圆形，长 5~12mm，宽 3~5mm，顶端截平，具细尖，基部微心形，上面被疏柔毛，下面被糙伏毛；叶脉两面均突起；小叶柄短。总状花序腋生，短小；花具短梗，聚生于花序轴的短枝上；花萼杯状，长约 3mm，顶端截平，有 4~5 个不明显的小齿；花冠淡紫红色，突出，旗瓣卵状椭圆形，长约 8mm，顶端微凹，翼瓣、龙骨瓣与旗瓣等长；雄蕊 9 枚，花丝下部合生成管，上部分离；子房近无柄，花柱短。荚果较小，长圆形，扁平，长 2.2~3cm，宽 7~8mm，顶端具喙，被淡黄色稀疏短柔毛，2 瓣裂，有种子 4~7 颗；种子长圆形，扁平，黑褐色或黄褐色，光滑，长 5~6mm，种脐小，长圆形，周围绕以蜡黄色隆起的种阜。花期 7~8 月；果期 10~12 月。

【生境】生于疏林或灌木丛中。

【分布】香港、广东、福建、广西、海南。中南半岛也有分布。

【采集加工】夏、秋采收，全株晒干备用。

【性味功能】味甘、淡，性凉。清热解毒，祛风除湿。

【主治用法】治咽喉肿痛，肝胆湿热。用量 3~9g。



台湾相思

Acacia confusa Merr.

【别名】相思树

【基原】来源于含羞草科金合欢属台湾相思 *Acacia confusa* Merr. 的枝和叶入药。

【形态特征】常绿乔木，高 6~15m，无毛；枝灰色或褐色，无刺，小枝纤细。苗期第一片真叶为羽状复叶，长大后小叶退化，叶柄变为叶状柄，叶状柄革质，披针形，长 6~10cm，宽 5~13mm，直或微呈弯镰状，两端渐狭，顶端略钝，两面无毛，有明显的纵脉 3~5 (~8) 条。头状花序球形，单生或 2~3 个簇生于叶腋，直径约 1cm；总花梗纤弱，长 8~10mm；花金黄色，有微香；花萼长约为花冠之半；花瓣淡绿色，长约 2mm；雄蕊多数，明显超出花冠之外；子房被黄褐色柔毛，花柱长约 4mm。荚果扁平，长 4~9 (~12) cm，宽 7~10mm，干时深褐色，有光泽，于种子间微缢缩，顶端钝而有凸头，基部楔形；种子 2~8 颗，椭圆形，压扁，长 5~7mm。花期 3~10 月；果期 8~12 月。

【生境】栽培于山坡疏林。


【分布】香港、广东、台湾、福建、广西、云南。菲律宾、印度尼西亚、斐济也有分布。

【采集加工】全年可采，枝叶鲜用。

【性味功能】去腐生肌。

【主治用法】外用煎水洗，治烂疮。

种子有毒，误食引起腹痛、头痛、恶心。





乌头

Aconitum carmichaelii Debx.

【别名】川乌、附子

【基原】来源于毛茛科乌头属乌头 *Aconitum carmichaelii* Debx. 的根入药。

【形态特征】块根倒圆锥形，长2~4cm，粗1~1.6cm。茎高50~150(~200)cm，中部之上疏被反曲的短柔毛，等距离生叶，分枝。茎下部叶在开花时枯萎。茎中部叶有长柄；叶片薄革质或纸质，五角形，长6~11cm，宽9~15cm，三裂或近基部，中央全裂片宽菱形，有时倒卵状菱形或菱形急尖，有时短渐尖，近羽状分裂，二回裂片约2对，斜三角形，生1~3枚牙齿，间或全缘，侧全裂片不等二深裂，表面疏被短伏毛，背面通常只沿脉疏被短柔毛；叶柄长1~2.5cm，疏被短柔毛。顶生总状花序长6~10(~25)cm；轴及花梗多少密被反曲而紧贴的短柔毛；下部苞片三裂，其他的狭卵形至披针形；花梗长1.5~3(~5.5)cm；小苞片生于花梗中部或下部，长3~5(~10)mm，宽0.5~0.8(~2)mm；萼片蓝紫色，外面被短柔毛，上萼片高盔形，高2~2.6cm，自基部至喙长1.7~2.2cm，下缘稍凹，喙不明显，侧萼片长1.5~2cm；花瓣无毛，瓣片长约1.1cm，唇长约6mm，微凹，距长(1~)2~2.5mm，通常拳卷；雄蕊无毛或疏被短毛，花丝有2小齿或全缘；心皮3~5枚，子房疏或密被短柔毛，稀无毛。蓇葖长1.5~1.8cm；种子长3~3.2mm，三棱形，只在两面密生横膜翅。花期9~10月。

【生境】在四川西部、陕西南部及湖北西部一带分布于海拔850~2150m间，在湖南及江西分布于海拔700~900m间，在沿海诸省分布于海拔100~500m间；生于山地草坡或灌丛中。

【分布】广东、广西、云南、贵州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、江苏、安徽、陕西、河南、山东、辽宁。越南也有分布。

【采集加工】春、秋采收，块根（母根）晒干（为乌头）备用；夏季挖取侧根（子根），晒干（为附子）备用。

【性味功能】乌头味辛，性温，有大毒；祛风散寒，除湿止痛，麻醉。附子味辛，大热，有毒；回阳救逆，温中止痛，散寒燥湿。





【主治用法】 乌头治风湿性关节炎，类风湿性关节炎，大骨节病，半身不遂，手足拘挛，坐骨神经痛，跌打肿痛，胃腹冷痛。用量川乌 3g，附子 6g；内服不宜与半夏、贝母、瓜蒌、天花粉、白及、白蔹同用。孕妇忌服。附子治虚脱，汗出，四肢厥冷，胃腹冷痛，呕吐，泄泻，风寒湿痹，肾虚水肿。用量 3~9g（制附子）。附子不宜与白及、贝母、半夏、白蔹、瓜蒌同用。阴虚火旺者及孕妇禁用。

【附 方】 1. 治风湿性关节炎，类风湿性关节炎，腰腿痛：（1）制川乌、制何首乌各 15g，制草乌 6g，追地风、千年健各 9g。用白酒 0.5kg，将上药浸泡于白酒内，密封 48 小时，过滤备用。每次 5~10ml，每日 3 次。（2）①川乌、草乌、金银花、乌梅、甘草、大青盐各 6g。用 60°白酒 0.5kg 泡 21 天。每次服药酒 5ml，每日 3 次。用于男性病人。②川乌、草乌、红花、乌梅、甘草各 9g，用白酒 0.5kg 泡 7 天，服法同上。用于女性病人。高血压病，心脏病，风湿热，严重溃疡病患者均忌服。

2. 治虚脱汗出，吐泻肢冷：（四逆汤）制附子（先煎）、干姜各 6g，炙甘草 4.5g，水煎服。

3. 治胃腹冷痛，呕吐泄泻，四肢厥冷：（附子理中丸）制附子、人参、干姜各 60g，白术、甘草各 90g，共研末，炼蜜为丸，每丸重 9g，每次 1 丸，每日 2 次。制成片剂，每片 0.3g，每次服 4 片，每日 2 次。

4. 治肾盂肾炎（脾肾阳虚型）：熟附子、白术、山药、党参各 9g，车前子、泽泻、猪苓各 15g，茯苓 12g，桂枝、干姜各 3g，水煎服。

5. 治慢性尿毒症：熟附子、党参、泽泻各 9g，茯苓 12g，生大黄 6~9g，干姜 3g，肉桂 2.4g，水煎服。如大便已溏薄，可将生大黄改为制大黄。或采用生大黄 12g，熟附子 9g，牡蛎 30g，酌情加减。

中华猕猴桃

Actinidia chinensis Planch.

【别名】白毛桃、毛梨子、猕猴桃

【基原】来源于猕猴桃科猕猴桃属中华猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch. 的果实和根入药。

【形态特征】落叶藤本。叶纸质，倒阔卵形至倒卵形，长约 6~17 cm，宽 7~15 cm，顶端截平或凹入或具突尖、急尖至短渐尖，基部钝圆形、截平形至浅心形，边缘具睫毛状小齿，叶面深绿色，无毛或仅中脉或侧脉上疏被短糙毛，背面苍白色，密被灰白色或淡褐色星状绒毛。侧脉 5~8 对；叶柄长 3~6 cm，密被白色绒毛。聚伞花序有花 1~3 朵；萼片 3~7 片，阔卵形至卵状长圆形，长 6~10 mm；花瓣 5 片，阔倒卵形，有短距，长 10~20 mm，宽 6~17 mm；雄蕊极多，花丝狭条形，长 5~10 mm，花药黄色，长圆形，长 1.5~2 mm；子房球形，直径约 5 mm，密被金黄色绒毛。果黄褐色，近球形、圆柱形、倒卵形或椭圆形，长 4~5 cm，被柔软的绒毛，具小的淡褐色斑点；宿存萼反折；种子纵径 2.5 mm。

【生境】生于林缘或灌丛中。

【分布】长江流域以南各省区，北到西北、河南。

【采集加工】夏、秋采收，根、果晒干备用。

【性味功能】果：味酸、甘，性寒；调中理气，生津润燥，解热除烦。根、根皮：味苦、涩，性寒；清热解毒，活血消肿，祛风利湿。

【主治用法】果：治消化不良，食欲不振，呕吐，烧、烫伤。根、根皮：治风湿性关节炎，跌打损伤，丝虫病，肝炎，痢疾，淋巴结核，痈疽肿毒，癌症。用量根 15~60g；果适量，鲜食或榨汁服。

【附方】1. 治丝虫病：猕猴桃根 30~60g，水煎取汁，调猪瘦肉汤或鸡汤服。

2. 治胃癌：猕猴桃根 120g，水杨梅根 90g，蛇葡萄根、并头草各 30g，白茅根、凤尾草、半边莲各 15g。水煎服。

3. 治乳腺癌：猕猴桃根、野葡萄根各 30g，八角金盘、生南星各 30g。水煎服，每日 1 剂。

4. 治麻风病：猕猴桃 120g，鹿蹄草、葎草、牯岭勾儿茶各 30g，天葵子 15g；眼红鼻衄加野菊花 9g。水煎服，每日 1 剂。

