

活人慈航

一丸 祖方神效

香蘇散 香蘇 陳皮 香附 甘草 胃寒作痛加良

草蔻 霍香 桔梗 烏藥

桂枝 湯

草烏 蜜煎和桂枝湯服 桂枝 芍藥 甘草

生薑 三片 束肉 水煎服

五苓散 白朮 茯苓 澤瀉 桂枝 水煎服

八正散 扁蓄 瞿麥 滑石 車前 木通 大黃

枳實 甘草

青木香丸

青木香 柴胡 香附 澄茄 烏藥 小茴

川練肉 各五分 巴豆仁二粒 同川練炒去巴豆

蔥汁丸

千金消癖丸

蘆薈

阿魏

青代

木香

厚朴

煨榔

陳皮

生甘

史君

胡連

山查

香附

山稜

莪朮

紅花

神曲

麥芽

白朮

茯苓

阿魏用醋蒸化和米糊為丸菜豆大米湯下

紅花膏

乳香

沒藥

山稜

莪朮

紅花

血竭

阿魏

當歸

川芎

肉桂

為細末

用赤砂糖

勻貼塊上

各種瘰癧丸

三陵

莪朮

香附

紅花

石

神曲

鱉甲

山查

青皮

砂仁

昆

阿魏

為末醋糊丸菜豆大米湯下

腹脹

錢仲陽云腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下

用紫霜丸白餅子不喘者虛也不可下

皆疑下

氣上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮

四肢母氣虛甚即目胞腮腫四肢黃色治之用塌

消之未愈漸加丸數不可用丁香木香桔皮豆蔻大溫散

藥治之何以然脾虛氣未出故雖腹脹而不喘可以溫散

藥治之使上下分消其氣則愈矣若氣虛已出附肺而行

即脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛實

脾虛則不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿悞

也胃久虛熱多則生渴病或引飲不止脾虛不能勝腎隨

肺氣上行於四肢面目腫若水狀腎氣漫浮於肺即大喘

也此當用塌氣丸病愈後面赤紅者虛衰未復故也

氣丸未下而喘宜下之

後喘者

小兒虛腹脹先用塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便黃時微喘脉伏而實時飲水能食者可下之蓋脾初虛而有積所治宜先補脾然後下後又補脾即愈也不可補肺恐生虛喘

東垣治脹不犯上下二焦用素問中滿者瀉之於內實者分氣消積中滿分消丸消痞丸虛者升陽滋血升陽滋血湯脉黃升麻湯

實脹者腹中原有食積垢糞小便黃腹時痛脉沈實微喘時渴能食宜溫白丸下之次服平胃散

虛脹者或因吐瀉後或因悞服下藥以致內虛而成脹滿宜塌氣丸異功散加厚朴主之

一腹脹喘急氣長出目閉不食者不治當用黑鉛丹塌氣丸合服救之

一脹滿大小便不通嘔吐者不治當用蘓子降氣湯送下半
硫丸救之或塌氣丸半硫丸合服

一腹脹面青肚上青筋寒熱進退脉沈細者不治當以麻黃
升麻湯送下塌氣丸救之

一腹脹喘促驚搐悶亂者不治若先病脹喘後變搐者治同
慢驚若脹喘驚搐同病者宜備急丹下之
凡腹脹背平臍突者不治

中滿分消丸

黃連五分枳實五分厚朴五分黃芩五分兩乾姜三分姜黃三分猪苓三分
砂仁五分茯苓五分澤瀉五分半夏五分陳皮一分白朮一分甘草一分
米糊為丸

消痞丸 黃連五分枳實五分黃芩五分厚朴五分乾姜四分陳皮一分

姜黃五分甘草五分人參五分米糊為丸

腹脹

胃上之下

六

元記

幼科

升陽滋血湯 二月間一小兒未滿百日病腹脹不大便二

日便瘦弱遍身黃色

全蝎分 神麴三分 厚朴不 當歸不 桃仁不 升麻三分

麻黃升麻湯 小兒面色痿黃腹脹食不下

麻黃分 桂枝 杏仁 柴萸 草薢 厚朴 神麴

羌活 茯苓 升麻 蒼朮 澤瀉 陳皮 黃柏各分

柴胡 白朮 青皮 黃連各 朱苓一分

溫白丸 腹中一切諸疾

附子兩 皂角 吳茱 菖蒲 紫苑 柴胡 厚朴兩

枳梗 茯苓 桂皮 乾姜 黃連各 川椒 巴豆霜各

去皮臘油

為末蜜丸桐子大每服三丸漸加至五丸小兒菜

豆大每日服可服五六十日瀉出膿血癰虫肉鯀青蛇為

效惟孕婦勿服

平胃散 蒼朮 厚朴 陳皮 炙甘

錢氏塌氣丸 胡椒 兩全蠍 為末米糊丸粟米大每服

五七丸至一二十丸米湯下

異功散 人參 白朮 茯苓 炙甘 陳皮 加川厚朴

半疏丸 硫黃 半夏

蘇子降氣湯 蘇子 陳皮 半夏 前胡 沈香

當歸 肉桂 甘草

備急丹 大黃 乾姜 巴豆仁 等分 蜜丸菴豆大每服

七丸小兒三丸

水腫

錢仲陽云腫病腎熱傳於膀胱熱盛逆於脾胃脾虛不能制

腎水反尅脾土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫

也若加喘者重也何以然腎水勝而尅退脾土反勝心火

水腫

腎上之下

六十二 元記幼科

心又勝肺肺為心尅故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘實曰此有二一者肺大喘此五臟逆咳二者腎水氣上行傍侵於肺故令喘此皆難治 傍侵者宜葶藶丸

金匱法有風水皮水正水石水腰以上腫宜發汗腰以下腫宜利小便凡水腫必消渴小便不利乃作腫若小便自利有汗出必不作腫治腫宜發汗利小便所謂開鬼門潔淨府也若消渴引飲不止者不可發汗小便不利赤短淋瀝者不可發汗凡水病脉必沈水病若脉不見沈便是浮脉宜發汗水病脉浮於皮膚則比不腫時脉出皮膚外矣是為水病脉出者死

風水一身悉腫脉浮不渴或身微熱或骨節疼痛或身體重而酸是也風水宜發汗越婢加朮湯主之風水脉浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之

皮水四肢腫足跗腫腹如鼓水在皮膚中四肢聶聶動
腐潰而出水或渴或不渴不惡風寒是也皮水亦宜發汗
越婢加朮湯主之麻黃甘草湯亦主之四肢腫水在皮膚
中者防已茯苓湯主之風水皮水忌發汗者宜防已黃
芪湯防已茯苓湯使水從表中之裏而消今所用防已不
同恐誤如口渴小便不利宜五苓散脉浮身重汗出惡風
宜五苓散加黃芪桂枝小便不利淋瀝者茯苓導水湯
正水脉沈遲外症自喘或脉微細或手足冷或腹鳴便澹是
也宜溫臟以驅水桂枝去芍加麻黃附子細辛湯主之脉
沈小者屬少陰宜麻黃附子甘草湯主之陰水脉沈微
大便澹多困大病後腫從下而上通身腫小便不利不
用麻辛者宜腎氣丸大針砂朮主之溫臟驅水從小便出
也

石水脉沈外症腹滿不喘小便不利赤少大便實為水在裏
宜下之神祐丸舟車丸主之若小便白者水非在裏可
下也

曾氏治水腫法先宜解表利小便宜加味五皮飲主之次服
導水茯苓湯香陸胃苓丸有初中便覺痰嗽氣喘小便不
利正屬肺腎所主先服加味五皮飲次投三白散有經久
不消者乃可下之宜神祐丸

萬氏水腫氣喘發表利水後用葶蘆丸治喘 一切水腫并
用蔥姜煎湯熱薰洗浴蓋覆取汗日日當午浴洗

瘡疾日久變為水腫通身腫宜清脾飲加麻黃主之肢冷再
加附子

久病咳喘過於汗下肺不通調水道漸生腫滿通身浮腫此
水出高源宜治其症其肺四肢皆腫少腹不急初起便有喘咳

宜冬陳米煎服

加減五皮飲

麻黃 杏仁 紫蘇 陳皮 腹皮 桑皮 車前

茯苓 草 生姜 葱白 氣喘加葶藶

三白散 治初中腫疾通身浮腫大小便不利皆膀胱蘊熱

風溼相乘

丑牛兩 桑皮五 白朮五 車前五 陳皮五 甘草三

香陸胃苓丸 胃苓散加丁香商陸車前子

水腫貼臍下水法

巴豆仁四 硫黃五 輕粉二 用棉包藥貼臍帛縛時許自

然瀉下惡水待三五次去藥粥補住

越婢湯 麻黃高 石膏高 甘草二 生姜三 大棗十五枚

風水加白朮四 小兒每服二錢煎服

水腫

胃上之二

六十四

元記幼科

防已黃芪湯 防已 黃芪 各三錢 白朮 炙甘草 各二錢 生姜 兩

棗肉 五枚 小兒每服二錢煎服

麻黃甘草湯 麻黃 四兩 甘草 二兩 煎服重覆取汗

防已茯苓湯 防已 桂枝 黃芪 各三錢 茯苓 炙甘草 各二錢

小兒每服二錢煎服

茯苓導水湯 澤瀉 茯苓 麥冬 白朮 各三兩 桑皮

紫蘇 蘇郎 木瓜 各二兩 腹皮 陳皮 砂仁 木香 各七錢半

每服二兩小兒三錢加燈心煎濃汁服

五苓散 白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 各三錢 桂枝 各二錢 代飲止渴

桂枝去芍加麻黃附子細辛湯 桂枝 炙甘草 各二錢 生姜 三兩

大棗 三枚 麻黃 附子 各半 細辛 水煎小兒每服二錢取汗

出愈

麻黃附子湯 麻黃 炙甘草 附子 各二錢 水煎服

金匱腎氣丸 熟地 棗皮 淮山 丹皮 澤瀉 附子

肉桂 茯苓 車前 淮牛夕 或煎服

大針砂丸 十種水氣上氣喘急小便不利但是水氣悉皆

主之

蛇含石

大者三兩以鐵鉋或入炭火中燒蛇黃與鐵子一盤紅鉋取蛇含石入醋中候冷研極細

禹餘糧石

層數多者三兩

針砂

五兩先以水淘淨炒乾入餘糧一處用木醋二升煮乾鉋或入炭火中燒紅取出同礬礬磚地上冷極研細末

羌活

木香

茯苓

川芎

牛夕

肉桂

莢朮

附子

乾姜

青皮

桑菊

三陵

蒺藜

白豆蔻

各半兩

為末入前三味和勻用酒餅打糊丸桐子大小兒菜豆大

白酒下小兒十餘丸大人三五十丸最忌鹽一毫不可入

口否則發疾愈甚日三服兼用溫和調補氣血藥和之病

從小便而出昔人用之屢效真神方也

神祐丸

丑牛兩

大黃兩

芫花

醋炒

紅芽太戟

醋炒

甘遂

根

為末水丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下欲速下者宜八九十九或百餘丸小兒二十九止

舟車丸

丑牛買甘遂

芫花

大戟

俱醋炒各二兩

大黃三兩

青皮

陳皮

木香

檳榔

各漳輕粉各

取虫加蕪蔑

五錢為末糊丸小豆大初服五丸漸加日三服以快利為度

傷風中風傷寒中寒

風邪四時皆有春為風溫夏為風熱秋為涼風冬為寒風季夏為暑風故風為百病之長

寒邪四時皆有霜降以後至春分以前正屬寒令傷之者為正傷寒春應溫而反寒夏應熱而反涼秋主涼涼乃寒之漸但稍輕耳凡風寒皆從皮毛而入於經

感冒風邪輕者謂之傷風風傷皮毛故咳嗽鼻塞流涕聲重

噴嚏重者謂之中風風中三陽經則身發熱惡風頭痛有汗

傷寒輕者傷三陽經傷寒則身發熱惡寒頭痛無汗重者寒中三陰經中寒則厥冷吐利身寒汗出也

傷風者咳嗽鼻塞流涕噴嚏聲重頭痛甚者亦憎寒發熱是也無痰者宜敗毒散有痰者杏蘇散有熱煩渴小便赤者加減雙解散氣喘宜華蓋散麻杏甘石湯

中風者風邪傷衛則身發熱惡風有汗頭痛呵欠面赤目濇多睡脉浮緩是也宜柴葛湯加桂枝白芍以疎風解肌傷寒者寒邪傷榮則身發熱惡寒無汗頭痛呵欠面赤一身疼痛脉浮緊是也宜九味羌活湯以發汗

凡小兒中風傷寒邪在三陽經不必分別三陽用藥但用柴葛湯主之

中風傷寒汗出熱退後有餘熱者宜涼驚丸以治內熱

中風傷寒邪在三陽得汗後仍身熱不退其邪不解必傳入陽明胃府症見壯熱潮熱自汗出煩渴大便閉小便赤脈沈實者宜大柴胡湯重者調胃承氣湯主之

小兒中風傷寒得汗出身熱不退者均宜四順清涼飲主之三陽合病身熱無汗煩渴昏爪紅赤小便白大便泄瀉者是也宜柴葛湯主之嘔吐者加竹茹黃連霍香生姜腹痛嘔吐是夾蛔虫加川椒黃柏檳榔

中寒者寒邪直中三陰經也其症四肢厥冷吐利身寒倦臥汗出脈沈無力是也宜附子理中湯主之但吐利寒熱脣不紅者宜寸金丹正氣散溫服散

風寒之邪在三陽經身熱不解或嘔吐或煩躁其邪必傳入三陰經症見四肢厥冷煩躁口渴無汗出心胸熱其脈沈