

尙論張仲景傷寒論太陽本經諸方脈症後四卷之三

西昌喻昌嘉言甫著

尙論諸方大意

仲景一百一十三方用本草九十一種耳仲景上溯神農
本經藥三百六十五種效法周天三百六十五度之數應
三才而合四時妙義開天也仲景取述神農本經藥品纔
九十一種入傷寒論中輔相裁成有合六經之大綱者有
合六經之一目者蓋神農百病兼收而仲景則由六經以
例百病所以於上古本經取裁九十一種用之不盡萬世
而後星日炳然聖之又聖者矣梁陶隱君別錄倍之爲七
百三十種迨唐本圖經證類宋嘉佑政和旁搜編錄於是

旁門捷徑各自成名者多矣而仲景宮牆生色間出英賢
數十輩尤爲不孤識大識小總計一千七百四十六種病
雖百疾藥無纖漏天下後世永賴焉然一千七百四十六
種顯現億兆如同一日昭式乃至漸推漸廣觀察盡矣仲
景九十一種賢哲挺生莫識厥旨昌也晚進無識手集神
農本經竊以傷寒論中藥品爲主其晉唐以後諸賢發揮
傷寒論全方有得者亦一一錄出而昌亦少步尙論諸方
之後總欲門下好學隨證問藥一目瞭然無檢書之苦難
是慰耳

太陽經風傷衛方

辨中風證用桂枝湯解肌大綱總法

桂枝湯方

桂枝

三兩去皮
味辛熱

芍藥

三兩味苦
酸微寒

甘草

二兩炙
味甘平

生薑

三兩切
味辛溫

大棗

十二枚
味甘溫

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升
服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身
熱熱微似有汗者益佳不可令如水淋漓病必不除若一服
汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後
服小促役其間半日許合三服盡若病重者一日一夜服周
時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至
二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出

寒淅淅惡風翕翕發熱宜桂枝湯

仲景原文

風之傷人也頭先受之故令頭痛風在表則表寔故令發熱
風爲陽邪衛爲陽氣同類相從則傷衛外之氣衛傷則無以
固衛津液故令汗出其惡風者衛氣不能衛也其脈緩者衛
氣不能鼓也上件皆太陽症故曰太陽中風桂枝辛甘辛則
能解肌甘則能寔表內經曰辛甘發散爲陽故用之以治風
然恐其走泄陰氣故用芍藥之酸以收之佐以生薑甘草大
棗此發散而兼和裏之意是方也惟表邪乃可用之若陽邪
去表入裏裏作燥渴二便秘結此宜承氣之時也而誤用之
則反矣昌按承氣之誤庸者固然而工者誤在微細仲景諄
切不似此項逐條本文詳玩始獲

凡桂枝湯病症者常自汗出小便不數手足溫和或手足指
稍露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而又憎寒始可行之
若病者無汗小便不數手足溫和或手足逆身冷不惡寒反
惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也脈緊必無汗無汗不可
誤作桂枝症此脈與證仲景說得甚明後人看不透所以不
敢用此方假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒
淅惡寒也尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也
此謂元氣受病而然也又曰陽微則惡寒陰弱則發熱醫既
汗之使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所使也大抵陰
不足陽往從之故陽內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上
入陽中則惡寒舉此二端明白易曉何憚而不用桂枝湯哉

仲景治表虛製此湯桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者親上故桂枝爲君芍藥甘草佐之如陽脈濇陰脈弦腹中急痛乃製小建中湯以芍藥爲君桂枝甘草佐之一則治其表虛一則治其裏虛故各有主用也

以桂枝易肉桂治傷寒腹痛神品藥也如夏中熱腹疼少加黃芩去桂痛立止桂於春夏二時爲禁藥

按經云桂枝入咽陽盛則斃春夏發者爲禁藥也桂能動血血熱者爲禁藥也木得桂而死肝不足者爲禁藥也

桂枝湯有禁用三法

仲景本文并昌論

中風病主用桂枝湯解肌和營衛七法

本文并昌論

汗後水氣上逆有禁更汗增滿一法

本文并昌論

或問桂枝湯發字之義曰一桂枝耳或云發汗或云當得汗
解或云當發汗更發汗宜桂枝湯者數方是用桂枝發汗也
復云無汗不得用桂枝又曰汗家不得重發汗又曰發汗過
多者都用桂枝甘草湯是閉汗也一藥二用如何說得仲景
發汗與本草出汗之義相通爲一答曰本草云桂味辛甘熱
有毒爲百藥之長通血脈止煩出汗者是調血而汗自出也
仲景云藏無他病發熱自汗者此衛氣不和也又曰自汗者
爲營氣和營氣和則外不諧以衛氣不與營氣和諧也營氣
和則愈故皆用桂枝湯調和營衛營衛和則汗自出也風邪
由此而解非桂枝能於腠理發出汗也以其固閉營血衛氣
自和邪無容地而出矣其是則閉汗孔也昧者不解閉汗之

意凡是病者俱用桂枝湯發汗若與中風自汗者合効如桴鼓因見其取效而病愈則曰此桂枝發出汗也遂不問傷寒無汗者亦與桂枝湯誤之甚矣故仲景言無汗不得服桂枝是閉汗孔也又曰發汗多又手冒心心悸欲得按者用桂枝甘草湯是亦閉汗孔也又曰汗家不得重發汗若桂枝湯發汗是重發汗也凡桂枝條下言發字當認做出字是汗自然出也非若麻黃能開腠理而發出汗也本草出汗二字上文有通血脈一句是非三焦衛氣皮毛中藥是爲營血中藥也如是則出汗二字當認作營衛和自然汗出非桂開腠理而發出汗也故後人用桂治虛汗讀者當逆察其意則可矣噫神農作於前仲景述於後前聖後聖其揆一矣

不解肌或誤汗病邪入裏用五苓兩解表裏二法

一法水逆用之多服煖水汗出愈

一法脈浮小便不利微熱消渴者用之

五苓散方

猪苓

十八銖
去皮

茯苓

十八銖

澤瀉

一兩
六銖

白朮

十八銖

桂枝

半兩

右五味爲散以白飲和服方寸七日三多服煖水汗出愈
不解肌而誤發大汗其變逆有救亡陽漏風二法

一法真武湯

一法桂枝加附子湯

真武湯方

此本少陰經之神方并加減法而太陽上篇先錄之至

太陽下篇尤宜緊要先同錄此

茯苓

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩切片

白朮

二兩

附子

一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

桂枝加附子湯

於桂枝湯內加附子一枚餘依桂枝湯法

不解肌而用燒鍼取汗寒入核起灸核止變一法

桂枝加桂湯更加桂

於桂枝湯方內更加桂枝二兩

中風肌未解不可下宜用桂枝湯解外一法

桂枝湯

方見前

不解肌反誤下邪不服者於前下藥內更加桂枝湯一法
卽桂枝大黃湯之互詞因上衝陽位故兩解之也不上衝
者不用此方

不解肌反誤下心痞用溫補藥兩解表裏一法

桂枝人參湯 卽理中加桂枝而易其名也

桂枝 四兩 去皮

甘草 四兩 炙

白朮 三兩

人參 三兩

乾薑 三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂枝更煮取三升去
滓溫服一升日再服夜一服

或問大柴胡瀉也桂枝人參湯補也何爲皆治下利心下痞
鞭曰此非裏熱乃下之早因作痞裏虛協熱而利表又不解

故與桂枝人參湯和裏解表若夫傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而不利者表和而裏病也以心下痞鞭故爲實當以大柴胡下之二者心下痞鞭雖同而虛實之症有別故用藥有攻補之異

不解肌反誤下邪入陽明變用太陽兩解一法

葛根黃連黃芩湯方

葛根

半斤

黃連

二兩

黃芩

三兩

甘草

二兩炙

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

不解肌反誤下宜辨陽實陽虛加減桂枝湯一法

桂枝去芍藥湯

下之後脈促胸滿於桂枝湯內去芍藥一味餘依桂枝湯法

去芍藥方中加附子湯方

下之微惡寒於桂枝湯內去芍藥加附子一枚

不解肌反誤下陽邪作喘有用桂枝加行氣藥一法

桂枝加厚朴杏仁湯 於桂枝湯方內加厚朴二兩杏仁

五十個餘依桂枝湯法

中風病不解熱結膀胱下血有先表後裏一法

桃仁承氣湯 外不解者尙未可攻宜桂枝湯外解已少

腹急結可用此攻

桃仁

五十個
去皮尖

桂枝 二兩

大黃

四兩

芒硝

二兩

甘草

二兩

右五味以水五升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利

中風病不解熱瘀蓄血明辨脈症用抵當湯二法

一法發狂蓄血重證

一法再辨脈證法中之法

抵當湯方

水蛭

三十個

蟪虫

三十個去翅足熬

大黃

三兩

桃仁

三十個去皮尖

右四味爲散以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服中風病下後復汗因虛致冒先汗解後議下一法遵內經虛者實之之義汗法下法並不出方若論用藥表無過桂枝裡無過大柴五苓矣

中風病表裏已虛餘邪未解辨脈用治迥異初病一法

桂枝湯

陽脈微者用此方

見前

調胃承氣湯

陰脈微者用此方

見後

中風病嘔利痞滿表解可攻與攻胃實迥異一法

十棗湯方

芫花

熬

甘遂

大戟

大棗

十枚

右三味等分各別搗爲散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢七羸人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜

粥自養

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒此表解裏未和也十棗湯主之

熱音蟄

按大棗純得土之中氣兼感天之微陽以生故味甘氣平又溫氣味俱厚陽也入足太陰陽明經經曰裏不足者以甘補之又曰形不足者溫之以氣甘能補中溫能益氣甘溫能補脾胃故主治安中補脾補中益氣此方三味皆峻利故用肥棗十枚蓋戎衣一著大發鉅橋之意所以題之曰十棗湯表其用之重也

按神農本經云薏花味苦寒主傷寒溫瘧下十二經水破積