

活人慈航

九

蜀漆散

此瘧多寒亦治溫瘧加蜀漆半分

蜀漆

雲母

龍骨

為散漿水服半錢匙臨發服

小柴胡湯

柴胡黃芩半夏人參炙甘草棗

桂枝羌活湯

桂枝羌活防風甘草

麻黃羌活湯

麻黃羌活防風甘草

清脾飲

白朮

厚朴

炙甘草

草薢

青皮

柴胡

黃芩

半夏

茯苓

大棗

薑

截瘧丸

治久瘧不已形氣實者

人言

綠豆一兩

各為末和勻水丸菴豆大陰乾發日

五更冷水送下五丸或七丸

半夏瀉心湯

指南

半夏

黃連

黃芩

乾姜

生薑

枳實

大棗

雙解散

改定

防風

荊芥

川芎

桔梗

連翹

薄荷

石膏

滑石

黃芩

梔子

大黃

朴消

麻黃

甘草

乾葛

生薑

柴葛湯

柴胡

黃芩

葛根

羌活

防風

薄荷

花粉

甘草

魚退

加細辛

暑再加香茹黃連

滌痰湯

半夏

茯苓

陳皮

竹茹

枳實

南星

石菖蒲

甘草

生薑汁

元明粉

麻桂柴物湯

是四方合一

麻黃

桂枝

桃仁

白芍

甘草

柴胡

黃芩

羌活

當歸

川芎

生地

姜棗

小柴胡湯加常山三青皮五寅時服復渣辰時服如吐任其

吐去痰涎若熱實加大黃久瘧加桃仁當歸義木

三消飲吳奇

枳榔 厚朴 草薺 柴胡 葛根 羌活 甘草

黃芩 知母 大黃 生薑

丹青散 治溫瘧暑瘧熱多者尤效

青蒿 為末每服二錢陳茶赤沙糖調服 瘧來日早瘧

前一時服瘧來日晏瘧後一時服 此走少陽入厥陰涼

血散血治留熱在骨節間亦可治榮舍之伏邪所謂惟瘧

血憎寒熱故常效

瘧母丸

鱉甲三三陵 義木各香附三阿魏三 醋製為丸

養胃湯

瘧疾

義下之下

四

雜症

蒼朮

厚朴

半夏

各陳皮

炙甘

各五分

茯苓

草果

藿香

各

每服一兩

姜枣煎服

羌活麻黃湯

麻黃

羌活

防風

各

甘草

一

涼膈散

黃芩

梔子

連翹

薄荷

大黃

朴消

甘草

竹葉

補遺伏暑瘧疾瘧來先手足冷或但足冷或手足指冷則發

大熱口渴引飲煩心小便赤大便調和舌有白胎或無胎

有汗出頭重身疼不眠其脉必沈弦或兼緊兼數此瘧邪

在少陽之裏宜大柴胡湯去大黃無下症也加入桂枝乾

葛朴消滑石青蒿以退潮熱數劑必愈若無汗出頭痛

身疼表症急可加麻黃紫蘇大熱必口渴若口燥不甚渴

或煩心甚或兼熱來神識昏憤其脉必帶滑或滑數此夾

痰也必加入半夏南星瓜蒌陳皮苓朮之類重則佐以生

薑汁煩甚不安用半夏五錢生薑汁一盞冲服瘧來心

胸痞塞氣促邪結在膈可加蘇子芥子萊菔子枳殼桔梗
瓜蒌陳皮 熱甚大便不通或舌胎黃或因熱燒及昏皮
破爛此均屬下症宜加大黃錢半或二錢下之甚則大柴
胡湯涼膈散益元散三方合服以退其熱有表症宜雙解
散汗下之 若在暑月脉虛弱其人形體實不可作虛治
暑月脉虛故也故曰毋以脉診以症為率

加味大柴胡湯

手足冷者衛氣不行四末故也

脉沈者屬裏屬氣也

柴胡

半斤

黃芩

一斤

半夏

一斤

乾葛

二斤

桂枝

半斤

枳實

半斤

滑石

三斤

青蒿

二斤

甘草

五斤

枳實

半斤

生薑

三斤

嘔吐加生薑汁

口渴去半夏加花粉

此案原本無同治丙寅恭進父命補錄之

自汗盜汗

脉法醫通云汗家腠理疎豁其脉必緩

兼浮為風

兼滑

為痰 兼大為熱 兼弱為衛虛 兼乳為失血 兼澀

為氣虛 兼細為陰虛 經云肺脉軟而散當病灌汗肺

脉緩甚為多汗尺澀脉滑謂之多汗 金匱師曰男子平

人脉虛弱細微者善盜汗也

不治症 汗出喘甚者不治 汗出而脉脫者不治 汗出

而身痛甚者不治 汗出髮潤至顛者不治 汗出如珠

者不治 汗出如膠之粘如珠之凝及汗出淋漓如雨指

拭不逮者皆不可治

自汗盜汗如風溼風溫溼熱溼溫溫熱暑病傷寒中風時疫

三陽合病少陽餘熱亡陽中寒二感等症另詳

自汗者衛氣虛而肌表不固也宜玉屏風散牡蠣散 常自

汗出為榮衛不和合宜桂枝湯汗之則愈 若食少無味

形羸者宜桂枝湯而自汗出者宜黃芪建中湯黃芪六一湯

得陽虛甚則傷及元陽惡寒厥冷倦臥自汗出者宜芪
附湯脈微欲絕宜參附湯或陰盛格陽身冷自汗陰躁
欲坐坑水中脈浮而數按之如無宜真武湯冷服身重
脈細肢冷自汗宜附朮湯陽虛兼脾溼也病後產後氣
血俱虛自汗盜汗脈虛弱者宜十全大補湯去川芎加棗
仁五錢或生脈散加黃芪當歸棗仁一服立愈陰虛則
火浮於肌表肌表熱則腠理開而自汗出此自汗是陰虛
如形瘦脈細失血亡精而自汗出者宜當歸六黃湯秦艽
鱉甲散

寐則汗出寤則汗止謂之盜汗為陰虛熱浮於表宜當歸六
黃湯六味地黃丸加五味子蒸熱盜汗脈細數秦艽鱉
甲散秦艽扶羸湯衛陽虛不能鼓其脈氣於腠理則不
能約束津液當衛行陰之時腠理開不固則盜汗出醒則

行陽之氣復於腠理則汗止此盜汗屬衛陽虛也如形衰
色黃食少無味脉來虛微細弱而多盜汗者宜黃芪建中
湯

痰涎阻礙中氣則衛氣亦不運行亦有自汗宜二陳湯痰消
汗止 酒客臥則溼熱不行蒸於肌表亦有盜汗宜五苓
散 陽明胃熱則火浮脉緩而大者涼膈散胃熱火浮亦
有自汗盜汗

頭汗者頭以上出汗頸以下無汗有陽虛不固病後產後脉
虛微者宜黃芪六一散 亦有瘀血內蓄逼其津液隨三
陽以上行頭汗出漱水不欲嚥腹中有痛素作勞性急或
跌打損傷脉弦亢宜犀角地黃湯加大黃產後畜血宜桃
仁承氣湯下之 亦有食滯中宮熱氣上薰而頭汗出氣
口紫或惡食痞 宜保和丸 水香換鄰丸

到半邊有汗半邊無汗此衛氣不能週於左右也宜養榮湯
候元氣稍充即間服小續命湯一貼以開發其表 陰間
出汗屬肝腎有溼熱熱則此處出汗也宜龍膽瀉肝湯
手足出汗有脾中溼熱蒸於四肢宜二陳湯加黃連白芍
有脾氣虛不能固於四肢宜理中湯加烏梅 凡自汗用
參芪水附不應此風邪伏於經絡暫與參蘇飲病已止服
此及治也 盜汗大如雨久不愈因懃諸藥無應余用侯
氏黑散立愈

方

黃芪六一湯 治諸虛不足肢體勞倦胸中煩悸時常焦渴
唇口乾燥面色痿黃不思飲食
黃芪六兩 炙甘草 大棗三枚

芪附湯 氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪系 附子二系

玉屏風散 防風 黃芪各系 白朮系

牡蠣散 治盜汗自汗

黃芪系 麻黃根系 牡蠣三系

當歸六黃湯

當歸 生地 熟地乾 黃柏 黃芩各系 黃連五分

黃芪二系 水煎服

真武湯

茯苓 炒芍 生薑 白朮各系 附子四系

黃疸

內經 目黃者曰黃疸 身痛而色微黃齒垢黃爪甲黃黃

疸也安臥小便黃赤脉小而溫者不嗜食 溺黃赤安臥

黃疸 食已如飢者胃疸 腎所生病為黃疸 黃疸

暑病類疾厥狂久逆之所生也 風者百病之長也今風

寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱當是之時可汗

而發也或痺不仁腫痛當是之時可湯熨及火灸刺而去

弗治肝傳之脾病名曰脾風發瘧腹中熱煩心出黃

仲師曰傷寒脉浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者

當發身黃若小便自利者不能發黃 陽明病被火額上

微汗出而小便不利者必發黃 陽明病無汗小便不利

心中懊懣者身必發黃 陽明病面合赤色不可攻之必

發熱色黃小便不利也 陽明病有熱面赤是太陽陽明也若誤攻之則陽明耳熱不解更傳入太陰而發黃 脉沈渴

欲飲水小便不利者皆發黃 疸而渴者其疸難治疸而

不渴者其疸可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振

寒而發熱也 黃疸治其淫熱其渴不止者淫熱甚而難治也其渴止者淫熱有退而易治陰部傷飲食 黃疸之病當以十

八日為期治之十日以上瘥反劇為難治 十八日三瘳 寸口脉

浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必

黃痰熱以行病在陰命曰痺寸口診示即三部脈邪入太陰脾主濕鬱成熱濕熱相合脾統血淫熱傷血血色則止於之也見於外色黃為黃疸也淫熱傷血血脈未甚

則色黃如枯子色跌陽脈緊為傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃

中苦濁濁氣下流小便不通陰被其塞熱流膀胱身體盡

黃名曰穀疸夫食或胃風寒則宿不消化胃氣不行小便不通則淫鬱成熱蓋於脾淫無餘則色黃發於外為穀疸外感六氣及宿食穀疸則無於血黑疸

跌陽診內即氣口脈額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便

自利名女勞疸腹如水狀不治及勞下焦虛則脾上下乘腎水脾經濕熱聚於膀胱而成黃血發黃頭黑為女勞疸酒家淫甚於脾淫熱發色

血脈且甚則色黑心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸

黃見於外為酒疸日久其變黑諸黃家但利其小便假令脈浮者當以汗解之

宜桂枝加黃芪湯黃疸浮乃在表宜麻黃湯酒渴苦脾浮有汗出宜桂枝加黃芪湯服後以稀粥取汗師曰病黃

疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時火劫其汗二熱相得

然黃家所得從溼得之一身盡發熱而黃壯熱熱在裏當

下之黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實

當下之宜大黃硝石湯

此乃

黃疸病小便不利者茵陳五

苓散主之

陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但

頭汗出身無汗齊頸而還小便不利渴飲水漿者此為瘧

熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

傷寒瘧熱在表身必

發黃麻黃連翹赤小豆湯主之

傷寒身黃發熱梔子蘗

皮湯主之

諸黃胸滿而嘔者小柴胡湯主之

傷寒七

八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

七八日傳

腹滿身痿黃躁而不得睡屬黃家

穀疸之為病寒

熱不食食則頭眩心胸不安久久發黃為穀疸茵陳蒿湯

主之

續法胃疸湯柴胡茵陳枳實穀芽散

黃家日晡

所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急腹滿身盡黃額

上黑尺下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溇此

女勞之病水水也腹滿者難治硝石礬石散主之

年後寒熱非外感者屬陰

虛腹滿膀胱急小便利大便黑是下焦畜血症腹滿是癰極陰然

故難治 血瘀甚則色黑因作黑症

續法色黑者猪

膏髮煎色黃如金者胃疸湯

酒黃疸者或無熱謔言小

腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沈弦者先下之

夫病

酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其症也

酒

疸心中熱欲吐者吐之愈

酒黃疸心中懊憹或熱病梔

子大黃湯主之

酒疸下之久久為黑疸目青而黑心中

如噉蒜薤狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微

黃故知之猪膏髮煎主之

續法吐用梔子豉湯虛用葛

花解醒湯

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可

除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之

男子黃小便自利

當如虛勞小建中湯

陽明病脉遲食難用飽飽則發煩

頭眩小便必難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者

脉遲故也

按此當用理中湯

傷寒發汗已身目為黃所以然者

以寒溼在裏不解故也以為而可下也於寒溼中求之一
陰黃者厥冷脉沈或服寒涼過多變為陰黃或因過食寒物
而成四肢厥冷通身皮膚皆冷心下痞鞭自利倦臥宜茵
陳附子乾姜湯 曹姊丈初身熱煩渴心肯痛用避瘟丹
雙解散次日目黃腹黃小便黃赤手足冷如冰煩躁脉微
有汗出作溫邪傳入厥陰治用四逆散三服來復丹一服
厥回躁止胃脘右邊痛用柴胡枳實散治少陽服二貼第
三日身大熱面赤如硃有汗鼻衄口大渴脉洪數而浮此
傳陽明散漫之熱用三黃石膏湯一貼熱渴面赤并退全
愈

準繩云大法宜利小便除溼熱 脉浮腹中和宜汗 脉浮
心中熱欲吐者宜吐 脉沈心中懊懣或熱痛腹滿小便
不利而赤自汗出宜下 脉不浮不沈而弦胸滿嘔吐宜

和解 脉沈細無力身冷而黃或自汗泄利小便清白為
陰黃方可用溫藥 男子大便自利宜補 飢飽勞役內
傷中氣變寒病生黃宜補 治疸須分新久新病初起即
當消導攻滲如茵陳五苓散茯苓滲瀝湯無不效者 久
病又當變法脾胃受傷日久則氣血虛弱必用補劑如參
朮健脾湯當歸秦艽散若口淡怔忡耳鳴腳軟脉虛微細
弱當作虛治宜養榮湯四君子湯送下八味地黃丸 脫
血面黃病後面黃宜補

食勞瘡黃俗名黃胖宿病也至有久不愈者宜小溫中丸棗
礬丸 目黃而身不黃者經云風氣與陽明入胃循脉而
上至目內眥其人肥則風氣不能外泄則為中熱而目黃
煩渴引飲按此當用通聖散加茵陳

歌括面目身黃但欲安臥小便渾黃此黃疸也如食已如饑