

活人慈航

氏曰赤白帶下皆因七情內傷或下元虛冷感非一端大
率下白帶多間有下赤者并宜順氣散吞震靈丹仍佐艾
附丸或米飲調沙參末帶下不止成疔癰者四物湯加牡
蠣半錢吞固腸丸多服取效有帶疾愈後十二月或再發
半年一發先血而後下帶來不可遏停蓄未幾又復傾瀉
此名漏帶最為難治 下截之血小腹主之有因血虛而
虛熱陷入膀胱致小便澀痛色如白泔或成砂粒皆不可
作淋治宜四物湯合五苓散和煎注自是二種治法燥淫合煎元
故不淋痛
下是子宮精竅而來

產寶云未出女子有三病一者經水初下陰中熱或當風臥
或扇風二者太衝脈盛氣盛則內熱以冷水洗之三者或
見丹下驚怖三者一有所受後必有帶下之症方用聚寶丹

萬氏云帶下之病婦女多有之赤者屬熱兼虛兼火治之白

者屬溼兼虛兼痰治之年久不止者以補脾胃為主兼升
提大抵瘦人多火肥人多痰要知此候 赤帶用四物湯
加芩連升麻丹皮兼服三補丸 白帶用六君子湯加蒼
朮升麻柴胡兼服蒼朮導痰丸 久帶不止者專以補虛
為主宜十全大補湯去熟地黃加陳皮半夏乾姜及服補
宮丸

葉先生醫案舌光赤頭脹身熱帶下如注此五液走泄陽浮
熱蒸當用攝劑若與鹿角霜砂苑仍是升舉動陽則無效
矣熟地阿膠芡實茯神蓮子淮山桑螵蛸棗皮 崩帶淋
瀉陰從下走暈厥汗出陽從上冒逢穀雨暴山身中陰陽
不相接續怕延虛脫戌亥時為劇肝腎病治人參阿膠龍
骨牡蠣五味扶神又血流去則陰失守神不內附致目
中亡見非危崇也當先

若驟用陰藥則有妨

胃納與人參龍骨五味茯苓芡實蓮子又帶淋黃白赤帶
五更心悸汗出人參枸杞五味茯苓芡實蓮子 女科病
多倍於男子而胎產調經為要淋帶疲泄奇經虛空腰背
脊脊痺痺似墜而熱氣反升於上從左而起女人以月為
先天也醫人不曉八脉之理但指其虛剛如桂附柔如地
味皆非奇經治法先以震靈丹固之每服一錢五分又帶
淋疲泄諸液耗必陰傷此參附姜桂却陰不效而膠地陰
柔亦不能效蓋脉隨氣散不攝陰藥沈降徒擾其滑耳必
引之收之固之震靈丹意通則達下瀉則固下惟其不受
偏寒偏熱是法效靈矣後方常用人參鹿角霜沙苑桑螵
蛸枸杞茯苓神效甘丸方人參鹿茸兔絲破故脂紫石英餘
糧石茯苓小茴遠志晚服妙香散三錢 寡居獨陰自多
愁煩思鬱加以針黠目注疑神陽上巔為眩暈八脉無氣

白帶下下冷內風日動癩疹麻木常為隱現以煖下柔劑
和其陰陽可得小效首為胡麻枸杞菊花棗肉丸早上服
四錢產後漏淋成帶入暮溺頻不爽驚恐成呆骨節盡
痛是肝腎內損漸及奇經不司束固是產後虛在下甘辛
潤補肝腎不與燥藥以腎惡燥肝忌剛也枸杞鹿角霜當
歸兔絲杜仲沙苑茯苓補骨脂

準繩云帶下并腰有敗膿淋瀝不已腥穢殊甚遂致臍腹更
增冷痛此蓋敗血所致卒無已期須以此排膿用白芷一
兩灰薑仁白芍白礬各五錢為末以蠟為丸桐子大米飲

下十五丸膿盡別以補藥佐之按難丸蜜丸亦可

自服此丸婦人腸中有膿者亦宜服之千餘日敗膿盡可下不可下之異宜參看之

萬氏云最要分辨白帶白濁

別白帶者時常流下白濁者時常流下

隨小便而來渾濁如泔此胃中濁氣滲入胞中也白淫者
常在小便之後而來亦不多此男精吸入子宮而不攝滑
而自出也三者皆由胞門而來也李氏曰又有日夜流津
如清米泔或如黏膠者謂之白崩與白濁大同多憂思過
度所致誠難治療用四七湯下白丸子或喜丸之類按此即
女亦有患者非關七情所致宜草薢分清飲加黃柏為是或導赤丸益之散之類
坐熱傷陰滲入子宮所以下流而不疼痛 萬氏治白濁用二陳湯加蒼朮益智升
麻柴胡治中焦使淫熱不下流也日久者用

方

清白散 治帶下綿綿不止

當歸 川芎 白芍 生地 黃柏 椿根皮 貝母各一錢

炮乾姜 甘草 各五分 炮乾姜從治也

赤帶加黃芩荊芥 久下加熟地牡蠣註此丹溪法然配四物似
與瘦人有火者相宜

勝淫丸 治赤白帶因淫熱勝而下者

帶下

丸下之下

五

女

蒼朮 白芍 滑石 各兩 椿根皮 二兩 炮乾姜 二兩

生記

地榆 枳殼 甘草 各三 為末糊丸服百丸

或加神麴黃柏 或加香附黃連白芷側柏兼治七情所傷而脉數者

地榆散 治漏下五色一十二帶兼治下血 本草註一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰

蝕五日子臟堅六曰子門閉七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五臟五定

地榆 三兩 用醋水各半升煮食前服一合

註以三兩醋煎白得單方用法能治十二症亦一家病也

苦練 治赤白帶下甚妙 註下痢痛者尤宜

苦練 小茴香 當歸 等分 酒糊丸 桐子大服三五十九

滲淫導痰飲 治淫熱痰積滲入下焦白帶不止

白朮 芩水 半夏 陳皮 茯苓 白芷 香附 各分

炙甘草 煎服有熱加黃芩 血虛如芎歸 氣虛加參芪

久不愈加升麻柴胡升提之
註總治中州之溼蓋中焦清則無溼下流故帶白止豈有滲入下焦之理
已上治溼熱方

萬安散 治女人赤白帶下或出白物如脂或有臭濁污水

并神效 註此氣實溼痰以利氣溫行導水

小茴香 木香 各二分 黑丑牛 一兩取頭末 為末生薑汁調

服二錢取盡惡物為效未盡間日再服二錢忌熱物

導水丸 治溼熱鬱於下焦赤白帶下不止燥熱煩渴

人黃 黃芩 各兩 丑牛 頭末 滑石 各四兩 為末水丸 註妙在氣血二分

已上治熱寬結

胃風湯 治風邪入於胞門或中經脈流傳臟腑帶下五色

人參 白朮 茯苓 當歸 川芎 白芍 肉桂

腹痛加木香 五積散亦可用 按此白帶下五色便是風邪胃風五積詳虛實而用俱效

蒼蘗參芎散 治婦人上有頭風鼻涕下有白帶 按此症亦少有存其方法也

辛黃 川芎 蒼朮 黃柏 南星 半夏 滑石

牡蠣 黃芩 水煎服 註此丹溪先生方以芩黃川芎而治頭風蒼柏

已上祛風寒 星半清壯而治白帶平正無奇令人可法

衛生湯 帶下不止脉微弱腹痛 註此亦建中法

黃芪 三兩 當歸 白芍 各 炙甘草 兩 每服半兩下苦練丸

註腹痛故 用苦練丸

補中益氣湯 治勞役過度飲食不節損傷脾胃以致陽氣下陷 白帶下久不止

六君子湯 治胃有痰飲食減少中氣不和時時帶下 按守補之藥原是治本

歸脾湯 治思慮過傷脾氣以致健忘怔忡驚悸不寐忘情嗜臥不思飲食時常 白帶不止

已上守補

養榮 絲凡 治赤白帶下北寒不熱得其和乎功

生子 按此二劑有子可經入脉屬肝腎也北方補腎補血而兼溫清非調收不

肉桂 當歸 白芍

川芎各二兩

牡蠣

烏鰂魚骨各八分

五味子

防風

黃芩各五兩

艾葉三斤

為末蜜丸桐子大鹽湯下四五十丸早晚服

補腎

補宮丸

治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形瘦崩中帶下

鹿角霜

白芍

白朮

茯苓

淮山

白芷

白薇

牡蠣

烏鰂魚骨

等分

糊丸

註此又別是一種意是不用歸地川芎者慮其溼滑行血也變局如此何不固事制宜按此只重在崩中帶下以致形瘦骨熱不妊故用燥溼固滿以治崩帶補濁

丹溪方

治白帶真陰虛者

龜板

枸杞

黃柏各二兩

香附

棗皮

苦參

貝母

椿根皮

白芍

各半兩

炮乾姜

京牛

為末糊丸

註丹溪治帶主於溼熱其意以腎主閉藏而下焦者肝腎主之然溼從中焦生故其方如此宜讀本草而熟思之應變無窮可為執方一洗塵補陰去熱溼

千金方 治帶下脉數者陰虛有熱也

生地黃

五兩

枸杞

一兩

水煎服

註此方有起見非真入不能立按人瘦口乾口燥大便堅實乃宜

滋補陰液

補真固經湯

一婦白帶久漏服諸藥不效診得心胞尺脉

極微其白帶流而不止脉訣云崩中日久為白帶漏下多

時骨水枯言崩中者始病血崩不已久下則血少復亡其

陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津液俱亡乾

枯不能滋養筋骨以本經藥行經藥為引為使以大辛甘

油膩之藥潤其枯燥而益津液以大辛熱之氣味補其陽

道生其血脉以苦寒之藥泄其肺救其上熱傷氣以人參

補之以微苦辛之藥佐而益元氣名曰補真固經湯

人參

乾姜

各錢半

黃芩

郁李仁

柴胡

炙甘

各錢

陳皮

各錢

白葵花

十六兩

水煎服

註東垣立方必原脉原症原藥然後沈思審處且又引前言為証故治病多效
今不能然何怪乎病之不瘳也此方以參姜益陽李仁葵花潤燥柴胡升清
於下陳皮和胃於中黃芩清肺熱非深思者
不能主此方名曰補真蓋以真氣為本

助陽湯

治白帶陰戶中痛控心而急痛身黃皮緩身重如

山陰中如水

一名升陽燥淫湯

按此症稀少註此治重在陰中如水痛控

足以往升陽葵李潤枯滋燥甘陳和中黃芩涼氣分之熱能與前方參之自
有解準繩註二方葵花李仁之滑以潤燥蓋枯涸滯者宜之

柴胡一錢二分

良姜二錢

防風

郁李仁

乾姜

甘草各錢

白葵花七朵

陳皮

黃芩

各五分

煎服

已上寒熱潤

固真丸

治白帶大下不止臍腹疼痛其寒捫之如水陰中

亦然目中溜火上壅視物眊眊無所見齒皆惡熱飲痛須
得黃連末擦之其痛乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒
溼乘其胞內故喜乾而惡溼陰火肝經上溢走於標故上
壅目中溜火腎水浸肝而上溢故目中眊眊無所見齒惡

熱飲者是少陽陽明中伏火也當大瀉寒溼以丸藥治之
故曰寒在下焦治主宜緩大忌湯散以白石脂龍骨以枯
其溼以炮乾姜大辛熱瀉寒水以黃蘗之大寒為因用又
為鄉導故云古者雖有重罪不絕人之後又為之伏其所
主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也此柴胡為本經之
使以芍藥導之恐辛熱之藥太甚損其用經故微瀉之以
當歸之辛溫大和其血脈用藥之法備矣

石脂

一錢

龍骨

二錢

柴胡

一錢

當歸

三錢

乾姜

炮四錢

黃柏

五分

白芍

五分

為細末

糊丸

每服三十丸

白湯下

一流民婦白帶如流不止下極冷上極熱用此一料立愈真神藥也重在寒溼傷胞
寒熱非清

酒煮當歸丸

治癰疽白帶下注腳氣腰以下如冰雪中

火坑以重蓋厚衣猶冷小便不止與白帶長流而不禁因

肌肉消瘦面白月青目眩無所見身重如山行步欹側
 腿膝枯細大便閉結心下痞悶懊懷飲食不下面垢背寒
 小便遺不知此上中下三陽俱竭故嘔噦不止胃寒之極
 也其脉沈緊而瀉按之空虛若脉洪大而瀉按之無力猶
 為中寒之症况按之空虛乎按之不鼓是為陰寒之極也
 其空虛乃氣血俱虛之極也
註凡緊脉不拘浮沈均以為寒按之不鼓無
問大小皆以為虛診者常須識此
 當歸 兩 小茴 半兩 附子 良姜 各七 四味共酒煎至酒盡焙乾
 炒鹽 丁香 各半兩 全蝎 三錢 柴胡 三錢 升麻 木香 各三錢
 苦練子 炙甘 各五分 延胡索 四錢 酒糊丸服二十丸
註既曰氣血俱虛而本方中曾無一味補氣而血分藥又止有一味當歸豈真陽
已竭即甘溫之味亦未易為力也方地能滯陽氣故亦不用 妙在前四味用酒
煮酒糊丸者峻補其下使其陽氣生於九淵上於九天也其後九種或引之於
降或佐之以升有開結透關之妙非精識病源究心藥石者不能到也然其力量
洪大非善因者不敢 前諸症皆寒症獨便秘心下痞懊懷似熱症 按此方脉症皆
果虛寒乃用然亦稀少
通陽

暖宮妙應丸 治婦人赤白帶下及子宮虛冷無子者

當歸 川芎 白芍 熟地黄 艾葉 丹皮 茯苓

龍骨 牡蠣 赤石脂 等分 糊丸

註曰物合成劑又以艾葉暖其下扶苓滲其溼丹皮行其瘀宜乎暖宮得孕

平補法

白芷散 治赤白帶下

白芷 二兩 海螵蛸 二兩 血餘 二兩 為末酒下二錢

止瀉

側柏地榆湯 治赤白帶下以致不能成孕

黃芪 側柏葉 地榆 烏鰂魚骨 牡蠣 白鹽蚕 各

肉苁蓉 白芷 蛇床子 各半 煎服

註腎主閉藏赤白帶下者腎氣不固也白芷升陽明於血海餘皆補腎而有散有通有通其黃芪一味得非補八脉之表氣乎亦補而散也

清

咸喜丸 治婦人血海久冷白帶白濁白淫下部常淫小便

如米泔或無子

黃蠟

黃芩

四兩用猪苓三錢半煮二十餘沸去猪苓不用 茯苓晒乾用

茯苓為末熔蠟丸彈子大空心細嚼滿口津生徐徐嚥服

以小便清為度

註味之淡者莫過於黃蠟茯苓蓋淡味乃天之陰氣天氣降則水生水生則火有制用猪苓煮者欲滲之速以蠟丸者欲其降之深也

滲淫

如聖丹 治婦人經脉不調赤白帶下

枯白礬

蛇床子

等分

為末用醋為丸如彈子大用

臘脂為衣綿裹於陰戶中定坐半日熱極再換大抵月水

不通赤白帶下多因子宮不潔服藥難效下取易痊且速

效而不傷臟氣也

按月水不通可用赤白帶下宜審

俗下胎法用地棉根取一根直下者用水浸淫插入陰戶子門口內對時便產淫婦常用者

求子

胡氏曰男女交姤其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶為後天滓汁之物而一點先天真一之靈氣萌於情欲之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主於精語女則主於血著論立方男以補腎為要女以調經為先而又參之補氣行氣之說察其脉絡究其虧盈審而治之然後可孕

陳楚良曰人身氣血各有虛實寒熱之異惟察脉可知舍脉而獨言藥者妄也脉有十二經應十二時一日一周與天同道循環無端其至也既不宜太過而數數則熱矣又不宜不及而遲遲則寒矣不宜太有力而實實非正氣能實也正氣虛而火邪來乘以實之也治法先當散鬱以伐