

醫學述成法

第三編 證治須知

虛勞

病原 亦稱肺癆。西人謂之肺結核。由一種結核菌侵入肺中而起。

證候 以咳嗽血咳為特徵。初起羸瘦減食。怠倦嗜卧。骨軟足酸。目中生花。見火鼻孔乾燥。時有乾咳。繼則咳嗽愈增。痰中帶血。呼吸短促。現日晡熱。多盜汗。更重則咳嗽愈甚。咳血愈多。呼吸愈促。身體瘦弱亦愈甚。日晡發潮熱。咳出之痰其狀如膿。雜有壞肺。此證初期可治。過此多死亡。

治法 以保養精血為主。下列各方宜酌量用之。此症最防脾氣下溜。即泄瀉藥

物切忌寒涼。骨蒸發熱。一切輕揚之藥亦不可用。用之反引熱外出。而增其熾灼。附記 日本湯本求真曰。加爾史謨治肺結核有偉効。西醫多賞用之。石膏含有

天然含水硫酸。加爾史謨壯蠟含有炭酸。加爾史謨故二物為治肺結核之要藥。

小建中湯 治虛勞裏急悸衄。腹中痛。夢失精。四肢痠痛。手足煩熱。咽乾口燥。

此湯主之。徐靈胎曰。此治陰寒陽衰之虛勞。止與陰虛火旺之病相反。庸

醫誤用害人甚多。此咽乾口燥。乃津液少。非有大也。

桂枝

五錢一分

甘草

錢一分

大棗

二枚

生白芍

三錢

生薑

五錢一分

膠飴

五錢三分

水煎去滓納膠飴微火消解溫服

此方人參當歸俱可隨宜

加入飽悶者去大棗

加茯苓二錢氣逆者加半夏一錢五分

黃芪建中湯

治虛勞諸不足

即前方加黃芪二錢

樂令建中湯

治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成癆瘵此藥大能退虛熱

生氣血

前胡

細辛

黃芪

人參

桂心

橘皮

當歸

白芍

茯苓

麥冬

甘草

各一兩

半夏

七錢半

每服四錢加姜棗煎服

十四味建中湯

治營衛失調氣血不足積勞虛損形體羸瘦短氣嗜卧欲成癆瘵

當歸

白芍

白朮

麥門冬

甘草

肉蓯蓉

人參

川芎

肉桂

附子

黃芪

製半夏

熟地黃

茯苓

各等分每服三錢加姜棗煎服

炙甘草湯

治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一

日死

甘草

炙二錢

桂枝

生薑

各一錢

麥冬

二錢半

大麻仁

一用

何膠各一錢五分

人參一錢

生地四錢

大棗二枚

水二杯酒半杯煎八分服。

薯蕷丸 治虛勞諸不足風氣百病。

薯蕷三十

當歸

桂枝

麴

乾地黄

豆黃卷各十兩

甘草八分

人參

何膠各七

芎藭

芍藥

白朮

麥冬

杏仁

防風各六分

柴胡

桔梗

茯苓各五

乾姜三分

白飲二分

大棗

百枚為膏

共為末蜜丸如彈子大空腹酒服一丸一百丸為一劑。

大黃蠱蟲丸

治五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷。

勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目暗黑此丸主之。

此方專治

瘀血成勞之症。

大黃十分

黃芩二兩

甘草三兩

桃仁一升

杏仁一升

芍藥四兩

乾地黄十兩

蟅蟲一升

乾漆一兩

蟲蟲一升

水蛭百枚 蠱蟲半升

共為末蜜丸小豆大酒飲服五丸日三服。

六味地黄丸

壯水以制陽光凡一切吐血下血咳嗽不眠骨蒸遺精淋濁屬

陰虛者無不統治之。

熟地八兩

山萸肉

淮山藥各四兩

丹皮

茯苓

澤瀉各三兩

共為末蜜丸如桐子大每服三錢

本方改兩為錢水煎服名六味地黄湯

本方加五味子名都氣丸再加麥冬名八仙長壽丸治咳嗽

八味地黄丸

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者主之

此方專利小便水去

而陰不傷扶陽而火不升製方之妙固非一端但近人以此一方治天下之

病則又大失此方之義矣

方見腳氣

本方減兩為錢水煎服名八味湯

酸棗仁湯

治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁

八錢生用不研

甘草

五錢

知母

茯苓

各三錢

川芎

五錢

先煮酸棗仁後納諸藥再煎溫服

歸脾湯

此補養後天第一方

人參

龍眼肉

黃芪

各二錢五分

甘草

五分

白朮

二錢五分

茯苓

二錢五分

木香

五分

當歸

酸棗仁炒研

遠志各一錢

加姜三片煎服

按此方高鼓峰去木香加白芍一錢五分更妙咳嗽加麥冬二錢五味子七

分鬱氣加貝母二錢脾氣發熱加丹皮梔子

補中益氣湯 治陰虛內熱。頭痛口渴。表熱自汗。不任風寒。脈洪大。心煩不安。四肢困倦。懶於言語。無氣以動。則氣高而喘。

黃芪

人參

雲朮

錢炒各一分

甘草

錢一錢

陳皮

五分

當歸

一錢

升麻

柴胡

各五分

加姜棗煎服

東垣之方。一概以升提中氣為主。如

果中氣下陷者。最為合度。若氣高而喘。則非升柴所宜。學者不可誤用也。

十全大補湯

治諸虛不足。五勞七傷。不進飲食。久病虛損。時發潮熱。氣攻骨

脊。拘急疼痛。夜夢遺精。面色萎黃。腳膝無力。喘嗽中滿。脾腎氣弱。五心煩悶。

並皆治之。

肉桂

甘草

熟附片

當歸

川芎

人參

白芍

茯苓

白朮

熟

地黃

各等分煎服

不寐證

病原

當由神經興奮所致。舊說謂心腎不交。

治法

黃連肉桂為治不寐症之聖藥。

治不寐證方

治夜不能寐。交睡則驚恐異常。如墜如脫。呌呼不寧。時悲時笑。

此方甚效。

北沙參 生地 麥冬 當歸 遠志 炙草 白芍 茯神 川連 姑二

肉桂 一分 加秫米一兩以甘瀾水長流水為甘瀾水先煮秫米去滓入諸藥

煎服

又方 治日晡後發熱微渴心胸間怔忡如築至晚輒生懊懣欲罵欲哭晝夜不能寐

肉桂 三錢 黃連 三錢 半夏 秫米 先秫米半夏仿靈樞秫米半夏湯

如法煎成再將肉桂另煎待冷黃連亦另煎乘熱和入徐徐溫服極效

酸棗仁湯 治虛勞虛煩不得眠

方見虛勞

自汗盜汗

證候 醒時不用力而汗少名自汗屬陽虛睡時汗出醒則汗止名盜汗屬陰

虛

治法 自汗宜芪附湯朮附湯參附湯等盜汗宜當歸六黃湯

參附湯 治自汗

人參 附子 或以白朮換人參名朮附湯換黃芪名芪附湯

當歸六黃湯 治發熱盜汗如神。

生地 熟地 黃柏 黃芩 黃連 當歸各等分 黃芪 加倍

凡止汗方內俱可加浮麥大棗。

怔忡

證候 心下跳動不安。即驚悸之類也。舊謂腎水虛而不能上升。以致心火不能下降所致。

治法 宜加減歸脾湯。並吞都氣丸。或天王補心丸主之。有痰者。宜秘方補心丸。

加減歸脾湯

人參 龍眼肉 黃芪 甘草 白朮 茯苓 當歸 酸棗仁 遠志 麥冬 五味子 枸杞子 水煎服。如怔忡而實。挾火兼疾者。加貝母黃連生地之類以清之。

都氣丸

即六味丸加五味子。方見虛勞

天王補心丸 此養心之主方。

人參 白茯苓 元參 桔梗 遠志各五錢 當歸 五味子 麥冬

天冬 丹參 酸棗仁各一兩 生地四兩 栢子仁一兩 共為末蜜丸

如椒目大白湯下 按一方有石菖蒲四錢無五味子一方有甘草川連

秘方補心丸 治心虛手振 按此方心神恍惚而有痰者宜之

當歸一兩五錢 川芎 粉甘草各一兩 生地一兩半 遠志二兩半

棗仁炒 栢子仁去油各三兩 人參 膽星 硃砂另研各五錢 金箔二十片

麝香一錢 琥珀三錢 茯苓七錢 石菖蒲六錢 每服七八十丸姜湯

送下

消渴

病原 西人名糖尿病。由消化機關澀滯致血液中混有糖分而從尿內排出之疾病也。舊說以為火病。喻嘉言曰三消總為火病。

證候 初起頭重頭痛常感飢渴繼而煩渴索飲小便增多食量倍於平時尿

帶甜味俗謂之三消病三消者口渴不止為上消肺病名食入即餓為中消亦名胃消

飲一澀一為下消亦名腎消

治法 上消宜人參白虎湯中消宜調胃承氣湯下消宜腎氣丸趙養葵謂治

消無論上中下。先以治腎為急。六味八味。及加減八味。凡宜隨證而服。降其心火。滋其腎火。則渴自止。其說尤為簡要。

人參白虎湯

即白虎湯加人參 方見傷寒

調胃承氣湯

方見傷寒

濟生腎氣丸

此方即桂附八味丸加減

治消渴聖藥。

乾地黄

八兩為度 九蒸膏

乾山藥

山萸肉

各四兩 丹皮

白茯苓

澤瀉 各三兩

桂枝

附子

車前子

牛膝 各一兩

七味飲

趙養葵以此方治消渴極效。

肉桂 一兩

五味子 一兩

山茱萸 各一兩五錢六分

熟地 五兩一分 錢二分

丹皮 澤瀉

白茯苓 各一兩九錢二分

本方即六味凡料一斤。加肉桂五味子

各一兩。水煎六七大碗。恣意冷飲之。熟睡而渴如失矣。

天門冬丸 治初得中上二消必效。

天門冬

土瓜根

乾者一兩半

瓜蒌根

熟地黄

知母

焙一兩半

肉茯苓

酒浸一宿

切焙

鹿茸

五味子

澤瀉各半

鷄內金微炙

桑螵蛸十枚炙

牡蠣煨三兩

苦參一兩

每服六十丸按原方有赤石脂今從喻嘉言減

去。

瘕閉

證候 小便點滴不通脹悶欲死。

治法 如服利水藥不效宜以木通老葱煎湯服頃時探吐再服再吐以尿通

為度或用五淋散加麻黃杏仁取微汗自通如夏日不敢用麻黃可以蘇葉防

微虛者以人參麻黃各一兩煎服亦妙按麻黃雖以利發汗著稱而不知實有汗之效

五淋散加麻黃杏仁

赤茯苓 白芍 山梔 當歸 細甘草 麻黃 杏仁 加灯草煎服

外治法

以葱湯入木桶內令病人坐於杌上沒臍為度匝腰繫裙以覆之少時汗出其尿自出欲尿時不可出桶即在桶內溺之

淋證

病原 此症男女皆有由一種微菌發育於生殖器等而起其原因為手淫房事

過度及與患白帶之婦人交媾等。舊說謂熱氣結於膀胱所致。

證候 尿道腫爛溺時疼痛。難以膿汁。分慢性急性二種。舊稱尿出如膏者曰膏淋。下如沙石曰石淋。因勞而得者曰勞淋。氣滯不通。臍下脹痛者曰氣淋。莖中割痛而溺血者曰血淋。謂之五淋。

治法 以五淋湯主之。

五淋湯 治五淋通劑。

赤茯苓 三錢

白芍

生山梔

各二錢

當歸

結甘草

各一錢四分

水煎服。尿出如膏為膏淋。加萆薢。溺血莖中割痛為血淋。加桃仁。鬱金牛膝。調麝香三厘。因勞而得為勞淋。加人參黃芪。因動氣而得。臍下脹痛為氣淋。加紫蘇生麥芽沉香。下如沙石為沙淋。調下石首魚頭中石。及髮灰滑石各等分。又有因色慾過度似淋非淋。溺短而數。莖中痛甚。宜淫羊藿肉蓯蓉生杜仲為主。佐以白蜜羊脂之類。方效。

八正散 此亦治諸淋通劑。

瞿麥

梔子

篇豆

大黃

滑石

木通

車前子

甘草 各一錢

加燈心一錢煎服

治諸淋方 此方治石淋尤切。

葵根 一兩

茅根

石首魚頭口

各三兩宜用頭中骨

甘草 一兩

通草 二兩

貝子 五合

天麻根 五兩

水煎分五服。日三夜二。

藕蜜煎

此方治老人淋病。小便不利。痛悶之極。亦治血淋。

藕汁 五合

白蜜 五合

生地黄汁 一升

微火煎。令如錫。空心服半匙。漸

漸下。飲食忌熱食炙肉。

赤白濁

病原

此證由膀胱發炎而起。舊說謂為濕熱之病。

證候

惡寒發熱。小便難出。尿中帶有膿白汁。及血。舊分赤白二種。以熱勝者

為赤。濕勝者為白。

治法

宜導其濕熱。草薢分清飲。及加味二陳湯主之。久濁者。宜四君子湯加

遠志。

草薢分清飲

治下元不固。遺精及白濁。

川草薢 三錢

石菖蒲

烏藥

益智仁

甘草梢 各一錢

水煎入鹽三分。空心服。日二服。

加味二陳湯 此治濁證之初起者

陳皮 半夏 茯苓 炙甘草 蒼朮 白朮 黃柏 草薢 石菖蒲
赤濁加丹皮。

四君子湯加遠志 此方治久濁甚效。

人參 茯苓 白朮 炙甘草 遠志 加姜棗煎

遺溺

病原 為膀胱失覺之證。此症多見於小兒及少年。舊說以為腎元虛。

證候 睡中遺尿。

治法 日醫湯本求真曰。治夜尿症。用苓姜朮甘湯。兼用伯州散。有奇效。

苓姜朮甘湯

甘草 白朮 各三錢 乾姜 茯苓 各四錢 水煎服

附錄伯州散

此日本方劑

按此方之醫治效用。與燐酸加爾史謨及魚肝油相同。

反鼻霜。

鼯鼠霜。

鹿角霜。

各等分共為末。用量一回五分二厘。一日二

回。或三回。溫酒或溫湯送下。

按反鼻。即蝮蛇霜者。燒之成灰也。

家莊子丸

治遺溺。及陽氣衰敗。白濁遺精。

家莊子

兩炒六

鹿茸

四兩

肉苁蓉

酒浸

牛膝

酒浸

熟地

當歸

各二兩

菟絲子

酒浸

巴戟

各一兩半

杜仲

石斛

桂心

乾姜

各一兩

共為末丸如桐子大。每服五十丸。加至百丸。食前鹽湯溫湯任下。小兒減半。

治小便失禁方

附子

人參各三錢

山茱肉一兩

益智仁二錢

入鹽少許煎服

參芪湯

治氣虛遺溺。

人參

黃芪

陳皮

茯苓

當歸

熟地

白朮各一錢

益智仁

升麻

肉桂各五分

甘草三分

加姜棗煎服

瘧疾

病原 多發於泥沼地方。由一種微生物寄生於血液而起。從蚊類傳染。

證候 寒熱往來有定候。有一日一發者。有二日一發者。有三日一發者。有單

寒無熱者。

名壯

有單熱無寒者。

名瘧

有先熱後寒者。有熱多寒少者。

名熱

有寒

多熱少者。

名瘧

凡瘧脈皆自弦。

治法

以柴小胡湯為主劑。治之得法。一二日可愈。如三五作不休。即於前方。

加常山。以猛截之。若單寒無熱者。宜柴胡桂姜湯。單熱無寒。或先熱後寒者。宜

白虎湯加桂枝。三日瘧宜蜀漆丸。

按徐靈胎謂曰。治瘧總不能外柴胡。今西人用金鷄納那有特效。然亦有不效時。最近日本人發明用柴胡一錢。清水兩碗。熬成一碗。於病前六時服之。無不立效云。

又按常山胡椒山茱萸草葉等。俱為截瘧要品。

又按瘧正發時。不可服藥。宜於病發前數時服之。至三陰瘧。則煎劑不能取效。宜病日用煎方以驅邪。餘兩日用溫補以扶元氣。又加避風靜養。則庶幾矣。

小柴胡湯 治瘧通劑。

方見傷寒 熱多煩渴多。知母花粉。寒多身痛。加乾姜桂枝。無汗加麻黃。有汗加桂枝酒芍。

柴胡桂薑湯 治瘧寒多微有熱。或但寒不熱。

柴胡 八錢 桂枝 三錢 乾姜 二錢 枳實根 四錢 黃芩 三錢

牡蠣 二錢 甘草 二錢 水煎分三服。初服微煩。復服汗出便愈。

白虎湯

方見傷寒

清脾飲 治熱多陽瘧。

青皮 厚朴 柴胡 黃芩 半夏 甘草 茯苓 白朮 草薢

加姜三片煎服。

蜀漆丸 此方治三日瘧寒多者亦宜之。

蜀漆 知母 白薇 地骨皮 麥門冬去心 升麻 各五分 常山

半兩

石膏二兩研 香豉一合 姜蕤 烏梅肉 鱉甲 各一兩炙 甘草

共為末蜜丸如桐子大。空腹飲服十丸。再加至二三十丸。

治三陰瘧疾方 神效。

山查 枳殼 檳榔 甜茶 各三錢 於瘧發前二時煎服。

痢疾

病原 由一種微生物侵入於大腸而起。舊說謂為濕熱蘊積所致。

證候 屢次下利。穢濁膠粘似膿似血。小腹隱痛。欲便不便。裏急後重。是也。分

赤白二種。赤者熱勝。白者濕勝。若絕食頻嘔。曰噤口痢。證尤危險。

治法 初痢宜與藥湯。久痢宜真人養臟湯。間用香連丸。噤口痢宜倉廩湯。