

文祖正訂寒一條辨卷三

頭痛

太陰少陰有身熱而無頭痛蓋二經皆不上頭故也厥陰有
頭痛而無身熱蓋厥陰與太陽會於巔也若身熱又頭痛皆
屬三陽經也傷寒太陽頭痛發熱惡寒無汗麻黃湯頭痛發
熱惡寒有汗桂枝湯陽明頭痛不惡寒反惡熱白虎湯不大
便調胃承氣湯頭痛甚者必衄葛根湯去大棗加蔥白少陽
頭痛頭角痛或耳中痛或口苦發熱或往來寒熱脈弦數並
宜小柴胡湯厥陰頭痛嘔而吐沫吳茱萸湯又厥陰頭痛脈
微浮爲欲愈如不愈小建中湯若溫病頭痛或頭脹痛乃邪

熱鬱結於內上攻頭面三陽斷不可發表輕則神解散清化湯治之重則增損雙解散升降散合內外而治之裏氣一通頭痛自止不可拘傷寒頭痛當解表不可攻裏之例也

麻黃湯

方見裏證門

桂枝湯

方見裏證門

白虎湯

方見裏證門

調胃承氣湯

方見裏證門

葛根湯

方見裏證門

小柴胡湯

方見裏證門

吳茱萸湯

厥陰頭痛嘔而吐沫少陰犯真寒吐利手足厥

煩燥欲死及寒邪入陽明食穀欲嘔者並此方主之

吳茱萸

三錢
揀淨

生薑

三錢

大棗

三枚

人參

一錢

水煎溫服

厥陰肝也寒邪內格故嘔而吐沫厥陰與督脈會於巔故頭痛少陰腎也腎藏中寒則上格乎陽而爲嘔吐經云腎主二便腎寒則大便不禁而爲利下手足得陽氣而溫內有真寒故令手足厥冷煩燥者陰盛格陽故令陽煩陰燥其證多危故曰欲死吳茱萸辛熱而氣厚專司開豁胸中逆氣經曰氣爲陽氣厚爲陽中之陽故能走下焦而溫厥陰少陰也臣以生薑散其寒也佐以參棗補中虛也

小建中湯 傷寒三四日心悸而煩及少陰惡寒腹中急痛

此方主之加黃耆蜜炙三錢各黃耆建中湯

白芍四錢桂二錢甘草二錢生薑二錢大棗二枚飴餹

三錢酒炒水煎去渣入飴餹溶化服

醫方考曰小建中湯宜用肉桂枝則味薄故用之以解肌桂則味厚故用之以建中也愚按開後人補中益氣無窮之法門此方是也

續論曰桂枝湯中白芍桂枝等分用白芍佐桂枝以治衛氣小建中湯中白芍四錢桂枝二錢用桂枝佐白芍以治榮氣更加飴餹以緩其皮故名之曰建中則其功用大有不同耳

神解散方見發熱門

清化湯

溫病壯熱憎寒體重舌燥口乾上氣喘咽喉不

利頭面猝腫目不能開者此方主之

白僵蠶

三錢酒炒

蟬退

十個

金銀花

二錢

澤蘭葉

二錢

廣皮

八分

黃芩

二錢

炒梔

一錢

連翹

一錢

龍胆草

一錢

元酒炒

參一錢

桔梗

一錢

白附子

五分

甘草

五分

大便秘

加酒大黃

四錢

咽痛

加牛旁子

炒研

錢

頭面不腫

去白附

子水煎去渣入蜜酒冷服

其方名清化者以清邪中於上焦而能化之以散其毒也

連梔翹清心肺之火元參橘甘清氣分之火胆草清肝膽之

火而且沉陰下行以瀉下焦之濕熱僵蠶蟬退散腫消毒定

喘出音能使清陽上升銀花清熱解毒澤蘭行氣消毒白附
散頭面風毒桔梗清咽利膈爲藥之舟楫蜜潤藏府酒性大
熱而散能引諸涼藥至熱處以行內外上下亦火就燥之意
也其中君明臣良而佐使同心引導協力自使諸證悉平矣
增損雙解散 方見陽毒陰毒門

升降散 方見陰證似陽門

身痛

凡傷寒太陽病身體痛骨節痛若惡寒無汗脈浮緊者麻黃
湯汗之若脈浮緩惡風自汗者桂枝湯和之若風寒並中脈
浮緊而緩者大青龍發之少陰病身體痛骨節痛手足厥脈

沉者、附子湯主之。然此陰陽二證，一般身痛，用藥則相去霄

壤。浮沉之脈，要在指下辨識。若誤發少陰經汗，必動其血，或

從口鼻出，或從目出。少陰脈入肺絡心，太陽脈起目內眥。則爲下厥上竭而死。

或可以當歸四逆湯救之。凡一身盡痛，發熱發黃，頭上汗出，

背強，小便不利者，濕也。茵陳蒿湯。凡發汗後，身疼痛，脈沉遲

者，桂枝新加湯。凡身痛下利清穀者，表裏俱寒也。原文先救

裏，四逆湯。次救表，桂枝湯。若溫病雜氣熱鬱三焦，表裏阻隔，

陰陽不通，身體痛，骨節痛，以及頭痛項強，發熱惡寒，惡風目

痛，鼻乾不眠，脇痛耳聾，寒熱而嘔，一切表證，狀類傷寒，實非

風寒外感之邪，通宜清熱解鬱，以疏利之，如神解散，芳香散

升降散加味涼膈散增損雙解散之類隨其輕重酌量用之
裏氣一清表氣自透而外證悉平矣故溫病凡見表證皆裏
證鬱滯浮越於外也不知者一見身痛頭痛發熱惡寒等證
便以爲傷寒而用麻黃青龍以發其汗則壞病蜂起矣此卽
所謂前一節治法大有天淵之別也王劉兩公其先覺乎

麻黃湯

方見表證門

桂枝湯

方見裏證門

大青龍湯

方見裏證門

附子湯

方見陰證門

當歸四逆湯

手足厥寒陽邪陷內四肢逆冷脈細欲絕陰

盛陽衰此方主之

當歸二錢

白芍二錢

桂枝二錢

細辛一錢

通草四分

甘草一錢

生薑四分

二錢

生薑

二錢

草一錢

大棗二枚

水煎溫服

加吳茱萸

生薑湯治前証內

有久寒者

手足厥寒

脈細欲絕

似乎陰證之極

蓋由陽邪傳入厥陰榮

分以本虛不能作熱

故厥而脈細欲絕也

此為陰

厥陰經

鬱

陽邪故用桂枝細辛以解表

白芍甘草以瀉熱

當歸以和厥

陰之榮血通草以通太陽之本府

使陽邪得從外解

原非治

陰寒四逆之藥也故藥宜歸芍以濟陰不宜薑附以劫其陰

也是證也。自表入裏，雖曰傳至厥陰，始終只是陽證。與陰寒
直中三陰不同，故不用四逆湯，而用桂枝湯加當歸、細辛、通
草耳。明者自知之。

按昔人云：人有陰血虧於陽分，不能盛辛熱者，更宜此湯主
之。殊不知此惟有陽邪者宜之。若無陽邪而見此證，則是陰
血太虧矣。投之禍不旋踵。蓋細辛爲少陰中表藥，隨桂枝湯
以解肌，加當歸以和榮血。至於通草、甘淡微寒，能瀉丙丁，能
通水道，爲虛寒者禁用。此湯治法，本是和榮血以緩脈，使陽
邪得從肌表而散，或從膀胱而泄也。若循其名以治陰虧寒
中之四逆，則謬甚矣。觀於傷寒論曰：若其人素有久寒者，宜

當歸四逆湯加吳茱萸生薑主之正如四逆散本以散傳經之熱邪腹中痛者方加附子則當歸四逆湯非治陰寒四逆之藥也明矣更有一等固守王道之醫辨證不明遇有厥逆脈細之證不敢用四逆湯但日用當歸四逆湯極爲穩當不知此湯乃桂枝湯加當歸細辛通草耳細辛隨桂枝湯止能解表通草又能疏通最有力之藥當歸一味果足以治陰寒四逆耶藥不對證果可謂之穩當耶甚矣其不明於製方之理而以舛錯誤病也予前所云用方貴明其所以然者正謂此也

茵陳蒿湯方見裏證門

桂枝新加湯

汗後身痛脈沉遲者此方主之以桂枝湯解

汗後之風邪加參芍益不足之血脈亦兩解表裏安內

攘外之一法曰新加者因發汗新虛明非桂枝湯中之

舊法也

桂枝

三錢

白芍

四錢

甘草

二錢

人參

一錢

生薑

三錢

棗

二枚

水煎

溫服

四逆湯

方見陰證門

神解散

方見惡寒門

芳香散

方見惡風門

下降散

方見陰證似陽門

加珠涼膈散

方見裏證門

增損雙解散

方見陽毒陰毒門

不眠

陽盛陰虛則晝夜不得臥陰盛陽虛則嗜臥不欲起蓋夜以陰爲主陰氣盛則目閉而臥安若陰爲陽擾故煩燥而不眠也溫病熱鬱三焦陰不敵陽大渴引飲煩燥不眠輕則增損大柴胡湯重則增損雙解散兩解表裏之熱毒以治之若太陽傷寒脈浮數身痛無汗煩燥不眠大青龍湯或桂枝麻黃各半湯若發汗後不眠脈浮數微熱煩渴小便不利五苓散若大汗後胃中乾燥不眠煩渴欲飲水者少少與之愈脈數

不眠

大者、白虎湯或竹葉石膏湯、不用五苓、又太陽傷寒、脈浮以
火劫汗、亡陽驚狂、起臥不安、桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨
救逆湯、陽明經病、且痛鼻乾不眠、葛根湯、內熱多加黃芩、知
母、若自汗、脈洪數、經府俱熱、煩渴舌燥不眠、白虎湯、若大熱
錯語、呻吟乾嘔不眠、黃連解毒湯、少陽病往來寒熱、口苦心
煩不眠、脈弦數、小柴胡湯、加黃連、梔子、若虛弱人、津液不足、
加酸棗仁、五味子、麥冬、少陰病得之二三日以上、心煩不眠、
黃連阿膠湯、生雞子黃、凡汗吐下後、煩渴不眠、劇者懊憹不
眠、此邪熱乘虛客於胸中、煩熱鬱悶而不得散也、梔子豉湯
凡下後虛煩不眠、參胡溫膽湯、加味溫膽

增損大柴胡湯 方見表裏兼方

增損雙解散 方見陽毒陰毒門

大青龍湯 方見裏證門

桂枝麻黃各半湯 方見裏證門

五苓散 方見裏證門

白虎湯 方見裏證門

竹葉石膏湯 陽明汗多而渴、衄血渴欲飲水、水入即吐、及

傷寒瘥後、虛羸少氣、氣逆欲吐、並此方主之、

竹葉 二錢 石膏 四錢 麥冬 去心二錢 半夏 二錢 人參 一錢 炙

草 一錢 生薑 二錢 粳米 二錢 水煎溫服 本方去

石膏半夏薑米加柴胡黃芩名人參竹葉湯治汗下後煩熱口渴虛羸少氣之證

竹葉石膏之辛寒以止喘促散餘熱參草粳麥之甘平以益肺胃生津液生薑半夏之辛溫以豁痰飲去嘔逆此虛羸熱逆之良方也

桂枝

回陽定驚

去白芍

恐其損陽

加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

太陽傷寒脈浮

此風寒兩傷也

醫以火迫劫之亡陽

此大汗驚

狂

神乃陽之靈陽衰則亂矣

起臥不安者

煩燥不甯此皆停飲上逆凌心也飲去則心神定矣

此方主之

桂枝

三錢

蜀漆

去腳三錢

龍骨

四錢

牡蠣粉

五錢

炙草

二錢