

御纂醫宗金鑑


外科

卷四至卷六

腦疽圖

偏腦疽圖

腦疽生項後入髮際正中屬督脈經



偏腦疽生項後入髮際內傍鬚丁半屬膀胱經與濕癰瘻異

項部

腦疽

腦疽項正屬督脈左右偏腦太陽經陽正陰偏
 分難易治與癰疽大法同註此疽有正有偏正
 屬督脈經入髮際名為腦疽俗名對口偏屬太
 陽膀胱經名為偏腦疽俗名偏對口正腦疽係
 陽亢熱極而生其證多嫩赤腫痛色鮮紅活根
 束頂尖時痛時止督脈純陽起於尾間上貫顛
 頂挾毒上升故易膿易腐易斂多屬順證若偏
 腦疽係寒熱錯雜所生其證漫腫色暗平塌堅
 硬然足太陽經外陽內陰從頭走足陽降陰疑
 難膿難腐難斂多屬逆證更有兼風濕者其瘡

根又易於散大旁流故順逆二證治法當辨別是癰是疽腦癰者皮薄易破腦疽者皮厚難破初起有表證令人
 寒熱往來宜服荊防敗毒散有裏證令人口唇焦紫大渴大便燥結宜服內疎黃連湯若瘡勢已成按癰疽腫瘍
 潰瘍門大法治之

荊防敗毒散 荊芥

防風

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

川芎

枳壳炒

茯苓各一錢

人參

甘草各五分

薑三片水二鍾煎八分食遠服寒甚加葱枝

方荆防敗毒治初瘡憎寒壯熱汗出良莖獨前柴荆防桔芎枳參苓甘草強
內疎黃連湯見腫瘍門

天柱疽



天柱疽生項後大椎骨高尖處屬督脈經

天柱疽

者逆甚至色黑形陷血出不止潰爛神昏嘔噦惡心等證是為大山其內外治法同腦疽

天柱疽生天柱骨上焦鬱熱蓄督經灸之有胞方為順色黑形陷逆而凶註此疽生於項後高骨名天柱骨即大椎骨也疽之初起形如卧蠶由上焦鬱熱蓄於督脈以致肩背拘急極癢入骨宜於疽上以艾灸之若灸之有胞者順無胞

魚尾毒



魚尾毒在項後髮際下兩傍角俗名燕尾即偏腦疽之小證也左右同

魚尾毒

魚尾毒生後髮角在左在右淺而輕膀胱濕熱七日潰膿出腫消痛自寧註此毒生於項後髮際兩旁角處由足太陽膀胱經濕熱凝結而發其毒或在左或在右皆屬輕淺初起宜荆防敗毒散膿將成宜服託裏排膿湯其外治之法同

癰疽腫瘍潰瘍諸證

託裏排膿湯 白芍酒炒

人參

白朮土炒

茯苓

連翹去心

金銀花

浙貝母各一錢

生黃耆二錢 陳皮分 肉桂分 桔梗胸之上 加一錢 牛膝下部 加八分 白芷頂之上 加五分 甘草四分 薑一片水

方歌：裏排膿治潰瘡，排膿消腫實稱強。歸芍四君翹桂芷，銀耆貝桔膝陳良。
荆防敗毒散見腦疽

百脈疽 結喉癰 圖

百脈疽生透項



結喉癰生項前頰下結喉處



百脈疽

百脈疽生腫色形引耳繞頸色紫紅痛熱不食氣逆嗽刺出膿血出凶註此疽初發漫腫大小數塊環繞頸項其色紫紅痛熱不食氣逆咳嗽其發引耳十五日可刺遲則毒攻咽喉刺見膿者順見血者逆餘治法按癰疽腫瘍潰瘍門

結喉癰

結喉癰發項前中肝肺積熱塞喉凶膿成若不急速刺潰穿咽喉何以生註此癰發於項前結喉之上又名猛疽以其毒勢猛烈也蓋項前之中經屬任脈兼肝肺二經積熱憂憤所致腫甚則堵塞咽喉湯水不下其凶可畏若膿成不鍼

向內潰穿咽喉者則難生矣初宜服黃連消毒飲外敷二味拔毒散將潰調治之法按癰疽腫瘍潰瘍門
黃連消毒飲見頭部百會疽 二味拔毒散見腫瘍門

夾喉癱



夾喉癱生結喉之兩傍

少陽經癩瘡



少陽經癩瘡左右同

太陽經濕癩瘡



太陽經濕癩瘡生髮際下與偏腦疽異

夾喉癱

夾喉癱生喉兩旁肝胃毒熱發其瘡瘡與結喉癱同治尤嫌疫壅不時噎註此癱一名夾疽生於結喉之兩旁屬足厥陰肝經足陽明胃經火毒上攻而致其治法與結喉癱同

癩瘡

小瘰大瘰三陽經項前頸後側旁生痰濕氣筋名雖異總由恚忿鬱熱成更審纏綿諸證治成勞日久不收功註此證小者為瘰大者為瘰當分經絡如生於項前屬陽明經名為痰瘰項後屬太陽經名為濕瘰項之左右兩側屬少陽經形軟遇怒即腫名為氣瘰堅硬筋縮者名為筋瘰若連綿如串珠者即為瘰瘰或形長如蛤蚧色赤而堅痛如火烙腫勢甚猛名為馬刀瘰瘰又有子母瘰大小不一有重臺瘰瘰上堆壘三五枚盤疊成攢有繞項而生者名蛇盤瘰如黃豆結算者又名鎖項瘰生左耳根名蜂窩瘰生

重臺瘰癧圖

陽明經瘰癧圖

馬刀瘰癧圖



重臺瘰癧少陽陽明二經皆生此證



陽明經瘰癧其形大小不一連接數枚



之加長冷名馬刀瘰癧

右耳根名惠袋瘰癧形小多瘰者名風癧領紅腫痛者名燕窩癧延及胸腋者名瓜藤癧生乳旁兩胯軟肉等處者名為疔瘍癧生於偏身漫腫而軟囊內含硬核者名流注癧獨生一個在顛門者名單窠癧一包生十數個者名蓮子癧堅硬如磚者名門門癧形如荔枝者名石癧如鼠形者名鼠癧又名鼠瘡以上諸癧推之移動為無根屬陽外治宜因證用鍼灸敷貼蝕腐等法推之不移動者為有根且深皆不治之證也切忌鍼砭及追蝕等藥如妄用之則難收斂瘰癧形名各異受病雖不外疲濕風熱氣毒結聚而成然未有不兼恚怒鬱幽滯謀慮不遂而成者也有外受風邪內停痰濕搏於經絡其患身體先寒後熱瘡勢宣腫微熱皮色如常易消易潰易斂此為風毒也如防風羌活湯海菜丸揀擇用之有感冒四時殺厲之氣而成其患耳項胸腋驟成腫塊宣發暴腫色紅皮熱令人寒熱頭眩強項作痛此為氣毒也如李梴連翹散堅

湯散腫潰堅湯俱可因證治之有肝傷患憤血虛不能榮筋其患核堅筋縮推之不移者此筋癱也初服舒肝潰
 堅湯次服香貝養榮湯治之有誤食汗液蟲蟻鼠殘陳水宿茶不淨之物其患初小後大累累如貫珠連接三五
 枚不作寒熱初不覺疼久方知痛此為誤食毒物也如楊氏家藏治癩癧方法製靈雞蛋隨證虛實揀擇用之自
 愈其項後兩旁濕癩癧經屬膀胱寒水外感風邪與濕凝結漫腫疼痛皮色如常有日久將潰皮色透紅微熱痛
 甚其內外治法用藥總不宜寒涼初腫宜用附子敗毒湯外敷神功散將潰已潰俱按癰疽潰瘍內外治法用藥
 首尾得溫煖即效誤犯寒涼令人項背拘強瘡勢塌陷毒氣攻裏便瀉者逆但凡生癩癧者男子不宜太陽青筋
 暴露潮熱咳嗽自汗盜汗女人不宜眼內紅絲經閉骨蒸五心煩熱男婦有此後必變瘡癩俱為逆證難收功也
 防風羌活湯 治風毒癩癧初發寒熱者 防風 羌活各一錢 連翹二錢 升麻七錢 夏枯草二錢
 牛蒡子一錢 炒研 川芎一錢 黃芩一錢 甘草五分 昆布一錢 酒洗 海藻一錢 酒洗 礬石二錢 酒炒 薄荷一錢 水煎

方歌 防風羌活驅癩方風毒發熱最為良芩芩昆布翹莖草夏枯海藻薄升疆
 海菜丸 治風癩癧癧繞項而生無寒熱者常服消盡為止 海藻菜蕎麥同炒過 白僵蠶微炒
 右等分為細末用白梅肉泡湯為丸如梧桐子大飯後或臨卧時每服六七十九米湯送下兼忌魚腥厚味

方歌 海菜丸治風癩癧海藻菜與白僵蠶梅湯為丸如桐子米湯送下病可痊
 升陽調經湯丸 治熱毒癩癧遠於項下或至頰車此證由陽明胃經中來也若其瘡深遠隱曲肉低俱作塊子
 堅硬大小不等並皆治之或作丸服亦可 升麻八錢 連翹去心 龍膽草酒炒 桔梗 黃連去鬚
 京三稜酒炒 葛根 甘草各五錢 知母酒洗 廣茂各一兩 條黃芩六錢 黃蘗七錢 皮酒炒

右撮一劑稱一半為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸或一百五十九一半研粗末每用五錢若胃強
 能食大便乾燥者可旋加至七八錢用水二鍾先將粗末浸半日煎至一鍾去渣熱服服時仰卧伸脚置高處

去枕頭噙藥一口作十次嚥之一鐘將喫完可留一口將丸藥送下服藥畢卧如常此治法也

方升陽調經醫毒熱項頰瘰癧堅如鐵升葛甘苓知藥稜黃連膽草翹茂桔

歌方柴胡連翹湯 治男婦熱毒馬刀瘰癧兼氣寒血滯經閉等證 柴胡

黃芩各五錢

黃蘗酒炒

生地

甘草各三錢

瞿麥穗六錢

牛蒡子二錢

當歸尾一錢五分

連翹去心

知母酒炒

肉桂三分

右共研粗末每服三錢或五錢水二大鐘煎至一鐘去渣食後熱溫服

歌方柴胡連翹醫瘰癧馬刀血滯與經閉黃芩牛蒡歸藥知瞿麥肉桂甘生地

雞鳴散

治瘰癧疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者 黑牽牛一兩

胡粉一錢即定粉

生大黃二錢

朴硝煉成粉者三錢

右共為細末每服三錢雞鳴時并花水調服以二便利為度如未利再服

歌方雞鳴散治瘰癧瘰癧結核煩悶熱相乘粉牽硝黃為細末并水調服便利通

李杲連翹散堅湯

治氣毒瘰癧耳下或至缺盆或至肩有生瘡堅硬如石推之無根者名為馬刀瘡從手足少

陽經中來也或生兩脇或已流膿或未破並皆治之 當歸酒洗

連翹去心

莪朮酒炒

京三稜各五錢

土瓜根酒炒

龍膽草各一兩

柴胡二錢

黃芩一兩二錢半

炙甘草六錢

黃連酒炒

蒼朮各三錢

赤芍藥一錢

右以一半為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百九或一百五十九一半研粗末每用五錢水

一鐘八分先浸半日煎一鐘去渣熱服臨卧頭低脚高去枕而卧每口作十次嚥之留一口送下丸子服畢如

常安卧

方李杲連翹散堅湯氣毒瘰癧馬刀瘡歸芍柴苓稜莪草土瓜龍膽黃連蒼

舒肝潰堅湯

夏枯草

殭蠶各二錢

香附子酒炒

石決明各一錢五分

當歸

白芍醋炒

陳皮

柴胡

撫芎

穿山甲各一錢

紅花

片子薑黃

甘草各五分

引用燈心五十寸

水三鍾煎一鍾食遠溫服 便燥者加乳香一錢 便溏者加煨牡蠣一錢

歌舒肝潰堅湯開鬱筋癱石疽柴決當夏枯陳薑香附撫紅花芍草申薑黃

散腫潰堅湯 治氣毒癰癧一切馬刀結硬如石推之有根者如證從耳下串至缺盆或至肩或至脇下者皆

屬手足少陽二經所發也若癰癧偏生類或至頰車堅而不潰者屬足陽明經所發也或二證已破及流膿水者

並皆治之服藥多火臨證斟酌量病人飲食大便軟硬以意消息之

柴胡梢四錢 龍膽草酒炒 黃蘗去粗皮 知母炒 花粉 昆布去土 桔梗各五錢 甘草炙

京三稜炒 廣茂酒炒 連翹去心 當歸各三錢 白芍炒 葛根 黃連各二錢 升麻六錢

黃芩梢八錢 一半酒炒 海藻五錢 右共研末每用六錢或七錢水二鍾先浸半日煎至一鍾去渣熱服

服時於臥處伸脚在高處頭微低每噙一口分十次嚥之至服畢依常安卧取藥在胸中多停留之意也另攪

半料作細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸此湯藥豫留一口以送丸藥

歌散腫潰堅氣毒滯馬刀癰癧耳肩交徧頰或至頰車骨結硬如石用之消知藻三稜歸芍草升花粉柴胡梢

葛根黃連廣茂桔昆布龍膽蘗連翹

楊氏家藏治瘰癧方 治誤食毒物致成瘰癧其功甚速 荆芥 白殭蠶炒去絲 黑牽牛各二錢 蟹螯

二十八個去頭 右為末卧時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時再一服五更初即用溫酒調藥一錢

或二三錢量人之強弱用之服後如小水並無惡物行下次日早再用一服仍不行第三日五更初先食白糯米粥再服煎藥一服更用燈心湯調琥珀重一錢服之以小水內利去惡物為愈如尿孔痛用青黛一錢以甘

草湯調下其痛即止

歌方楊氏家藏治瘰癧方誤食毒穢成瘰瘡牽牛蟹螯殭荆芥為末酒服量弱強

歌方楊氏家藏治瘰癧方誤食毒穢成瘰瘡牽牛蟹螯殭荆芥為末酒服量弱強

法製靈雞蛋 治誤食毒物致腹下生馬刀瘰癧者其功稍緩 蟹螯七個去頭足翅 右將雞子一個頂上敲開小孔

入蟹螯在內紙封固了於飯上蒸熟取出去壳切開去蟹螯五更空心和米飯嚼服候小水通如米泔水或如

脂即其驗也如大便小水不通即服琥珀散三二貼催之然後常服內消連翹丸九佳

方製靈雞蛋治馬刀雞子一個入蟹螯紙封蒸熟去殼藥同飯嚼服應可消

琥珀散 琥珀 黃芩 白茯苓 烏藥 車前子 瞿麥 茵陳蒿 石韋 紫草

茅根 連翹各等分去心 右為極細末每服三錢用燈心湯調下不拘時服

方琥珀散能利二便瀉毒清熱最稱奇 蒼苔烏藥車瞿麥茵韋紫草芽翹宜

妙靈散 服靈雞蛋後却將此藥與內消連翹丸相兼常服瘡愈方止 海藻二兩 川牛膝 何首烏生

當歸洗酒 海螵蛸 桑寄生各一兩 海帶 青柏子洗酒 昆布洗酒 甘草節各五錢 木香三錢

沉香二錢 右為細末每服二錢食後溫酒送下

內消連翹丸 連翹三兩去心 核桃仁 白芨 射干 夏枯草 土瓜根 澤蘭葉 沙參

漏蘆各一兩五錢 右為細末入核桃仁研勻酒糊為丸如梧桐子大每服三五丸空心食前或酒下或鹽湯

送下

方內消連翹解毒妙靈與此兩兼服核桃及射夏枯草土瓜澤蘭沙漏蘆

附子敗毒湯 治濕毒瘰癧 羌活一錢 川附子一錢 白殭蠶三錢

生黃耆一錢五分 蔓荊子一錢五分 陳皮一錢 防風一錢 白茯苓一錢五分 前胡一錢 連翹一錢五分

引用生薑一片水三鐘煎一鐘食遠溫服

方附子敗毒太陽經濕毒瘰癧漫腫疼陳苓前草者羌活銀花殭蠶翹防風

消核散 治頸項痰凝癰癤不論男婦小兒用之無不神效 海藻三兩 牡蠣 玄參各四兩 糯米八兩

甘草一兩 紅娘子二十八個同糯米炒胡黃色去紅娘子用米 共研細酒調服一錢或錢半量人壯弱

方消核散治諸癰癤男婦小兒用之愈紅狼糯米炒胡黃甘草玄參藻牡蠣

犀角丸 治諸般癰癥心火上攻兩目赤澀服之有效 犀角 青皮 黑牽牛半生半炒 陳皮各一兩

連翹五錢 薄荷二兩 皂角二枚 前五味共研細末用皂角去子皮弦泡槌以布絞取汁一碗又用新

薄荷搗取汁同熬成膏和入藥末內為丸如梧桐子大每服三十九食後滾湯送下

夏枯草膏 治男婦小兒憂思氣鬱癰癥堅硬肝旺血燥驟用迅烈之劑恐傷脾氣以此膏常服消之

京夏枯草一兩 當歸 白芍酒炒 黑參 烏藥 浙貝母去心 殭蠶各五錢 昆布

桔梗 陳皮 撫芎 甘草各錢 香附一兩 紅花二錢 前藥共入砂鍋內水煎濃湯布濾去

渣將湯復入砂鍋內漫火煎濃加紅蜜八兩再熬成膏磁罐收貯每用一二匙滾水沖服兼戒氣怒魚腥亦可

用薄紙攤貼癰癥自消

方夏枯草膏醫諸癥化硬消堅理肝虛血燥憂思肝木旺烈藥傷脾服此宜歸芍貝殭香附桔昆紅參草撫陳皮

烏藥同熬加紅蜜滾水沖服戒怒急

癰癥未潰敷貼

金倍散 治癰癥堅硬難消敷之神效 整文蛤一枚 金頭蜈蚣一條 將蜈蚣末裝入文蛤內紙糊

封口外再用西紙糊七層晒乾麩麩拌炒以紙黑焦為度去紙研極細末加麝香一分再研勻陳醋調稠溫敷

堅硬核處外用薄紙蓋之每日一換

方金倍散敷聖癰癥蜈蚣末入文蛤中紙糊晒乾同麩炒如麝研之醋調靈

神功散 治濕毒瘰癧敷之神效 製川烏頭 嫩黃蘗各等分 共研細末米醋調稠溫敷腫處每日一換

歌方神功散敷濕瘰癧嫩黃蘗與川烏頭等分為末加米醋調塗腫處即能瘰

李杲龍泉散 治諸般瘰癧未成者消已成者潰 瓦粉即定粉 龍泉粉即磨刀石上粉也 莪朮酒浸炒乾

京三稜酒浸炒乾 昆布各五錢去土酒洗 右共研極細滾水調塗患處用此消堅尤速

歌方李杲龍泉消諸癧瓦粉龍泉莪朮稜昆布共研為細末滾水調塗速又靈

朱震亨貼瘰癧餅 治項間瘰癧不辨肉色不問大小及日月深遠或有赤硬腫痛並皆貼之妙

生山藥 蓖麻子肉 右等分搗勻攤貼之

歌方震亨點瘰癧可移蓖麻山藥共搗泥不問日久並腫硬作餅貼之貼更奇

神效瘰癧方 治瘰癧初起消腫止痛 白膠香 海螵蛸 降真香心無土氣者 右等分研末溫水調稠

薄紙攤貼

歌方神效瘰癧實良方疎滯消腫止痛強未破已前用之效白膠海螵蛸降真香

龍球膏 龍牙草五兩即馬鞭草 棘棗根五錢 海藻二錢五分 蘇木五錢 右細切水二十盞煎至十二三盞去渣

渣又用桑柴灰蒼耳草灰石灰各二盞半紙兩層先鋪羅底次置三種灰於羅內用滾水熱淋取灰汁十盞澄清

清同前湯入鍋內熬成膏用巴豆霜白丁香石膏麝香輕粉各少許研細入膏內攪勻磁罐收貯取數核上再

敷時去舊藥其核即潰根小者但塗於根上其核自潰

歌方龍球膏敷癧毒瘡潰遲未潰敷之良海藻蘇木龍牙草再加棗根共煎湯桑石蒼耳灰淋水同煎成膏添麝香

石膏白丁輕巴豆研入膏內塗瘰癧

瘰癧潰後方

蟾酥搃子 蟾酥黃豆大 白丁香 十五粒 寒水石 黃豆大 巴豆 十粒 寒食麵 黃豆大

右各研細共合一處再研勻煉蜜搓成搃子每用一根用鍼將瘰癧當頂鍼一孔插搃子入孔內用綠雲膏蓋

貼連插三日後單換膏藥候數日後頑根自脫以膿盡硬退為效如硬未盡再用以盡為度

方 歌 蟾酥搃子化堅方瘰癧將潰納入瘡寒水石共巴豆肉寒食麵與白丁香

五雲膏 專點鼠瘡馬刀瘰癧已潰 銀黝子 四兩 黃丹 八兩 香油 二十兩 用砂鍋一口盛香油火

溫候油熱將銀黝子投入油內用桃柳桑槐棗五樣樹枝攪之候起珍珠花時撈去渣用布濾淨復將油下入

鍋內慢慢將黃丹篩入用五枝不住手攪之以滴水成珠為度取出收貯用時勿令見火以重湯炖化紅緞 貼

方 歌 五雲膏貼鼠瘡證瘰癧共馬刀銀黝油熬渣濾淨黃丹五枝攪成膏

綠雲膏 黃連 大黃 黃芩 元參 黃蘗 木鼈子 各一錢 右藥共切片用香油一兩燂

焦色去渣入淨松香五兩再熬成膏傾入水中扯拔令金黃色入鉢內再熬數滾候溫將猪胆汁三枚銅綠三

錢預用醋一兩浸一宿絹濾去渣同入膏內用柳枝攪之候冷為度用時以重湯炖化薄紙攤貼甚效

方 歌 綠雲癭破貼最神軍藥連龍元參芥油煤濾渣加松脂膽汁銅綠入攪勻

蛇蛻膏 蜜蜂 二十個 蛇蛻 七分 蜈蚣 二條 端午 前收者佳 右用香油四 將前三藥入油用文武火燂枯撈

去渣入定粉二兩用如筋粗桑枝七條急攪候冷出火七日夜方用紙攤貼患處

方 歌 蛇蛻膏貼潰後癭專消餘毒功效極蜈蚣蜜蜂煤去渣定粉油熬出火氣

凡治瘰癧馬刀潰破之後應用方藥氣血兩虛宜八珍湯堅硬未消者宜香貝養榮湯食火便瀉者宜香砂六君

子湯血虛肝熱或瘡口出血或紅膿者宜逍遙散加丹皮炒梔子瘡口斂遲宜用十全大補湯加白斂虛煩不寐

者宜歸脾湯調理但藥劑大小量人歲數虛實斟酌用之

八珍湯見清
十全大補湯見清

香貝養榮湯見清
歸脾湯見乳部

香砂六君子湯見清
益元散即六乙散

逍遙散見背
上搭手

石疽



上石疽生頸項傍堅硬如石左右同

實者宜服舒肝潰堅湯氣虛者宜服香貝養榮湯外用葱白蜂蜜搗泥敷貼日久不消者以陽燧錠每日灸之以
或消或軟或將潰為度既潰法同瘰癧

香貝養榮湯 白朮二錢 人參 茯苓 陳皮 熟地黄 川芎 當歸

貝母去心 香附酒炒 白芍各錢 桔梗 甘草各五 薑三片 棗二枚 水二鍾 煎八分 食遠溫服

胸膈痞悶加枳殼 木香 飲食不甘加厚朴 蒼朮 寒熱往來加柴胡 地骨皮 潰膿作渴倍人參 當歸 白朮

加黃耆 膿多或清倍當歸 川芎 脇下痛或痞加青皮 木香 肌肉生遲加白斂 肉桂 疲多加半夏 橘紅

口乾加麥冬 五味子 發熱加柴胡 黃芩 渴不止加知母 葶藶 小豆 潰後反痛加熟附子 沉香 膿不止倍

人參 當歸 加黃耆 虛煩不寐倍人參 熟地 加遠志 棗仁

方香貝養榮用四君四物見桔香附陳氣血兩虛宜多服筋癭石疽效如神

陽燧錠見首卷烙法 舒肝潰堅湯見瘰癧門

失榮證

失榮證圖



失榮證

失榮耳旁及肩項起如痰核不動堅皮色如常日漸大憂思怒鬱火凝然日久氣衰形削瘦愈潰愈硬現紫斑腐爛浸淫津口水瘡口翻花治總難註失榮證生於耳之前後及肩項其證初起狀如痰核推之不動堅硬如石皮色如常日

漸長大由憂思怒氣鬱血逆與火凝結而成日久難愈形氣漸衰肌肉削瘦愈潰愈硬色現紫斑腐爛浸淫滲流血水瘡口開大努肉高突形似翻花瘤證古今雖有治法終屬敗證但不可棄而不治初宜服和榮散堅丸外貼阿魏化堅膏然亦不過苟延歲月而已

和榮散堅丸 治失榮調和榮血散堅開鬱 川芎 白芍酒炒 當歸 茯苓 熟地 陳皮

桔梗 香附 白朮各一錢 土炒 人參 甘草炙 海粉 昆布 貝母各五錢 去心 升麻

紅花各三錢 夏枯草一觔 煎湯再加紅 共研細末夏枯草膏合丸如梧桐子大每服三錢食遠白滾

水送下 身熱加黃芩柴胡 自汗盜汗去升麻倍人參加黃耆 飲食無味加藿香砂仁 飲食不化如山查

麥芽 胸膈痞悶加澤瀉木香 欬嗽痰氣不清加杏仁麥冬 口乾作渴加知母五味子 睡眠不寧加黃

蘗遠志棗仁 驚悸健忘加茯神石菖蒲 有汗惡寒加薄荷半夏 無汗惡寒加蒼朮藿香 婦人經事不

調加延胡索丹皮 腹脹不寬加厚朴大腹皮

方歌和榮散堅丸消鬱開結益虛理肝脾八珍貝桔陳香附昆海升紅桔草宜

阿魏化堅膏 用蟾酥丸藥末一料金頭蜈蚣五條炙黃去頭足共研勻將太乙膏二十四兩重湯炖化離火入

前藥末攪冷為度每用時以重湯炖化用紅絹攤貼半月一換輕者漸消重者亦可少解常貼可保不致翻花
 方阿魏化堅消結聚蟾酥丸料研末細蜈蚣炙黃太乙膏炖化攪勻功極速
 太乙膏見潰瘍門 蟾酥丸見疔瘡門

鈕扣風圖



鈕扣風

鈕扣風 鈕扣風生胸項間風濕結聚搔癢難延及成片浸汁水因地而名當癩者註此證生於天突穴之間因汗出之後邪風襲於皮裏起如粟米搔癢無度抓破津水誤用水洗浸淫成片輕者外敷獨勝散冰硫散甚者宜服消風散即愈

獨勝散 芥菜花一味研細醋調患上

方獨勝散治鈕扣風已破未破用俱靈內只芥菜花一味止癢消腫有奇功

冰硫散 硫黃錢一 潮腦 川椒 生白礬錢各二 共為細末先用白蘿蔔一個掏空將藥填滿用蘿

蔔皮蓋之紙包三四層炭火內煨半時許待冷將藥取出同熟豬脂油調稠搽患上自愈

方冰硫散內首硫黃潮腦椒蓉用最良蘿蔔掏空藥填滿油調專搽鈕扣瘡

消風散 治鈕扣風騷癢無度抓破津水亦有津血者 荆芥 防風

苦參 蒼朮炒 蟬蛻 胡麻仁 牛蒡子炒 知母生 當歸 生地 石膏各一錢煨 甘草生

木通各五分 水二鍾煎八分食遠服

方消風止癢散風濕木通蒼朮苦參知荆防歸芩蟬膏草胡麻生地水煎之

上中下發背圖



上發背在天柱骨之下

中發背正對前心

下發背正對臍上

上中下發背

三發火毒發督經中發屬肝對心生上發屬肺天
 柱下下發屬腎臍後凝註上中下三發背俱屬
 督脈經皆由火毒而成上發背火毒傷肺生天
 柱骨下一名脾肚發其形橫廣如肚中發背火
 毒傷肝生於背心一名對心發其形中潤兩頭
 有尖如瓜下發背火毒傷腎生於腰中一名對臍發其形平漫如龜其初起皆形如粟米焮痛麻癢周身拘急寒
 熱往來因循數日突然大腫氣實者多焮痛氣虛者多麻癢初起治法不論虛實即宜隔蒜艾灸灸之不應則就
 患頂當肉灸之至知痛為效以大易小移深居淺灸後用鍼當瘡頂點破一孔隨用拔法務使毒氣內外疎通庶
 不致內攻如有表證發熱惡寒無汗者宜荊防敗毒散汗之如有裏證發熱惡寒大便燥者宜內疎黃連湯下之
 表裏證兼有者宜神授衛生湯雙解之以減瘡勢膿將必行託裏如潰破腐肉不去外貼巴膏以化之其餘治法
 俱按癰疽腫瘍潰瘍門蓋此三證無論老少總以高腫紅活焮痛者為順若漫腫塌陷焦枯紫黑者為逆
 荊防敗毒散見項部
腦疽門 內疎黃連湯 神授衛生湯俱見腫
瘍門 巴膏見潰瘍門
膏藥類方