



文登教育

Wendeng Education

2014



文登培训学校策划

陈文灯◆主编

◆强调效率、注重得分、贴近考题!

(理工类)

考研数学 综合题 解题方法与技巧

◆精选内容新颖、涵盖面广、前瞻性强的综合题!

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



文登教育

Wendeng Education

2014

013/740

:2014(2)

2013

文登培训学校策划

陈文灯◆主 编

(理工类)

◆ 强调效率、注重得分、贴近考题!

考研数学 综合题 解题方法与技巧

◆ 精选内容新颖、涵盖面广、前瞻性强的综合题!

北方工业大学图书馆



C00340077



北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

考研数学综合题解题方法与技巧:理工类 / 陈文灯主编. —北京:北京理工大学出版社,2013.7
(文登教育)

ISBN 978-7-5640-7898-0

I. ①考... II. ①陈... III. ①高等数学—研究生—入学考试—解题 IV. ①O13—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 149055 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室)

82562903(教材售后服务热线)

68948351(其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京时代华都印刷有限公司

开 本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 / 12.5

字 数 / 400 千字

版 次 / 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价 / 25.00 元

责任编辑 / 王玲玲

文案编辑 / 王玲玲

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

前 言

“高等数学”、“线性代数”和“概率论与数理统计”是目前大学理工科、经济管理类专业的重要基础课,是硕士研究生入学考试的最重要科目。

纵观二十几年的考研试题,发现一个明显的特点:综合题越来越被重视,其不仅出现在解答题中,也频频出现在单选题、填空题中。因此,提高解综合题的能力成了考生亟待解决的问题。

如何提高解综合题的能力?首先,要夯实基础,把握各知识点;其次,加强解综合题方面的训练。据了解,经过综合题系统训练的考生,无论是对基本知识的理解,还是对解题方法的掌握,都较一般考生的水平高出许多。为此,我们推出《数学综合题解题方法与技巧(理工类)》、《数学综合题解题方法与技巧(经济类)》系列丛书,供广大考生复习、练习使用,以尽快提高这方面的能力。

全书共分“高等数学”、“线性代数”及“概率论与数理统计”三篇,每篇又分若干章、节,每章(或节)都由“简明提要”和“例题”两部分组成,其中,“简明提要”简单地叙述该章(或节)的最主要内容;“例题”中的例子,不仅内容新颖、覆盖面广,而且前瞻性强,每个例子都通过“分析”、“详解”及“评注”做了精妙的解析和有益的拓展。

我们曾于2005年出版《综合题解析》一书,深受广大考研学子的欢迎。现在出版的这套丛书是在《综合题解析》的基础上,经精心的修订、加工和增补,使其更贴近考纲,更贴近考题,更贴近考生,成为考生摘取高分的又一个平台。

预祝广大考研学子在不久的考试中取得骄人的成绩,并请对本套丛书提出宝贵意见。

编著者

2013年6月于北京

目 录

第1篇 高等数学	(1)
第1章 函数、极限与连续	(1)
第2章 一元函数微分学	(13)
第3章 一元函数积分学	(32)
第4章 多元函数微分学	(46)
第5章 多元函数积分学	(58)
第6章* 无穷级数	(75)
第7章 微分方程	(88)
第2篇 线性代数	(94)
第1章 矩阵运算	(94)
第2章 线性方程组	(102)
第3章 矩阵的特征值、特征向量及相似对角化	(113)
第4章 二次型	(127)
第3篇* 概率论与数理统计	(141)
第1章* 随机事件概率计算	(141)
第2章* 随机变量及其分布	(150)
第3章* 随机变量的数字特征	(166)
第4章* 数理统计、参数估计及假设检验	(182)

注 书中凡带*的章、节及例题都不在数学二的考试范围内。

第1篇 高等数学

第1章 函数、极限与连续

§ 1.1.1 数列极限

简明提要

本节给出3个数列极限与高等数学其他部分结合的综合题例子,其中数列极限往往是利用数列极限存在准则计算的.

数列极限存在准则有以下两个:

准则 I 设数列 $\{x_n\}$, 如果可以找到另外两个数列 $\{y_n\}$ 和 $\{z_n\}$, 它们满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$, 且 $y_n \leq x_n \leq z_n (n = 1, 2, \dots)$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

准则 II 如果数列 $\{x_n\}$ 单调不减(单调不减), 且有上界(有下界), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

例 题

例 1.1.1 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi, x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$.

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求该极限;

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{2^n}}$.

【分析】(1) 数列 $\{x_n\}$ 若给出了通项表达式, 则利用数列极限存在准则 II 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求出它的值.

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且令 $t = x_n$, 则要计算的极限成为

$$\lim_{t \rightarrow a} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{1}{t}}$$

【详解】(1) 由数列 $\{x_n\}$ 的定义知, 对 $n = 1, 2, \dots$, 有

$$0 < x_{n+1} = \sin x_n < x_n$$

即 $\{x_n\}$ 是单调减少有下界数列, 因此由极限存在准则 II 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \in [0, \pi)$, 对

$$x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$$

的两边令 $n \rightarrow \infty$ 得 $a = \sin a$, 在 $[0, \pi)$ 上该方程有唯一解 $a = 0$. 从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}} \stackrel{\text{令 } t = x_n}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{1}{t^2}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin t}{t^2}}. \quad (1)$$

将①中的 t 看做连续变量,则有

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{\sin t}{t}}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left[1 + \left(\frac{\sin t}{t} - 1 \right) \right]}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin t}{t} - 1}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t - t}{t^3} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\cos t - 1}{3t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}t^2}{3t^2} = -\frac{1}{6}. \end{aligned} \quad (2)$$

将②代入①得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}} = e^{-\frac{1}{6}}.$$

【评注】(I) 本题是数列极限与函数极限(未定式)计算的综合题.

(II) 当数列 $\{x_n\}$ 由递推公式定义时,一般总是利用数列极限存在准则(II)确定 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的存在,有时还能通过对递推公式两边求极限得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的值.

(III) 本题(2)最后归结为计算“ 1^∞ ”型未定式的极限.在计算过程中,以下三点值得注意.

(a) 利用 $\left(\frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{1}{t^2}} = e^{\frac{\ln \sin t}{t^2}}$ 将计算“ 1^∞ ”型未定式的极限转化为计算“ $\frac{0}{0}$ ”型未定式极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(\frac{\sin t}{t} \right)}{t^2}.$$

(b) 两次利用等价无穷小代替: $t \rightarrow 0^+$ 时

$$\ln \left[1 + \left(\frac{\sin t}{t} - 1 \right) \right] \sim \frac{\sin t}{t} - 1, \cos t - 1 \sim -\frac{1}{2}t^2.$$

(c) 对“ $\frac{0}{0}$ ”型未定式极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t - t}{t^3}$ 使用洛必达法则.

例 1.1.2 设函数列 $f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n (n = 2, 3, \cdots)$.

(1) 证明方程 $f_n(x) = 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一的实根 x_n ;

(2) 证明数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在,并求其值(记为 a);

(3) 求函数 $f(x) = \int_{-a}^x t |t| dt$ 的表达式.

【分析】(1) 利用连续函数零点定理证明方程 $f_n(x) = 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上有实根,再用 $f_n(x) - 1$ 的单调性证明上述实根是唯一的.

(2) 利用数列极限存在准则(II)证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在,并对 $f_n(x_n) = 1$ 两边取极限求出 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的值.

(3) 利用分段函数 $t |t|$ 的积分确定 $f(x)$ 的表达式.

【详解】(1) 对 $n = 2, 3, \cdots$,记 $\varphi_n(x) = f_n(x) - 1$,则 $\varphi_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,且 $\varphi_n(0) = -1 < 0$, $\varphi_n(1) = n - 1 > 0$.所以由连续函数的零点定理知方程 $\varphi_n(x) = 0$ 在 $(0, 1) \subset (0,$

$+\infty$) 上有实根. 由

$$\varphi'_n(x) = 1 + 2x + \cdots + nx^{n-1} > 0 (x \in (0, +\infty)),$$

即 $\varphi_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加, 所以方程 $\varphi_n(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且只有一个实根, 即方程 $f_n(x) = 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有唯一的实根, 记为 x_n .

(2) 由于 $x_n > 0 (n = 2, 3, \cdots)$, 所以数列 $\{x_n\}$ 有下界, 下面证明 $\{x_n\}$ 是单调减少的. 事实上, 对 $n = 2, 3, \cdots$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= f(x_n) - f_{n+1}(x_{n+1}) \\ &= (x_n + x_n^2 + \cdots + x_n^n) - (x_{n+1} + x_{n+1}^2 + \cdots + x_{n+1}^{n+1}) \\ &= (x_n - x_{n+1}) + (x_n^2 - x_{n+1}^2) + \cdots + (x_n^n - x_{n+1}^n) - x_{n+1}^{n+1} \\ &= (x_n - x_{n+1})[1 + (x_n + x_{n+1}) + \cdots + (x_n^{n-1} + x_n^{n-2}x_{n+1} + \cdots + x_{n+1}^{n-1})] - x_{n+1}^{n+1}, \end{aligned}$$

即 $(x_n - x_{n+1})[1 + (x_n + x_{n+1}) + \cdots + (x_n^{n-1} + x_n^{n-2}x_{n+1} + \cdots + x_{n+1}^{n-1})] = x_{n+1}^{n+1} > 0$.

所以 $x_n > x_{n+1} (n = 2, 3, \cdots)$, 即 $\{x_n\}$ 单调减少. 于是, 由数列极限存在准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 a .

由 $0 \leq x_n \leq x_2 < 1$ 得 $0 \leq x_n^n \leq x_2^n (n = 2, 3, \cdots)$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0$.

对 $f_n(x_n) = 1$, 即 $\frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} = 1$ 的两边令 $n \rightarrow \infty$, 取极限得

$$\frac{a}{1-a} = 1, \text{ 即 } a = \frac{1}{2}.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} (3) f(x) &= \int_{-a}^x t |t| dt = \int_{-\frac{1}{2}}^x t |t| dt \\ &= \begin{cases} \int_{-\frac{1}{2}}^x -t^2 dt, & x \leq 0, \\ \int_{-\frac{1}{2}}^0 -t^2 dt + \int_0^x t^2 dt, & x > 0, \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} -\frac{1}{24} - \frac{1}{3}x^3, & x \leq 0, \\ -\frac{1}{24} + \frac{1}{3}|x|^3. & x > 0 \end{cases}$$

【评注】(I) 本题是数列极限与闭区间上连续函数性质及分段函数积分等的综合题.

(II) 当函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$ 时, 由连续函数的零点定理知 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有实根; 如果 $f(x)$ 在 (a, b) 内还具有 $f'(x) > 0$ (或 $f'(x) < 0$) 的性质, 则可以进一步推断 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内只有唯一的实根.

(III) 在本题(2)中, 为了计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的值, 需先求数列 $\{x_n\}$ 的极限, 题解中, 这一极限, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 是利用极限存在准则 I 来计算的.

例 1.1.3 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x < 2, \\ x^2+4, & x \geq 2, \end{cases}$ 又设 α, β 分别是 $y = f(x)$ 的反函数

$y = g(x)$ 的不可导点中坐标最小者和最大者.

(1) 计算 α, β ;

(2) 设 $x_0 \in (\alpha, \beta)$, $x_{n+1} = \frac{2(1+x_n)}{2+x_n}$, ($n = 0, 1, 2, \dots$), 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

【分析】(1) 先求出反函数 $y = g(x)$, 然后确定它的所有不可导点, 从而求得 α, β .

(2) 由于数列 $\{x_n\}$ 是由递推公式确定的, 所以利用数列极限存在准则 II 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

【详解】(1) 由 $y = f(x)$ 的表达式得它的反函数

$$y = g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-1), & x < -1, \\ \sqrt[3]{x}, & -1 \leq x < 8, \\ \sqrt{x-4}, & x \geq 8. \end{cases}$$

由此可知, $x = -1$ 是 $g(x)$ 的不可导点, 且由

$$\lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{g(x) - g(8)}{x - 8} = \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8} = \frac{1}{12},$$

$$\lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{g(x) - g(8)}{x - 8} = \lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{\sqrt{x-4} - 2}{x - 8} = \frac{1}{4}$$

知 $x = 8$ 也是 $g(x)$ 的不可导点, 除此以外, $g(x)$ 无不可导点, 因此 $\alpha = -1, \beta = 8$.

(2) 记 $\varphi(x) = \frac{2(1+x)}{2+x}$ ($x \neq -2$), 则由

$$\varphi'(x) = \frac{2}{(2+x)^2} > 0$$

知 $\varphi(x)$ 在定义域中单调增加, 由于对于 $x_0 \in (\alpha, \beta) = (-1, 8)$, 有

$$x_1 = \frac{2(1+x_0)}{2+x_0} \begin{cases} \geq x_0, & x_0 \in (-1, \sqrt{2}], \\ < x_0, & x_0 \in (\sqrt{2}, 8), \end{cases}$$

所以, 当 $x_0 \in (-1, \sqrt{2}]$ 时, 由 $x_0 \leq x_1$ 知 $x_1 = \varphi(x_0) \leq \varphi_1(x_1) = x_2$, 即 $x_1 \leq x_2$, 同样可以证明 $x_n \leq x_{n+1}$ ($n = 2, 3, \dots$), 即数列 $\{x_n\}$ 单调不减; 当 $x_0 \in (\sqrt{2}, 8)$ 时, 由 $x_0 > x_1$ 知 $x_1 = \varphi(x_0) > \varphi(x_1) = x_2$, 即 $x_1 > x_2$, 同样可以证明 $x_n > x_{n+1}$ ($n = 2, 3, \dots$), 即数列 $\{x_n\}$ 单调减少. 此外, 对 $x_0 \in (-1, 8)$ 有

$$x_{n+1} > 0, \quad x_{n+1} = 2 - \frac{2}{2+x_n} < 2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

即数列 $\{x_n\}$ 有上界和下界. 因此对于 $x_0 \in (-1, 8)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记这个极限值为 A , 则对

$x_{n+1} = \frac{2(1+x_n)}{2+x_n}$ 的两边令 $n \rightarrow \infty$, 取极限得

$$A = \frac{2(1+A)}{2+A}, \text{ 即 } A = \sqrt{2} \text{ (方程的根 } A = -\sqrt{2} \text{ 不合题意, 舍去)}$$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$.

【评注】(I) 本题是数列极限与导数概念等的综合题.

(II) 本题的解答给出了用导数判断由递推公式定义的数列单调性的方法, 具体如下:

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$) (其中 $\varphi(x)$ 是可导函数). 如果 $\varphi'(x) > 0$, 则当 $x_0 \leq x_1$ 时, $\{x_n\}$ 单调不减; 当 $x_0 \geq x_1$ 时, $\{x_n\}$ 单调不增.

(III) 注意题中数列 $\{x_n\}$ 的单调性与 x_0 的取值有关. 因此, 先算出 $x_1 = x_0$, 即 $\frac{2(1+x_0)}{2+x_0} = x_0$ 在 $(-1, 8)$ 内的解为 $x_0 = \sqrt{2}$, 于是当 $x_0 \in (-1, \sqrt{2}]$ 时, $x_1 \geq x_0$, 从而 $\{x_n\}$ 单调不减; 当 $x_0 \in (\sqrt{2}, 8)$ 时, $x_1 < x_0$, 从而 $\{x_n\}$ 单调减少.

§ 1.1.2 函数极限

简明提要

函数极限中最主要的是未定式极限的计算. 未定式共有七种:

“ $\frac{0}{0}$ ”, “ $\frac{\infty}{\infty}$ ”, “ $\infty - \infty$ ”, “ $0 \cdot \infty$ ”, “ 1^∞ ”, “ 0^0 ” 以及 “ ∞^0 ”.

(1) “ $\frac{0}{0}$ ” 型未定式极限有三种常用计算方法:

① 利用重要极限. 重要极限有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \text{ (或 } \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e)$$

此外, 以下三个极限也是常用的:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\mu - 1}{x} = \mu.$$

② 等价无穷小代替. 这一方法的理论基础是:

设 $\alpha(x), \beta(x), \alpha_1(x), \beta_1(x)$ 都是自变量 x 的某个变化过程中的无穷小, 且 $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$, $\beta(x) \sim \beta_1(x)$, 如果在自变量 x 的这个变化过程中, $\lim \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$ 存在或无穷大, 则

$$\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}.$$

常用的等价无穷小有: $x \rightarrow 0$ 时

$$\sin x \sim x, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x,$$

$$\ln(1+x) \sim x, e^x - 1 \sim x, (1+x)^\mu - 1 \sim \mu x (\mu \neq 0), 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2.$$

注: 当函数 $f(x)$ 比较复杂, 它的等价无穷小不易找到时, 可以利用泰勒公式.

③ 使用洛必达法则. “ $\frac{0}{0}$ ” 型洛必达法则简述如下:

设自变量 x 的某个变化过程中有 $\lim f(x) = \lim g(x) = 0$, 如果在 x 的这个变化过程中 $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或无穷大, 则 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

(2) “ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型未定式极限有两种计算方法:

① 将“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型未定式极限转化为“ $\frac{0}{0}$ ”型未定式极限.

② 使用洛必达法则.“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型洛必达法则简述如下:

设自变量 x 的某个变化过程中有 $\lim f(x) = \lim g(x) = \infty$, 如果在 x 的这个变化过程中 $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或无穷大, 则 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

(3) 其他五种未定式极限都可通过函数的恒等变形或变量代换转化为“ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型未定式极限, 然后按“ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型未定式极限计算方法计算.

本节给出 4 个未定式极限计算与高等数学其他部分相结合的综合题例子.

例 题

例 1.1.4 设二元函数 $f(x, t) = \frac{\int_0^t dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy}{\left[\left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)^x - 1 \right] \arctan t^{\frac{3}{2}}}$, ($x > 0, t > 0$).

(1) 求函数 $I(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t)$ ($t > 0$) 的表达式;

(2) 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} I(t)$.

【分析】(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t)$ 时应注意的是, $f(x, t)$ 中只有分母与 x 有关.

(2) 为了计算 $\lim_{t \rightarrow 0^+} I(t)$, 应通过交换积分次序将它的分子部分 $\int_0^t dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy$ 的 t 集中到外层积分的上限, 以便使用洛必达法则.

【详解】(1) 由于对 $t > 0$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)},$$

$$\text{其中, } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left[1 - \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x}{t^2} \right) \right]}{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x}{t^2} \right)}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} -\frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \left(\frac{x}{t^2} \right)^2}{\frac{1}{x^2}} = -\frac{2}{\pi} t^2,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)^x = e^{-\frac{2}{\pi} t^2}$ ($t > 0$), 从而

$$I(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \frac{\int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy}{(e^{-\frac{2}{\pi}t^2} - 1) \arctan t^{\frac{3}{2}}}.$$

$$(2) \text{ 由于 } \int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy = \iint_D \sin y^2 dy \text{ (其中 } D = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq t, 0 \leq x \leq \sqrt{t}\} = \\ \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq t\}) \\ = \int_0^t dy \int_0^{\sqrt{y}} \sin y^2 dx = \int_0^t \sqrt{y} \sin y^2 dy.$$

$$\text{此外, } (e^{-\frac{2}{\pi}t^2} - 1) \arctan t^{\frac{3}{2}} \sim -\frac{2}{\pi}t^2 \cdot t^{\frac{3}{2}} = -\frac{2}{\pi}t^{\frac{7}{2}} (t \rightarrow 0^+),$$

$$\text{所以, } \lim_{t \rightarrow 0^+} I(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy}{(e^{-\frac{2}{\pi}t^2} - 1) \arctan t^{\frac{3}{2}}} \\ = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t \sqrt{y} \sin y^2 dy}{-\frac{2}{\pi}t^{\frac{7}{2}}} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{t} \sin t^2}{-\frac{7}{\pi}t^{\frac{5}{2}}} = -\frac{\pi}{7}.$$

【评注】(I) 本题是未定式极限计算与积分上限函数求导及二次积分交换积分次序等的综合题.

(II) 本题的核心问题是计算未定式的极限,在题解中运用了计算未定式极限的两个常用技巧:

(a) 计算“ 1^∞ ”, “ 0^0 ” 和 ∞^0 型未定式极限 $\lim [f(x)]^{g(x)}$, 按以下方法转换成计算“ $\frac{0}{0}$ ” 或 “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” 型未定式极限:

$$\lim [f(x)]^{g(x)} = e^{\lim g(x) \ln f(x)} = e^{\lim \frac{\ln f(x)}{1/g(x)}};$$

(b) 计算“ $\frac{0}{0}$ ” 型未定式极限 $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 时, 一般先对 $f(x)$ 或 $g(x)$ 用等价无穷小代替, 然后再考虑用洛必达法则.

本题解答中有两处使用了等价无穷小代替:

$$\text{对 } t > 0, \ln \left[1 - \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x}{t^2} \right) \right] \sim -\frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x}{t^2} \right) (x \rightarrow \infty),$$

$$(e^{-\frac{2}{\pi}t^2} - 1) \arctan t^{\frac{3}{2}} \sim -\frac{2}{\pi}t^2 \cdot t^{\frac{3}{2}} = -\frac{2}{\pi}t^{\frac{7}{2}} (t \rightarrow 0^+).$$

例 1.1.5* 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n (2n+1)!} t^{2n+1}$ 的和函数为 $s(t)$, 求

(1) $s(t)$ 的表达式;

$$(2) \text{ 极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x s(t) dt - \frac{x^2}{2}}{x^3 (\sqrt[3]{1+x} - e^x)}.$$

【分析】(1) 利用 $\sin t$ 的麦克劳林级数展开式求 $s(t)$ 的表达式.

(2) 利用等价无穷小代替和洛必达法则计算所给的“ $\frac{0}{0}$ ”型未定式极限.

【详解】(1) 由于 $\sin t = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} t^{2n+1} (-\infty < t < +\infty)$, 所以

$$s(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n (2n+1)!} t^{2n+1} = \sqrt{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^{2n+1} = \sqrt{2} \sin \frac{t}{\sqrt{2}} (-\infty < t < +\infty).$$

(2) 由于在点 $x=0$ 的充分小邻域内有

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{1+x} - e^x &= \left[1 + \frac{1}{3}x + o(x^2)\right] - [1 + x + o(x^2)] \\ &= -\frac{2}{3}x + o(x^2), \end{aligned}$$

即 $\sqrt[3]{1+x} - e^x \sim -\frac{2}{3}x (x \rightarrow 0)$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x s(t) dt - \frac{x^2}{2}}{x^3 (\sqrt[3]{1+x} - e^x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x s(t) dt - \frac{x^2}{2}}{-\frac{2}{3}x^4}$$

$$\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{s(x) - x}{-\frac{8}{3}x^3} = -\frac{3}{8} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} - x}{x^3}$$

$$\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} -\frac{3}{8} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{x}{\sqrt{2}} - 1}{3x^2} = \frac{1}{8} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2}{x^2} = \frac{1}{32}.$$

【评注】 本题是未定式极限计算与幂级数求和等的综合题.

例 1.1.6 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + x + \frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}} = e^3$, 求

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$;

(2) 二阶导数 $f''(0)$.

【分析】(1) 由题设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + x + \frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}} = e^3$ 知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 因此由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left[1 + \frac{f(x)}{x}\right]}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}}$$

知, 只要算出极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ 即可.

(2) 根据(1)算得的极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$, 由洛必达法则和导数定义可得 $f''(0)$ 的值.

【详解】(1) 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + x + \frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}} = e^3$, 知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[x + \frac{f(x)}{x}\right] = 0$, 所以

$$e^3 = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + x + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left[1 + x + \frac{f(x)}{x} \right]}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{f(x)}{x}}{x}} = e^{1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}}.$$

由此得到 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2$. ①

$$\text{从而 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}} = e^2.$$

(2) 由(1)推得的 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[x + \frac{f(x)}{x} \right] = 0$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 可以得到

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

于是由 ① 得

$$2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{1}{2} f''(0),$$

即 $f''(0) = 4$.

【评注】(I) 本题是关于抽象函数 $f(x)$ 的未定式极限计算与二阶导数计算的综合题.

(II) 在本题的假设下, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2$, 按如下方法计算 $f''(0)$ 是错误的:

$$\text{因为 } 2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = \frac{1}{2} f''(0),$$

所以 $f''(0) = 4$.

这是因为 $f(x)$ 仅在点 $x = 0$ 处二阶可导, 所以 $f''(x)$ 在 $x \neq 0$ 处未必存在, 因此对极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x}$ 不能应用洛必达法则.

例 1.1.7 设函数 $f(x)$ 可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = c \neq 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{bx - \sin x}{t} \ln(1+t^3) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)],$$

求常数 a, b, c .

【分析】 利用拉格朗日中值定理知所给等式右边极限存在且不为零, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0.$$

由此算得 a, b 以及 c 的值.

【详解】 由于 $f(x)$ 可导, 所以由拉格朗日中值定理知存在 $\xi \in (x, x+1)$, 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi).$$

于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} f'(\xi) = c \neq 0$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{bx - \sin x}{t} \ln(1+t^3) dt = c \neq 0. \quad \text{①}$$

由此可知 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0$. 从而 $a = 0$. 事实上, 如果 $a > 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = \int_a^0 \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt < 0;$$

如果 $a < 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = \int_a^0 \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt > 0,$$

它们都与 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0$ 矛盾.

将 $a = 0$ 代入 ① 得

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b - \cos x}{\ln(1+x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b - \cos x}{x^2}, \quad (2)$$

于是 $\lim_{x \rightarrow 0} (b - \cos x) = 0$, 因此 $b = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.

将它代入 ② 得

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

【评注】(I) 本题是未定式极限计算与微分中值定理及积分上限函数求导等的综合题.

(II) 本题实质上是在已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx - \sin x}{\int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \neq 0$ 的条件下, 确定常数 a, b 和 c ,

这是未定式极限的另一种题型.

一般来说, 未定式极限有以下三种题型.

- 计算具体函数的未定式极限(如例 1.1.4, 例 1.1.5);
- 在抽象函数的某些假定条件下, 计算关于这个抽象函数的未定式极限(如例 1.1.6);
- 在已知未定式极限存在的条件下, 确定含于这个未定式中常数的值, 并计算这个未定式极限(如本题).

(III) 题解中从 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0$ 得到 $a = 0$ 的推理过程应细细体会和理解.

§ 1.1.3 函数的连续性

简明提要

1. 函数连续性的定义

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0),$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个左半邻域, 即 $(x_0 - \delta, x_0]$ (或右半邻域, 即 $[x_0, x_0 + \delta)$) 上有定义, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \text{ (或 } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)),$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左连续(或右连续).

如果函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 的每点都连续, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续.

如果函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 且在点 $x = a$ 处右连续和在点 $x = b$ 处左连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

2. 闭区间上连续函数的性质

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值和最小值. (最大值最小值定理)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则对任意介于 $A = f(a), B = f(b)$ 的实数 C , 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = C$. (介值定理).

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$. (零点定理).

本节给出 2 个函数的连续性与高等数学其他部分结合的综合题例子.

例 题

例 1.1.8 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^4 + ax + b}{(x-1)(x+2)}, & x \neq 1, -2, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$

求: (1) 常数 a, b 使得 $f(x)$ 在与 $x = 1$ 处连续;

(2) 求 $f^{(n)}(x) (n = 1, 2, \dots)$.

【分析】(1) 由 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + ax + b}{(x-1)(x+2)} = 2$ 计算常数 a, b .

(2) 将由(1)算得的 a, b 代入 $f(x)$, 然后计算 $f^{(n)}(x)$.

【详解】(1) 使 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处连续的 a, b 必须满足

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1), \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + ax + b}{(x-1)(x+2)} = 2. \quad \textcircled{1}$$

由 ① 可知 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^4 + ax + b) = 0$, 所以

$$b = -1 - a. \quad \textcircled{2}$$

将 ② 代入 ① 得

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + ax + b}{(x-1)(x+2)} = 2, \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 + x + 1 + a}{x+2} = 2.$$

由此得到 $a = 2$, 从而由 ② 得 $b = -3$.

(2) 将(1)算得的 a, b 代入 $f(x)$ 得

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} \frac{x^4 + 2x - 3}{(x-1)(x+2)}, & x \neq 1, -2, \\ 2, & x = 1 \end{cases} = \frac{x^3 + x^2 + x + 3}{x+2} (x \neq -2) \\ &= x^2 - x + 3 - \frac{3}{x+2} (x \neq -2). \end{aligned}$$

所以,当 $x \neq -2$ 时,

$$f'(x) = 2x - 1 + \frac{3}{(x+2)^2},$$

$$f''(x) = 2 - \frac{6}{(x+2)^3},$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \frac{3 \cdot n!}{(x+2)^{n+1}} (n = 3, 4, \dots).$$

【评注】(I) 本题是函数连续性与导数及高阶导数计算的综合题。

(II) 计算 $f^{(n)}(x)$ 时应先把 $f(x)$ 表示成

$$f(x) = \frac{x^3 + x^2 + x + 3}{x+2} = x^2 - x + 3 - \frac{3}{x+2}.$$

(III) 应记住常用函数的高阶导数公式:

$$(e^x)^{(n)} = e^x, (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} \cdot n\right), (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi}{2} \cdot n\right),$$

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}, [\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}.$$

例 1.1.9 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $\varphi(x)$ 可导,且在点 $x = 0$ 处二

阶可导,以及 $\varphi(0) = 1$.

(1) 试确定 a 的值,使得 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续;

(2) 求 $f'(x)$.

【分析】(1) 利用 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 确定 a 的值.

(2) 由求导公式计算 $f'(x)$ ($x \neq 0$),并由导数定义计算 $f'(0)$.

【详解】(1) 欲使 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续,必须

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0), \text{即} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x} = a,$$

于是 $a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} [\varphi'(x) + \sin x] = \varphi'(0)$.

(2) 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{\varphi(x) - \cos x}{x} \right] = \frac{[\varphi'(x) + \sin x]x - [\varphi(x) - \cos x]}{x^2}. \quad \textcircled{1}$$

此外, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\varphi(x) - \cos x}{x} - \varphi'(0)}{x}$ (利用(1))

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \cos x - x\varphi'(0)}{x^2}$$

$$\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi'(x) + \sin x - \varphi'(0)}{x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi'(x) - \varphi'(0)}{x} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \varphi''(0) + \frac{1}{2}. \quad \textcircled{2}$$

【评注】本题是函数连续性与导数定义等的综合题。