

# 延庆县 畜禽疫病志

1949—1989

延庆县畜牧局编印

一九九〇年六月

# 延庆县畜禽疫病志

1949—1989

延庆县畜牧局编印

延庆县畜禽疫病普查领导小组成员



图一左起前排：冯富春 邹志刚 段金生 赵金有  
后排：刘鹏天 马宝林 赵继承 武秋海 郭成林 张敬忠

延庆县畜禽疫病志编纂人员



图二左起前排：刘鹏天 马宝林  
后排：郭成林 武秋海 赵继承 张敬忠



## 延庆县畜禽疫病普查领导小组

组 长： 段金生 农林办公室付主任

付组长： 王 信 商贸委付主任

邹志刚： 畜牧局付局长

成 员：

谢 信 食品公司付经理

刘晓声 县联社付主任

冯富春 畜牧局付局长

赵金友 财政局农财科付科长

马宝林 畜牧兽医工作站站长

## 延庆县畜禽疫病普查办公室

主 任： 马宝林

成 员： 郭成林 刘鹏天 张敬忠

赵继承 武秋海

编志组： 马宝林 郭成林 刘鹏天

张敬忠 赵继承 武秋海

一九九〇年六月

## 延庆县畜禽疫病普查领导小组

组 长： 段金生 农林办公室付主任

付组长： 王 信 商贸委付主任

邹志刚： 畜牧局付局长

成 员：

谢 信 食品公司付经理

刘晓声 县联社付主任

冯富春 畜牧局付局长

赵金友 财政局农财科付科长

马宝林 畜牧兽医工作站站长

## 延庆县畜禽疫病普查办公室

主 任： 马宝林

成 员： 郭成林 刘鹏天 张敬忠

赵继承 武秋海

编志组： 马宝林 郭成林 刘鹏天

张敬忠 赵继承 武秋海

一九九〇年六月

# 前 言

《延庆县畜禽疫病志》，首次成书，应该庆幸。它系统地总结了畜禽疫病防治的历史经验和疫病的发生发展规律。供更好地贯彻执行《家畜家禽防疫条例》，做好畜禽疫病防治工作，保证畜牧业健康发展借鉴。

延庆县畜牧局根据农业部（1986）农牧字第58号文件精神和北京市畜牧局（医）字（89）38通知要求，在北京市畜牧局和县委政府的领导支持下，成立了畜禽疫病普查领导小组和办公室，编写了《延庆县畜禽疫病志》。在编写中，坚持了实事求是的科学态度，做到了详今略古；内容上，力争纵不断限，横不缺项，突出延庆县畜禽疫病防治特点。本志从一九四九年至一九八九年底，（个别章节延至一九九〇年五月底），记述了延庆县解放四十年来，畜禽疫病防治工作的迭起与发展，兽医机构和防治疫病政策的演变，主要畜牧兽医、科技进步。比较全面系统地反应了延庆县畜禽疫病防治的历史面貌。

《畜禽疫病志》是延庆县历史上第一部畜禽疫病志书，全书共二篇十三章，由于我们编写水平有限，其中错误遗漏之处难免，恳请批评指正。

本志在编写过程中，承蒙北京市畜牧兽医工作站、延庆县财政局、档案局、统计局、农业局、水利局、林业局、民政局、环保局、农经管理站、公路管理所、农业区划办公室、饲料公司、肉联厂等单位 and 畜牧局下属各科、室、场、站的大力支持与热情协助；市、县、局有关领导，在职的和已离退休的畜牧兽医干部、科技人员，为编写本志提供了大量宝贵资料，在此一并致谢。

延庆县畜禽疫病编志组

一九九〇年六月

# 目 录

前 言	.....	
第 一 篇 概 况	.....	( 1 )
第 一 章 自然地理概况	.....	( 1 )
第 一 节 基本情况	.....	( 1 )
第 二 节 地形地貌、水文气候	.....	( 1 )
第 三 节 土壤植被	.....	( 9 )
第 四 节 交通运输	.....	( 15 )
第 五 节 自然疫源地	.....	( 15 )
第 六 节 环境污染情况	.....	( 16 )
第 二 章 畜牧业经济概况	.....	( 17 )
第 一 节 畜牧业生产	.....	( 17 )
第 二 节 主要畜食品种	.....	( 20 )
第 三 节 饲草饲料	.....	( 21 )
第 三 章 兽医组织机构	.....	( 33 )
第 一 节 兽医行政组织机构	.....	( 33 )
第 二 节 兽医科研和教育机构	.....	( 39 )
第 三 节 其它系统的兽医机构	.....	( 40 )
第 四 章 畜禽疫病防治概况	.....	( 83 )
第 一 节 疫病情况	.....	( 83 )
第 二 节 畜禽疫病防治情况	.....	( 87 )
第 三 节 存在问题	.....	( 88 )
第 四 节 防治规划	.....	( 89 )
第 二 篇 畜禽疫病与防治	.....	( 91 )
第 一 章 猪 病	.....	( 91 )
第 一 节 猪 瘟	.....	( 91 )
第 二 节 口蹄疫	.....	( 96 )
第 三 节 猪传染性水泡病	.....	( 103 )

第四节	传染性胃肠炎	(103)
第五节	流行性腹泻	(103)
第六节	伪狂犬病	(103)
第七节	萎缩性鼻炎	(103)
第八节	炭疽	(103)
第九节	布氏杆菌病	(103)
第十节	链球菌病	(104)
第十一节	传染性胸膜肺炎	(104)
第十二节	弓形虫	(104)
第十三节	密螺旋体痢疾	(104)
第十四节	旋毛虫	(105)
第十五节	囊虫	(105)
第二章	禽病	(106)
第一节	鸡瘟〔A型流感〕	(106)
第二节	新城疫	(106)
第三节	马立克氏病	(110)
第四节	法氏囊病	(115)
第五节	鸭瘟	(115)
第六节	小鹅瘟	(115)
第七节	鸚鵡热	(115)
第八节	禽霍乱	(115)
第九节	雏白痢	(118)
第十节	球虫	(122)
第三章	牛病	(126)
第一节	口蹄疫	(126)
第二节	兰舌病	(126)
第三节	粘膜病	(126)
第四节	白血病	(126)
第五节	传染性鼻气管炎	(126)
第六节	牛瘟	(126)
第七节	传染性胸膜肺炎	(126)
第八节	布氏杆菌病	(127)
第九节	结核	(127)

第十节	付结核	(131)
第十一节	炭疽	(131)
第十二节	焦虫病	(131)
第十三节	锥虫病	(132)
第十四节	日本血吸虫病	(132)
第四章	羊病	(136)
第一节	兰舌病	(136)
第二节	口蹄疫	(136)
第三节	羊痘	(136)
第四节	梅迪病	(136)
第五节	痒病	(136)
第六节	衣原体病	(136)
第七节	布氏杆菌病	(136)
第八节	炭疽	(137)
第九节	羊梭菌病	(137)
第十节	疥癣	(137)
第十一节	羊脑脊髓丝状虫病	(139)
第五章	马病	(143)
第一节	马传染性贫血	(143)
第二节	鼻疽	(146)
第三节	炭疽	(146)
第四节	焦虫病	(151)
第五节	锥虫病	(151)
第六章	兔病	(157)
第一节	兔瘟(暂定名)	(157)
第二节	球虫	(159)
第三节	螺旋体	(160)
第四节	疥癣	(160)
第七章	其它动物疫病	(165)
第一节	狂犬病	(165)
第八章	主要中毒病、代谢病	(168)
第一节	黄牛辽东栎树叶中毒	(168)
第九章	家畜家禽疫病现症普查	(171)

第一节	猪弓形虫病	(172)
第二节	猪胸膜肺炎	(173)
第三节	猪细小病毒病	(173)
第四节	猪喘气病	(174)
第五节	滑膜囊霉形体病	(174)
第六节	禽败血霉形体	(174)
第七节	鸡法氏囊炎	(175)
第八节	牛病毒性腹泻	(175)

# 第一篇 概 况

## 第一章 自然地理概况

### 第一节 基本情况

延庆县位于北京城西北郊。县城距北京城区约八十公里，是北京市远郊县之一。地处东经  $115^{\circ}44'$ — $116^{\circ}34'$ ，北纬  $40^{\circ}16'$ — $40^{\circ}47'$ 。东临怀柔县、南连昌平县、西北两面与河北省的怀来、赤城二县接壤，西南也与怀来县隔官厅水库相望。

全县幅员面积1992.7平方公里，东西长65公里、南北宽46公里，其中山区面积1514.4平方公里，占总面积的76%。

行政区划据一九八九年资料：分为一镇，二十五个乡、三百九十二个村民委员会、七百零一个村民小组，总户数为86211户，其中农户为69829户、非农户为16382户，总人口267353人，其中农业人口为227725人，农业劳动力为64933个、牧业劳动力为2404个。

全县总耕地面积为511231亩，其中集体耕地476846亩。

全县有少数民族十二个，6300多人，其中满族最多，回族次之。满族主要居住在永宁、下屯、康庄；回族大部集居在西拔子、康庄一带。

### 第二节 地形地貌、水文气候

#### 一、地形地貌

延庆县地形属延怀盆地的一部分。东北高、西南低，南、北、东三面环山，西南临官厅水库，在西南部形成山间盆地——即延怀盆地一部分。是第三纪初期，我国大陆受太平洋板块的挤压和燕山运动的影响，有了延庆山脉的雏形，到第四纪高山和高原剧烈变动，此时在海坨山和军都山之间发生塌陷，形成了今日延庆怀来盆地。在盆地中部为倾斜洪积平原，海拔一般为500—600米，山区海拔一般为1000米，座落在西北部，最高山峰——海坨山海拔2241米，是本市的第二高峰。川区面积478.3平方公里占总面积的24%，山区面积1514.4平方公里占总面积的76%，是华北平原到坝上高原的过度地带。

县内山脉大致走向北东与东西的。由中部北起佛爷顶、经九里梁至凤坨梁，形成一自然

分水岭。分水岭以西为山前平原区，以东为山后区，平原区的高度均在510米以下，由东北至西南倾斜，妫河从东向西流入官厅水库，地形上构成一个典型的开放式盆地，延庆北部的海坨山是本县最高山峰，海拔2241米，最低在黑河和白河汇合处，海拔400米，最大高差1841米。南山名为军都山，属燕山山脉的一部分，整个山脉走向是从西北向东南。北部山脉和燕山山脉相连接，东北部山区是西南高东面低。白河从西向东流去。

全县的山脉有中山、低山和山间谷沟，一般高程700—1000米。山前有洪积扇，河流两岸有狭长的冲积平原。南部山区有黄土沉积物，从山口流出的洪水侵蚀严重，把黄土切割的比较零乱，黄土地貌明显。

## 二、水文

延庆县位于海河流域三个水系上游，流经境内的白河、妫水河、佛爷口河、古城河、菜食河、黄花城河、二道河、关沟河等四级以上的河流共十八条。总共流域面积1992.7平方公里(其中三级河流两条，即白河和妫水河)，分属于潮白河水系。白河在本县流域面积828.06平方公里，河道长55公里。白河是北部山区的主要河流，发源于河北省沽源县，经赤城县下堡村流入延庆县白河堡，东向红旗甸、千家店、沙梁子四个乡，在下湾村下游进怀柔县，注入密云水库。黑河和菜食河是白河的两大大支流。

北运河水系，有两条支流，一条是发源于大庄科乡的东沙河，另一条是发源于西拔子乡三堡的关沟河，县内流域面积108.3平方公里。

永定河水系的妫水河发源于县东部山麓，永宁乡上磨村北，沿平原中部流向西南，经井庄、沈家营等乡，在县城西南注入官厅水库。在境内流域面积1073.64平方公里。河道长18.5公里，约占全县总面积的53.4%。主要支流有佛峪口河、古城河、蔡家河、三里河等。在支流上已经修建了佛峪口水库、古城水库、香村营拦河闸等蓄水工程，沿河两岸修建了许多中小型扬水站，是全县平原地区上水灌溉的主要河道。


据计算本县标准年降水及产生径流见下表

项 目		多年平均	平水年 P=50%	枯水年 P=75%
降水量(亿方)		9.82	9.48	7.69
径 ( 亿 流 方 量)	合 计	2.20	1.78	1.09
	平 原	1.08	0.98	0.56
	山 区	1.12	0.80	0.53

上述河道因降水集中，常有暴雨，山区植被稀疏，骨干河道又无大型控制性工程，所以洪水灾害时有发生，解放后，三十年中较大的水灾就有六次。一九五六年最为严重，受灾面积达39万亩，其中重灾10万亩，减产1360多万公斤。

# 延庆地势

1 : 400000





# 延庆县水系流域简图

1:400000

