

德宏民族药志



AKHKUNG AMYU
TSI MASAT

德宏州卫生局药品检验所

1983.8

前　　言

德宏傣族景颇族自治州，位于东经九十七度五十分至九十八度三十五分，北纬二十四度零一至二十四度四十八分。自然条件优厚，雨量充沛，是以南亚热带为主，兼有准热带，暖温带，高寒带的立体气候。海拔最高3400米，最低210米。高黎贡山和怒江山脉横贯全境，大盈江、龙江、瑞丽江、芒市大河、南畹河及大小支流100多条流经境内，形成较大的河谷盆地20个。盛产热带、亚热及暖温带多种南药和经济作物，是一块美丽富饶的天然宝地。

解放前，由于帝国主义、国民党和土司、山官、地主的反动统治和残酷剥削，社会发展十分缓慢。疟疾、鼠疫流行，病魔交加，美丽富饶的孔雀之乡，成了中外闻名的“瘴疠之区”。

解放后，党对民族地区卫生工作极其重视，卫生事业得到很大的发展，少数民族医药受到应有的保护。十年动乱中，民族医生受到批判打击，医药书籍被焚毁，民族医药事业遭到严重摧残。党的十一届三中全会以来，党的民族政策得到进一步贯彻落实，中央对发掘整理民族医药遗产非常重视，把民族医药纳入了卫生工作的议事日程。为继承少数民族医药遗产，在州卫生局的直接领导下，我所对民族医药进行了初步调查。~~我们少数民族和其他兄弟民族一样，在漫长的历史进程中，在生活和生产实践中，积累了许多与疾病作~~

斗争的医药知识。按傣族民间的说法，傣族医药已有两千多年的历史。由单方发展到配方、验方，并有了自己的医书。各民族间医生，有许多独特的药物，如傣药“芽节”治疗消化不良，胃十二脂肠溃疡，景颇族药“生藤”治疗感冒，崩龙族药“旱莲草”治疗胃肠出血，阿昌族药“朱砂根”治疗结肠炎和月经不调，傈僳族药“岩陀”治疗跌打损伤等等。少数民族医药对各民族的繁衍昌盛，防病治病都起到了积极的作用。我们根据几年来调查资料，初步作了整理，汇编成《德宏民族药志》（第一集），作为继承学习民族医药的初步尝试，并向建州三十周年献礼。以后还将陆续出版，以便把各少数民族医药学发扬光大。

在编印过程中得到州民委、各县（镇）卫生局以及傣族医生李波卖、李二宝、方波岩二宝、管有清，景颇族医生梅干等同志的帮助。在编印过程中得到州民族出版社、团结报的大力支持，特一并致谢！

鉴于我们水平有限，经验缺乏，时间仓促，不足之处难免，敬请批评指正，以便把这项工作做的更好。

云南省德宏州卫生局药品检验所
一九八三年八月二十日

目 录

二 画

- | | |
|----------|-------|
| 七叶莲..... | (1) |
| 八角枫..... | (4) |

三 画

- | | |
|------------|--------|
| 大绿藤..... | (7) |
| 大将军..... | (10) |
| 大百部..... | (13) |
| 大麻药..... | (16) |
| 大叶斑鸠菊..... | (19) |
| 大血藤..... | (21) |
| 乌鞭草..... | (24) |
| 山乌龟..... | (27) |
| 山柰..... | (30) |
| 山胡椒..... | (33) |
| 小粘叶..... | (36) |
| 小功劳..... | (39) |
| 小黄散..... | (42) |
| 小麻药..... | (45) |
| 土半夏..... | (48) |

千里找根	(51)
三叶刺针草	(54)
万丈深	(57)
飞龙掌血	(60)
三对节	(63)
土党参	(66)

四 画

中华槲蕨	(68)
水红木	(71)
火烧花	(74)
车前草	(77)
五加	(80)
水菖蒲	(83)

五 画

龙葵	(85)
白芨	(88)
白雪花	(91)

六 画

光亮蕕蕨	(94)
红紫珠	(97)
红薇花	(100)
回心草	(103)

闭鞘姜	(106)
阴地蕨	(109)
朱砂根	(111)
多花落新妇	(113)

七 画

鸡蛋花	(115)
杠板归	(118)
含羞草	(121)
佛掌榕	(124)
鸡冠花	(127)
旱莲草	(130)
卵叶马兜铃	(133)
芫 莪	(135)

八 画

蕓 麻	(137)
金丝杜仲	(140)
苦石莲	(143)
虎 杖	(146)
鱼腥草	(149)
刺天茄	(152)
歪叶子兰	(155)
果上叶	(158)
刺针草	(161)

泽 兰	(164)
单行节肢蕨	(167)

九 画

砂 仁	(169)
须药藤	(172)
南山藤	(175)
重 楼	(178)
冠唇花	(181)
脉耳草	(184)
骨碎补	(187)
茜 草	(190)
姜 黄	(193)

十 画

海金沙	(195)
栗寄生	(198)

十一画

阉鸡尾	(201)
续 断	(204)
猫须草	(207)
麻叶蟛蜞菊	(210)
猪鬃草	(213)
黄锁梅	(216)

萝芙木	(219)
黄 葵	(222)

十二画

锅铲叶	(225)
野花椒	(228)
野薏仁	(231)
紫 桂	(234)
落地生根	(237)
翻白叶	(239)

十四画

舞 草	(241)
蜘蛛香	(244)
蜜蒙花	(247)

十六画

糖胶树	(250)
-----	-------	---------

附：羽叶岩陀	(253)
岩血竭	(256)
拉丁学名索引	(259)

分族目录

傣族药

七叶莲	(1)
八角枫	(4)
大绿藤	(7)
大将军	(10)
大百部	(13)
大麻药	(16)
小麻药	(45)
小黄散	(42)
小功劳	(39)
小粘叶	(36)
马鞭草	(24)
山乌龟	(27)
山 奈	(30)
土半夏	(48)
千里找根	(51)
三叶刺针草	(54)
中华槲蕨	(68)
龙 葵	(85)
白 茂	(88)

光亮茀蕨	(94)
鸡蛋花	(115)
杠板归	(118)
芸 麻	(137)
金丝杜仲	(140)
苦石莲	(143)
虎 杖	(146)
鱼腥草	(149)
刺天茄	(152)
砂 仁	(169)
海金沙	(195)
阉鸡尾	(201)
续 断	(204)
舞 草	(241)

景颇族药

万丈深	(54)
飞龙掌血	(60)
大叶斑鸠菊	(19)
大血藤	(21)
山胡椒	(33)
三对节	(63)
水红木	(71)
火烧花	(74)
车前草	(77)
白雪花	(91)

红紫珠	(97)
红薇花	(100)
回心草	(103)
闭鞘姜	(106)
含羞草	(121)
佛掌榕	(124)
鸡冠花	(127)
歪叶子兰	(155)
果上叶	(158)
泽 兰	(164)
须药藤	(172)
南山藤	(175)
冠唇花	(181)
脉耳草	(184)
栗寄生	(198)
猫须草	(207)
麻叶蟛蜞菊	(210)
猪鬃草	(213)
黄锁梅	(216)
萝芙木	(219)
黄 葵	(222)
锅铲叶	(225)
野花椒	(228)
野薏仁	(231)
紫 桂	(234)

蜘蛛香	(244)
密蒙花	(247)
糖胶树	(250)
刺针草	(161)
重 楼	(178)

崩龙族药

土党参	(66)
阴地蕨	(109)
卵叶马兜铃	(133)
旱莲草	(130)
骨碎补	(187)
茜 草	(190)
落地生根	(237)
翻白叶	(239)

阿昌族药

水菖蒲	(83)
五 加	(80)
朱砂根	(111)
多花落新妇	(113)
芫 萎	(135)
单行节肢蕨	(167)
姜 黄	(193)

傈僳族药

羽叶岩陀	(253)
岩血竭	(256)

သမာဝမိန္ဒ

(傣族名)

寒来买（音译）凉药（意译）

七叶莲

拉丁学名：*Schefflera arboricola Hayata.*

植物特征：常绿小乔木，高5—7米。树皮灰白色，枝条粗壮，绿色，有黄色皮孔。掌状复叶互生，小叶5—7片，椭圆形，5—10厘米，宽2.5—4厘米，先端短渐尖，基部圆形至微心形，全缘，上面绿色，背面色较淡，小叶柄长2—4厘米，两端稍增粗。夏季开花，花白色，芳香，圆锥花序，大而顶生，长约15厘米。浆果球形，顶端有短粗状柱头一枚，成熟时暗紫色。

生长环境：生于阴湿的密林中。全州各县有分布。

采集加工：药用全株，秋末冬初采集，鲜用或晒干备用。

性味功效：甘，淡，温。止痛消肿，舒筋活络。

传统用药经验：跌打损伤，慢性风湿性关节炎。

用法用量：每用15克—30克，煎服。或用本品30克，泡

酒半斤，浸泡48小时后内服，每次10毫升，一日三次。亦可用鲜品适量捣烂敷患处。

化学成分：鹅掌藤的嫩枝含有挥发油，含量0.1—0.2%。

附注：孕妇忌服。

Խեժամի՛տիլու: Ալընլրսմինթւ, սմօսլը ռլոսլ չի չի, սմիսլրտալը սնուրանսմնը.

Սմիտլշալոսմիզ: Դին, ունի, ոլու. սմի՛տլրսմիօսլր, չւ սմիսլը ալը.

Սյոհալընլընմինի: Ծմ՛տի սլդսիո, պին սմին ֆլոսմի՛սմինսմին.

Ալթա՛լալըմիզ: Ալքալը 15—30գլ, սմիալ. Ձը ալը ալըսլիտիզօալը, ածսմիօսին սմիսմին, ածս48սմիօսմի՛զըօալը ալքալը, ալքսմի՛սմի՛սմին, ամսմի՛3սմի. Ամս ձը ալը սմին աթիսմի՛սմիտօսմինֆլալընլ.



七叶莲（五加科 鹅掌柴属）

မြန်မာ များ

(傣族名)

买拉冷 (音译) 里外光滑 (意译)

八 角 枫

拉丁学名: *Alangium chinense* (Lour.) Rehd.

植物特征: 落叶乔木, 高可达15米。根白色, 须根多。枝开展, 幼芽有黄褐色茸毛。单叶互生, 叶形变异大, 多呈阔卵形或圆形, 长15—18厘米, 宽4—12厘米, 边全缘或有3—7裂齿, 形似枫叶, 故名“八角枫”, 叶柄长。夏季开花, 花小, 白色, 腋生聚伞花序。果卵形, 长约7毫米, 熟时黑色。

生长环境: 多生于灌木丛中或阴湿杂木林内。全州各县均分布。

采集加工: 药用根及叶。夏季采叶, 根全年可采。洗净, 切碎, 晒干备用或鲜用。

性味功效: 辛, 微温。有毒。

传统用药经验: 精神病。

用法用量: 每次3克, 水煎服。研粉0.2—0.3克, 开水

或酒吞服，一个疗程7天。

药化: 根及叶主要含生物碱，并显强心甙，酚类和氨基酸反应。

药理：本品含生物碱对哺乳动物实验性有肌肉松弛作用。

ՆԻՇՎՅՄ' ՎԻՐԱՐՈՒ : ԱԾԸՆՎԵՐԴԱՅԻՆ ՎԲՄ' ԱԲԻ ՍՅՅՈՒ . ԱՎ' ՎԲՄ' ՎԻՇ
ԱԲԻ , ԴՅԻՆ ՍՄԻԹՈՒՆԻ ԱԼԵՎԱՐԱՋ , ՎԲՄ' ՎԲԹՅ , ԱԲԻ ՍՎՐՅ , ՎԻՃ ՎԻՆ ՎԲՄ'
ԱԼԵՎԱԼՄ ՍՄԻԹԱՎՐ 。

Նմի՞նչ ուշադրությունը։ Նմի՞նչ, սկզբան։ ԱՌԵԴՈՒՇՈՒ։

ԿՐԻԴԱՀԱՂԻՆԸ՝ ԴԲԻՆՈՒՅԻՆ ԱԲԻՆԱՅԻՆ ՍՄԻՒՅԻՆ

մլրժա՛նլրշիր: Ալյուսթ՝ Յալի՝ Սլյուտիտ՝, ովհալի
0.2—0.3 ալ, Տայսլյալը՝ Միջադար՝, ամերկից մինչև 7 ամին.