

# 沈阳市郊区蔬菜品种志

沈阳市科学技术委员会  
沈阳市农业生产委员会  
印

# 前 言

沈阳市的蔬菜种籽工作，从解放以来，在党的领导下取得了很大成绩。广大菜农根据多年生产经验，选育了一些优良品种，也引进了一些新品种。这些品种，对沈阳市郊的蔬菜生产，有直接推动作用。但由于过去没有进行系统地调查和整理，还存在着同物异名，同名异物，张冠李戴，名不符实等混乱现象，给生产上造成一定损失；特别对种菜经验较少的新菜队，常常因为搞不清楚品种名称与特性，凭借道听途说进行生产，损失更大。有鑑及此，从今年春天开始，在市科委的领导下，市农委组织市蔬菜试验站、市蔬菜种籽站和郊区农业技术推广站，对市郊区目前栽培的蔬菜品种，进行了一次普遍调查和资料蒐集，经过研究、整理后，写成这本品种志。

沈阳市郊栽培的蔬菜品种，近几十年来变化很大：由少到多，由简及繁。在四、五十年以前栽培的蔬菜，主要是本地、省内和东北区内的地方品种。如当时普遍栽培的白菜，主要是当地产的“小核头纹”（又称小黑籽）；大萝卜是省内义县产的“义县红萝卜”；其它如菜豆、南瓜、茄子、辣椒、黄瓜等，多为当地产的所谓“本地种”（又称笨种）。其后，由于城市逐渐扩大，需要量增加，原有的地方品种不能全面满足需要，在菜农队伍逐步扩大的同时（由山东、河北等地迁来不少菜农），由山东、河北等地引进了一些品种：如河头白菜、白麻叶白菜、灯笼红萝卜、莱州青萝卜，大白皮芸豆等。这些品种由于产量高、品质好，颇受市场欢迎，一直到现在成为适地适作的优良品种。在日伪统治时期，又从日本引进了许多适于当地栽培的优良品种：如真黑、蔓细千成、紫水茄子，美浓早生、宫重、练马白萝卜，哥本哈根（*Copenhagen markat*，译名丹京早熟）、继承（*Succession*）甘兰，*Ponderosd*、火红柿子，甘栗、缩面南瓜，以及牛蒡、绢荚豌豆等。解放以后，特别是在大跃进前后，又从国内国外引种了不少新品种：从国内各地引进的，如白菜中的大炆菜、跃进一号、天津麻叶系统的小核头纹、乌塌菜等，甘兰中的金早生、海拉尔晚熟、花椰菜等，番茄中的桔黄佳橙、苹果青、锦州矮秧等，以及洋葱、莴笋、刀豆、蚕豆、毛豆、丝瓜、蛇瓜（果羸）蕻菜、苋菜、草头（苜蓿），菜苔、金针菜、生薑、芋头、榨菜、豆薯等；从国外引进的如甘兰中的丹麦早生、中生，荷兰早生、中生，美国晚生，苏联一号；番茄中的苏联大黄，美国大红；以及丹麦的诺贝尔菠菜，日本的春白菜，苏联的牙不利水萝卜等。这就进一步丰富了沈阳郊区的蔬菜品种。

当前郊区栽培的蔬菜，较为普遍的有三十四种类，一百另四个品种。其中原有的地方品种有十四种类计二十五品种。即茄子的品种有三个、辣椒一个、番茄二个、

黄瓜四个、南瓜四个、冬瓜一个、菜豆二个、豇豆一个、豌豆一个、萝卜一个、山药一个、韭菜一个、雪里蕻一个、菠菜一个。其余的二十个种类七十九个品种，都是近四、五十年以内逐步引进来的。

在这些引进的品种中，大部分保留下来了。如灯泡、紫水茄子，继承、金早生甘兰，火红柿子，河头白菜，莱州青萝卜，实心芹菜，双城尖叶菠菜等等；有的颇有栽培前途，逐步在驯化，如丹麦和荷兰的早、中生甘兰，苏联大黄和美国大红番茄，以及洋葱、莴笋、花椰菜等；有的虽适于本地生长，但因当地人民不习惯吃用，因而栽培的极少，如刀豆、蚕豆、丝瓜、蛇瓜、蕹菜、苋菜、苜蓿、菜苔、黄秋葵、毛豆等；有的不完全适于本地栽培，需要进一步试种，如生姜、芋头、茭白等；有的不适于本地栽培而被淘汰了，为榨菜、豆薯、佛手瓜等；有些引进的外国优良品种，由于保存的不好遗失了，如由日本引进的几种白萝卜、缩面南瓜、越瓜、洋芹菜、石刁柏等；还有一些原来的地方品种，由于人民生活习惯的改变而绝种了（如辣根、草石蚕、莲藕等），或者栽培面积大大减少了（如山药、牛蒡、豌豆、荚用豌豆等）。

由于参与这项工作的人力少，时间短促，对那些栽培面积较少的品种，未来得及进行调查、整理，有待于今后继续补充；已经调查、整理的这些资料，也因为我们的业务水平有限，谬误之处，不可能没有。因此，先做内部发行，一方面供给生产单位参考，一方面广泛征求意见，以便进一步修正补充。

編 者

一九六三年十二月

# 目 录

## 一、茄 果 类

<b>茄 子</b>				1
柳条青	2	紫圆茄		6
卵茄子	3	安阳茄		7
紫线茄	4	白圆茄		8
灯 泡	5			
<b>辣 椒</b>				9
朝天猴	10	世界冠军		13
吉林柿子椒	11	尖 椒		14
三道筋	12			
<b>蕃 茄</b>				15
小 桃	16	粉 红		20
牛 奶	17	蘋果青		21
火 红	18	黄珍珠		22
大 桃	19	桔黄佳橙		23

## 二、瓜 类

<b>黄 瓜</b>				25
叶 三	26	宁阳刺瓜		30
小八杈	27	一窝猴		31
大八杈	28	小密刺		32
接架瓜	29			
<b>南 瓜</b>				33
一窝猴	34	青 皮		38
蔓角瓜	35	磨 盘		39
白 皮	36	方 瓜		40
甘 栗	37	白玉瓜		41
<b>冬 瓜</b>				42
架冬瓜	43	地冬瓜		44
<b>菜 瓜</b>				45
大菜瓜	45			
<b>瓠 子</b>				46

### 三、豆 类

<b>菜 豆</b>			47
早熟黄皮	48	大白皮	51
矮生大青皮	49	滚 豆	52
青皮紫筋	50		
<b>豇 豆</b>			53
挑 豆	54	红籽豇豆	56
十八粒	55		
<b>扁 豆</b>			57
紫花扁豆	57		

### 四、根 莖 类

<b>蘿 卜</b>			59
赤峰水萝卜	60	大红袍	64
圈河水萝卜	61	翘头青	65
小五纓	62	白大根	66
灯笼红	63	石家庄白萝卜	67
<b>胡蘿卜</b>			68
小顶金红	69	地八寸	70
<b>大头菜</b>			71
二道眉	72	花叶玉根	73
<b>馬鈴薯</b>			74
男 爵	75		
<b>山 药</b>			76
本山药	76		
<b>牛 蒡</b>			77
<b>菊 芋</b>			78
<b>莴苣笋</b>			79
圆叶莴苣	79		

### 五、白菜、甘蘭类

<b>大白菜</b>			81
二青帮	82	大娃娃	86
唐山快菜	83	跃进一号	87
白麻叶	84	大青帮	88
青帮河头	85		
<b>甘 兰</b>			89
金早生	90	丹麦早生	91

荷兰早生	92	继承	94
牛心	93	斑大古	95
<b>球茎甘兰</b>			96
大平头	96		
<b>花椰菜</b>			97
80天	97		

## 六、葱蒜类

<b>大葱</b>			99
大白皮	100	八叶齐	102
仙鹤腿	101	对白	103
<b>韭菜</b>			104
三楞	105	雍韭	107
马蔺宽	106	燙发韭菜	103
<b>大蒜</b>			109
白皮蒜	110	紫皮蒜	111
<b>洋葱</b>			112
荸荠扁	113	红皮	114

## 七、绿叶菜类

<b>菠菜</b>			115
双城菠菜	116	唐山大叶	118
快菠菜	117	诺贝尔	119
<b>油菜</b>			120
青帮	121	白帮	122
<b>芹菜</b>			123
空腔	124	实心	125
<b>雪里蕻</b>			126
小八杈	126		
<b>茴香</b>			127
大茴香	127		
<b>茼蒿</b>			128
<b>香菜</b>			129
大叶	129		

## 一、茄 果 类

# 茄 子

学 名: *Solanum melongena* L.

茄子为本市夏季主要蔬菜之一，种植面积在夏季果菜类中居首位。目前郊区栽培的茄子都属中晚熟品种，但在市郊一部分老菜队也有栽培灯泡茄等早熟品种。


在1937年以前，本市栽培的茄子品种绝大部分都是柳条青，以及少量的紫圆茄，据老农反映当时的柳条青顶端尖，似鹰嘴状，故又称鹰嘴柳条青，目前栽培的柳条青顶端渐有变粗的现象。1950年以来，紫圆类型的品种才逐渐增多。

当前郊区栽培最多的是市郊地方品种柳条青，约占茄子栽培面积的60%左右，其次为卵茄和紫圆茄等。

本市栽培的茄子品种共有七个，依其果形分为长茄和圆茄二大类型。

一、长茄：有柳条青，紫线茄，卵茄；

二、圆茄：有灯泡茄，安阳紫茄，紫圆茄，白圆茄。



**品种名称：**柳条青（别名：青茄子）。


**栽培历史：**地方品种，已栽培60—70年。

**分布地区：**郊区各地普遍栽培。

**特    征：**株高90—100厘米，株幅50—60厘米，节间较长，茎及叶脉绿色。第一花蕾着生在第7—9节，果实浅绿色，棒状，顶端尖或略钝，叶主脉、果梗及萼片上具刚硬的刺毛，果实长20—25厘米，最长者可达35厘米，横径4—6厘米，单果重4—5两。单株产量2.5—3.0斤。

**特    性：**生长势较强，较直立，中熟种。抗病力中等，果实含水份少，但种子较多，品质中。

**栽培简要：**2月下旬温室或冷床播种，移植1—2次，五月中旬定植。壟作，行距55—60厘米，株距45—50厘米。6月下旬开始采收，亩产7,000—8,000斤。



**品种名称：**卵茄子（又名懶茄子）


**栽培历史：**地方品种，栽培约15年。

**分布地区：**郊区南部普遍栽培此品种。

**特    征：**株高70—80厘米，株幅60—70厘米，茎及叶脉紫色，叶片上被茸毛。果实长卵形，顶端钝尖，紫红色或紫色，长18—25厘米，平均约20厘米，横径7—9厘米，平均约7.5厘米，单果重5—7两。单株产量2.5—3.0斤。

**特    性：**生长势强。开张性。耐瘠薄，前期生长较慢，后期生长较快，喜高温。晚熟种。抗绵腐病、褐纹病，及黄萎病强。果实含水少，味甘，表皮不易老化，品质佳。

**栽培簡要：**2月下旬—3月上旬冷床或温室播种，移植1—2次，5月中旬定植，壟作，行距60厘米，株距60—66厘米。生育期中一般不打叶。7月上旬开始收获，亩产6,000—7,000斤。



**品种名称：**紫线茄（别名紫长茄、羊角茄）


**栽培历史：**来源不详，栽培30余年。

**分布地区：**郊区各地均有栽培。

**特    征：**株高105厘米，茎纤细，节间长，茎、叶柄及叶脉紫色。第一花蕾着生于第8—9节。果实棒状顶端尖、紫黑色，有光泽。长20厘米，横茎4.0—4.5厘米，单果重3—4两，单株产量2.5斤。

**特    性：**生长势中、中晚熟种，抗病力中，皮薄，品质中。

**栽培简要：**3月上旬育苗、移植1次，五月中旬定植，苗期60—70天。行距55—60厘米，株距50厘米。7月上旬开始采收，至10月上旬为止。亩产5,000—6,000斤。



**品种名称：**灯泡（别名电灯泡）


**栽培历史：**引自安东，已栽培14—15年。

**分布地区：**郊区西南部有少量栽培。

**特    征：**株高70—80厘米，株幅70厘米，茎及叶脉紫黑色，有光泽，叶片浓绿色，在叶脉附近稍呈紫色。第一花蕾着生于第5—6节，果实为倒卵形，紫黑色，有光泽，长12厘米，横径6—8厘米，一般为7厘米，单果重3两。单株产量1.5—2.0斤。

**特    性：**生长势中，开张性较强，早熟种，抗病力中等。果实含水份大，质紧密，品质中。

**栽培简要：**2月上中旬温室育苗，移植2次，五月上旬定植，苗期80—90天。行距50—60厘米，株距40—45厘米。6月上旬开始采收，亩产4,500—5,500斤。



**品种名称：**紫圆茄


**栽培历史：**地方品种已栽培三十余年。

**分布地区：**近郊老菜田均有栽培。

**特    征：**株高80—90厘米，节间较短，茎及叶脉紫色，第一花蕾发生于第7节，果梗短而粗，果实稍呈扁圆形，紫色，长11厘米，横径12厘米，单果重5—6两，单株产量2.5—3.0斤。

**特    性：**生长势中，中早熟种。对褐纹病抵抗力较弱。开展性较强。因节间短，第一果易触地。果实质地紧密。

**栽培简要：**2月上中旬温室播种，移植2次，5月上旬定植，苗期80—90天。畦作，行距50—55厘米，株距40—45厘米。6月中下旬开始采收，至9月上旬止，亩产6,000—7,000斤。



**品种名称：**安阳茄子


**栽培历史：**来源安阳，栽培四年。

**分布地区：**五三社南塔大队栽培较多。

**特    征：**株高70厘米，株幅60厘米，茎和叶脉为紫色，果实长度12厘米，横径8厘米，椭圆形，果皮紫红色，有光泽，单果重量5—6两。

**特    性：**生长势较强，中熟种，对红蜘蛛的抵抗力较弱，耐肥但不耐湿。座果率高。果实含水份较多，品质较差。

**栽培摘要：**3月上、中旬在温室或温床育苗，5月上旬定植，壟作或畦作，株距45厘米，行距60厘米，7月上旬开始收获至9月上旬止，亩产量6,000—7,000市斤。



**品种名称：**白圆茄

**栽培历史：**来源不详，栽培7—8年。

**分布地区：**郊区东部和西部有少量栽培。

**特    征：**株高68厘米，株幅70厘米。叶片较大，卵圆形，绿色。果实纵径10厘米，横径9厘米，卵圆形，绿白色。单果重5—7两，单株产量2.5—3.0斤。

**特    性：**植株较矮，开张度大。耐瘠。果实含水份少。

**栽培简要：**同紫圆茄。

## 辣 椒

学 名. *Capsicum annuum* L.

辣椒在本市栽培甚广，栽培面积比茄子稍小，也是夏季主要蔬菜种类之一。


郊区栽培的辣椒以吉林柿子椒和三道筋为主要品种，56年以来引入的世界甜椒品种，甚为市民喜爱，但因其晚熟故至今栽培面积尚不甚广。

当前本市栽培的辣椒品种共有五个，隶属于甜椒，半辛辣椒，辛辣椒三个类型。

一、甜椒类型：果大肉厚，极少辣味，产量较高，主要有世界甜，三道筋 2 个品种；

二、半辛辣椒类型：果扁圆，肉稍薄，带辣味，主要有柿子椒，朝天猴二个品种；

三、辛辣椒类型：果细长，肉薄，辣味强，适于干制用。主要有尖椒， 1 个品种。



**品种名称：**朝天猴

**栽培历史：**地方品种，栽培10余年。

**分布地区：**近郊东部沈抚公路附近菜田有少量栽培。

**特    征：**植株较矮，高约40—50厘米。株幅亦较小，约30—40厘米。茎枝较弱，果柄短不向下弯曲，所以果顶向上是其特点。果实纵径5.3—6.2厘米，果肩横径4.8—5.4厘米，呈纯圆锥形，果皮绿色，单果重1.5—2两左右，单株产量1.0—1.2斤。

**特    性：**生长势较弱，早熟。适宜早熟栽培，抗热和耐湿能力较差。果形小，果肉较薄，辣味中等，品质中。

**栽培简要：**2月上、中旬播种，移植2次，5月上旬定植，行距50厘米，株距30厘米。每穴两株，壟作或畦作。6月上旬开始收获，至9月上旬止，亩产4,000—5,000斤。