

007212

四川中药志

SICHUAN ZHONGYAOZHI

第一卷

四川人民出版社

四川中药志

第一卷

《四川中药志》协作编写组编



四川人民出版社

一九八〇年 成都

C196-3

四川中药志第一卷（附彩色图集）

四川人民出版社出版 （成都盐道街三号）
四川省新华书店发行 四川新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/16 印张21.5 插页5 字数460千
1979年12月第1版 1979年12月第1次印刷
印数：1—13,500 册

书号：14118·21 定价：18 元

前 言

中国医药学历史悠久，是劳动人民同疾病作斗争的经验总结。它对保护人民身体健康、民族繁衍昌盛和推动世界医药学的发展，都作出了巨大的贡献。

四川是我国中草药生产的主要基地之一。“川广药材”历来有名。西起甘孜、阿坝自治州，东到绵亘的大巴山麓，北起秦岭边缘，南至金沙江河谷地区，中草药分布很广。据不完全调查，四川中草药品种达三千种以上，中药材产量约占全国产量的三分之一。秀丽的峨眉山中草药品种繁多，高寒山区还盛产虫草；贝母、麝香、鹿茸。近年来，重楼、青蒿等药获得更多的应用；川芎、附子、黄连等药驰名全国，远销国外。

遵照伟大的领袖和导师毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导和光辉的“六·二六”指示，为了充分反映我省中药资源和广大群众应用、鉴别中草药的经验，特别是无产阶级文化大革命以来医药科研成果，方便赤脚医生采、种、制、用中草药，巩固和发展合作医疗，并为创造我国统一的新医学新药学贡献力量，我们从一九七五年开始，组织全省有关单位和人员，重新编写《四川中药志》。

根据毛主席关于“古为今用，洋为中用”、“推陈出新”的方针和中西医结合的原则，我们在编写《四川中药志》的过程中，既批判了民族虚无主义，肯定了好的传统经验，又批判了复古思想，认真总结了广大群众的新的实践经验；并且实行专业队伍与群众相结合，大搞社会主义协作，对收集的资料和写成的初稿，又召开了有领导干部、专业人员、中医药师、草医草药师和赤脚医生等参加的“三结合”审稿会，进行反复地鉴别和讨论。最后，根据各方面的意见，又作了修改和补充，力求联系生产，联系实际，反映现代医学科学水平。全书将收载四川出产的中草药三千种，拟分为八卷，陆续编成。在内容方面，每味药分为原植（动、矿）物、药材、化学成份、药理、炮制、医疗用途等六项叙述。每味药的原植（动、矿）物和药材部分，全部用彩色图，以便读者参考。

本志是在四川省科委、四川省卫生局、四川省供销社的共同领导下，由四川省中药研究所、成都中医学院、四川省中药材公司、四川医学院、重庆医学院、南充师范学院、泸州医学院、重庆市中医研究所、重庆市第二中医院、成都市第一人民医院、四川农学

院、峨眉中药学校、成都市药检所、成都市中药材站、重庆市财贸学校等单位，组成《四川中药志》协作编写组，集体编写而成的。另外，西南师范学院、万县地区卫生局、重庆药剂学校等单位，也参加了部分编写工作。

由于政治和业务的水平所限，加以对中草药调查的广度和深度也不够，本志可能有错误，希读者批评指正。

《四川中药志》协作编写组

一九七六年十二月

凡 例

一、本书订名为《四川中药志》，是在原编一、二、三册基础上新编的，其品种与内容均有所增加。它是以反应我省中草药现实生长情况为主，并结合科学研究、临床应用新成果的一部地方性中药志。全书拟收载中草药3000种左右，从1976年起，每年陆续分册编写，由四川人民出版社出版。

二、本书所收各种中草药，按照每种药的药名，以国务院公布的四批汉字简化字为准，根据药名第一字笔划多少，依次排列。

三、书中每一种药，除写出药名和别名外，均分为原植(动、矿)物、药材、成份、药理、炮制及医疗用途六部分叙述。

药名 按国家药典1975年版所收载的药名首先采用；其次是历代“本草”中应用已久，具考证无误的名称；再次是地方标准有收载的名称；地方名不统一的，则采用植物名。

别名 收载使用地区较广、历史较久的名称。少数地区习用名，注明出处。

1.原植(动、矿)物 原植物记述植物的科名、属名、种名及药用部分，并分述形态特征、生境分布；原动物除昆虫类加写所属目名外，与原植物相同；矿物药则叙述来源及矿物名称。拉丁名则以近期发表的植(动)物分类文献的名称为准，用正体字书写。异名加()或〔 〕。形态特征则扼要叙述原植(动)物的外部形态(包括药用部分)。如一药多品种的，按主要品种并列叙述，其中一种作全面叙述，另外的仅列举与前种的主要区别特征。两种以上，列检索表，以资区别。生境分布则记述原植(动)物的生态环境及海拔高度。产地记载省内的地区或自治州(以本书出版时的四川省行政区划为准)。分布仅指国内。

2.药材 记述中药的产地、采集加工、性状、鉴别、质量要求、包装贮藏及使用地区。产地是指产药材的县、市及地区，按主产地及次产地的顺序排列。采集加工是说明药材的采收时间、采收部分、采收方法及加工方法等。重要品种作详细介绍。草药的采收加工在原植物末尾叙述。性状仅记述药用部分的形状、大小、色泽、气味等。鉴别则以群众的经验鉴别为主。少数外形易混淆或以粉末入药，有专属性特征的作显微鉴别；与混淆品比较有专属性理化反应的作理化鉴别，以资判断其真、伪、优、次。质量要求是指药材的合格条件和优良条件，有些有标准的重要药材，按部颁或省颁标准叙述。包装贮藏是记述现用的包装方法、包装器具、贮藏条件及保管方法。使用地区则指主要的使用地区，如省内外、国内外或当地使用。

3.成份 收载中草药的有效成份及一般成份。对同属不同种植物的成份均未收载。对少数变种的成份收入供参考。除一般常见成份外，多附英文名。

4.药理 记述中草药及其有效成份的药理作用(如抗菌、镇痛、消炎、抗原虫作

用等)、作用原理、体内过程和毒性。除收载实验药理的资料外,还收载疗效较肯定的临床药理资料。凡能为中医临床应用提供实验依据的药理资料,均予重点叙述。半数致死量、半数有效量、最小致死量、最小有效量、最大耐受量等一律用简单的英文符号LD₅₀、ED₅₀、MLD、MED、MTD 分别表示。药物剂量用毫克、公斤等表示。

5. 炮制 记述现行的炮制方法与经验,国家药典有收载的或省内有规范的按规定编写。

6. 医疗用途 记述中草药性味、功用、用量、禁忌和附方。性味:是药物功能的标示,用以概括药物的实际效能,因而有些药物所标示的与该药的实际滋味不一定相同。每种药先记述味,后记述性。对一些有毒药物,按其毒性大小,分别标明有小毒、有毒、有大毒、有剧毒等,以便引起注意。功用:概括叙述药物的主要功效,然后依主次叙述其适应症。对于近代研究发掘的用途,以现代医学病名分主次写在后面。用量:记述本药干品成人一日水煎服的常用量。指定用鲜品和一次量者,均分别予以注明。计量用10进位公制。禁忌:指配伍禁忌和主要疾病禁忌。附方:主要记述以本药为主配制的确有疗效的方药,并着重收载广大工农兵和革命医务工作者临床实践中总结出来的简、验、便、廉的方药。除古方和成方外,一律标明用量及用法。

四、草药在现阶段缺乏药材,因此采取了与中药不同的体例编写。一般无炮制者,只分为原植(动)物、成份、药理、医疗用途四部分介绍。

五、本书中凡有几种药材为同一种原植物或原动物的,则在该药项下列为附药,依使用的多少次序排列。

六、凡与本书收载的各种药物有关、在各项下没有谈到而又需要提出的问题,则在该项或该药文末加上“附注”予以说明。

七、本志每一卷介绍300味药;原植(动)物及药材彩色插图300余幅,另装成图集。药材的鉴别项下,附显微组织或粉末的细胞图。

八、本书中所用的计量单位一律采用公制。

九、本书中药材的采收时间,一律采用公历,为了便于计算农时,也同时采用了廿四节气。

十、本书每卷索引分两个部分,即中文名索引与拉丁名索引。中文名索引中,包括药名、别名和植物名。

目 录

一 画

1. 一支箭..... 1
2. 一点血..... 2

二 画

3. 丁癸草..... 2
4. 七星剑..... 3
5. 八月瓜..... 4
6. 八角枫根..... 5
7. 九香虫..... 7

三 画

8. 干漆..... 8
9. 三块瓦..... 9
10. 川牛膝..... 10
11. 千日红..... 12
12. 千年矮..... 13
13. 千里光..... 13
14. 千层楼..... 14
15. 千脚虫..... 15
16. 广柑皮..... 16
17. 土牛膝..... 17
18. 土荆芥..... 18
19. 小二仙草..... 19
20. 小白牛膝..... 19
21. 小茴香..... 20
22. 小黄花草..... 22
23. 小黄连刺..... 22
24. 小野鸡尾..... 23
25. 小蓟..... 24

26. 小爆蛇蚤..... 26
27. 山当归..... 26
28. 山枝莲..... 27
29. 山茱萸..... 28
30. 山茶花..... 29
31. 山麻柳叶..... 30
32. 山黄豆藤..... 31
33. 大山斑鸠窝..... 32
34. 大四块瓦..... 32
35. 大发表..... 33
36. 大地棕根..... 34
37. 大独脚金..... 34
38. 女贞子..... 35
- 附：女贞叶..... 36
39. 马牙半枝..... 36
40. 马尾连..... 37
- 附：马尾连根头..... 37
41. 马齿苋..... 38
42. 马桑根..... 39
43. 马褂树..... 40
44. 马缨丹..... 41
45. 马蹄金..... 41
46. 马鞭草..... 42

四 画

47. 无患子..... 43
48. 无花果..... 44
49. 乌梅..... 45
50. 乌药藤..... 47
51. 长春花..... 47
52. 丹参..... 49

53. 巴尔生	52
54. 巴豆	52
55. 六月雪	54
56. 云实	55
57. 五倍子	56
58. 凤尾草	57
59. 双肾藤	58
60. 木瓜	59
61. 木鳖子	61
62. 水八角	62
63. 水仙桃草	63
64. 水皂角	64
65. 水菟菜	64
66. 见血飞	65
67. 牛马藤	66
68. 牛皮凤尾草	66
69. 牛筋草	67
70. 牛筋树	68
71. 毛子草	68
72. 毛头寒	69
73. 毛梨根	70
74. 月季花	70

五 画

75. 半枝莲	71
76. 仙茅	72
77. 仙鹤草	74
附：鹤草芽	75
78. 叶下花	76
79. 丝瓜络	76
80. 冬东子	78
81. 冬瓜仁	78
附：冬瓜皮	79
82. 冬葵子	80
83. 石上柏	81
84. 石龙芮	81
85. 石荠苎	82
86. 石椒草	83

87. 石榴皮	83
88. 四块瓦	85
89. 白石榴花	86
90. 白兰花	86
91. 白芍	87
92. 白苏	89
93. 白花蛇舌草	90
94. 白英	92
95. 白扁豆	93
附：扁豆花	94
96. 白雪花	94
97. 龙胆地丁	95

六 画

98. 亚麻仁	96
99. 百部	97
100. 百日菊	99
101. 百两金	99
102. 百脉根	100
103. 向天盏	101
104. 决明子	102
105. 阴地蕨	103
106. 地耳草	104
107. 地瓜	105
108. 地茄子	105
109. 地肤子	106
110. 地柏枝	107
111. 地膏药	108
112. 地榆	109
113. 红马蹄草	111
114. 红毛走马胎	111
115. 红毛七	112
116. 红毒茴	113
117. 红狼毒	114
118. 羊尿子根	115

七 画

119. 迎春花	116
----------------	-----

120.	扯根菜	116
121.	芫荽子	117
	附：芫荽	118
122.	苏木	118
123.	芸香	119
124.	苎麻根	120
125.	灵芝	122
126.	驴蹄草	123
127.	杏仁	124
128.	杏叶防风	125
129.	李仁	126
130.	杉树	127
131.	杨梅	128
132.	旱猪毛七	129
133.	鸡冠花	130
134.	鸡脚参	130
135.	含羞草	131
136.	佛手	132
	附：佛手花	133
137.	佛甲草	134
138.	陈皮	134
	附：青皮	136
	桔叶	137
	桔络	137
	桔核	137
139.	附地菜	138

八 画

140.	面根藤	139
141.	夜关门	139
142.	刮筋板	140
143.	刺梨根	141
144.	刺槐	142
145.	使君子	143
146.	枇杷叶	144
	附：枇杷核	146
147.	油茶子	146
148.	泽兰	147

149.	泡桐树根	148
150.	空心苋	149
151.	苦石莲	150
152.	苦瓜叶	151
153.	苦刺枝	152
154.	苦参	153
155.	苦楝皮	155
	附：川楝子	158
156.	茉莉花	159
	附：茉莉根	160
157.	狗芽菜	160
158.	狗筋蔓	161
159.	玫瑰花	162
160.	软水黄连	163
161.	爬山虎	163
162.	罗汉松	164
163.	罗勒	165
164.	虎耳草	166
165.	青皮草	166
166.	青兔耳风	167
167.	青浮萍	167
168.	青箱子	168
169.	金丝桃	169
170.	金边吊兰	170
171.	金鸡脚	171
172.	金果榄	171
173.	金菊花	173
174.	金樱子	173
	附：金樱子叶	175
	金樱子根	175

九 画

175.	南天竹	175
176.	南瓜子	176
177.	洋甘菊	177
178.	穿山甲	178
179.	穿心莲	180
180.	挂苦绣球	182

3

181.	荠菜	182
182.	草血竭	183
183.	荆芥	184
	附：荆芥穗	186
184.	荔枝草	186
185.	结香	187
186.	扁担叶	188
187.	柠檬	189
188.	枳壳	189
	附：枳实	191
189.	柚子皮	192
190.	牵牛子	193
191.	胜红蓟	194
192.	胡芦巴	195
193.	胡椒树	196
194.	钩藤	197
195.	秋海棠	199
196.	鬼灯檠	199

十 画

197.	夏枯草	200
	附：夏枯花	201
198.	倒地捻	202
199.	倒地铃	203
200.	倒提壶	203
201.	桑白皮	204
	附：桑叶	206
	桑枝	206
	桑椹	207
202.	莲子草	208
203.	莲米	208
	附：莲米心	209
	莲须	210
	莲房	210
	藕节	211
	荷叶	211
	荷蒂	212
	荷花	212

	荷梗	212
	藕	212
	甜石莲	213
204.	荷花玉兰	213
205.	哮喘草	214
206.	峨参	214
207.	绣球花	215
208.	绣球防风	216
209.	烟草	217
210.	桉叶	218
211.	桃仁	219
212.	核桃	221
213.	桐子树根	222
214.	柴米子根	223
215.	柃盘子根	224
216.	破落子	224
217.	益母草	225
	附：茺蔚子	227
218.	铁苋菜	228
219.	铁皂角	229
220.	铁树花	229
221.	铁破锣	230
222.	铁扇子	231
223.	铁螃蟹	231
224.	积雪草	232
225.	鸭儿芹	233
226.	鸭公青	234
227.	鸭公藤	234
228.	鸭跖草	235
229.	粉丹草	235
230.	笔筒草	236
231.	臭牡丹	237
232.	臭梧桐	237
233.	臭椿根皮	239
234.	豇豆	239

十一 画

235.	假烟叶	240
------	-----	-----

236.	剪秋罗	241
237.	清香桂	241
238.	清酒缸	242
239.	寄马桩	243
240.	鹿茸	243
	附: 鹿角	248
	鹿角胶	249
	鹿角霜	249
	鹿顶骨	250
	鹿筋	250
	鹿冲	251
	鹿尾	251
	鹿胎	252
	鹿血	252
241.	探春花	252
242.	萝芙木	253
243.	菊叶三七	254
244.	黄连	255
245.	黄蜀葵	259
246.	常山	260
247.	常春藤	262
248.	猫头鹰	263
249.	猪殃殃	264
250.	猪鬃草	264
251.	望月砂	265
252.	望江南	266
253.	梧桐子	267
254.	榧木条	268
255.	梓根白皮	269
256.	银杏	270
257.	蛇足石松	273
258.	甜茶	273
259.	野牡丹	274
260.	野荔枝	275
261.	雪药	275
262.	雪猪油	276
	附: 雪猪肉	276
	雪猪骨	277

十二画

263.	博落回	277
264.	湖广草	278
265.	喜树	278
266.	篇蓄	280
267.	葎草	282
268.	葵花根	282
269.	葡萄根	284
270.	斑蝥	284
271.	榔榆	286
272.	腊莲绣球	286
273.	硬杆水黄连	287
274.	番石榴	288
275.	鹅儿肠	289
276.	鹅不食草	289
277.	紫苏	290
	附: 苏子	291
	苏梗	292
	苏莢	292

十三画

278.	槐花	293
	附: 槐角	294
279.	蓄草	295
280.	蓝花参	296
281.	蜀葵	296
282.	锦灯笼	297
283.	矮砣砣	298
284.	矮茶风	298
285.	蛾儿花	300
286.	路路通	300

十四画

287.	豨莶草	301
288.	满天星	303
289.	葶菜	303
290.	瘦风轮	304

291. 蜡梅花305
292. 酸饺307

十五画

293. 樱桃核307
294. 鹤虱308
295. 箭羽舒筋草310
296. 豌豆七311

十六画

297. 薜荔果311
附：薜荔藤叶312

298. 薄荷312

十七画

299. 爵床314

十八画

300. 翻白草315

附录

- 中文名索引316
拉丁名索引324

1. 一支箭

别名 瓶尔小草、蛇须草、独叶一支箭、一矛一盾、蛇咬子、一支枪。

原植物 为瓶尔小草科瓶尔小草属植物一支箭 *Ophioglossum pedunculatum* Desv., 以全草入药。

多年生小草本，高达26厘米。根状茎短而直立，有数条肉质棕黄色粗根。叶1~3片，出自根状茎顶部，总柄长11~22厘米，纤细；不育叶叶片卵形至卵状三角形，长(2~)4~6厘米，宽(1.5~)2~2.8厘米，顶端锐尖或圆钝，全缘，细脉网状或不明显，基部宽楔形或圆截形，下延成较宽的叶柄，柄长5~10毫米。孢子囊穗条形，自总柄顶端生出，黄绿色，长3~4厘米，顶端有小突尖，具长8~16厘米的柄；孢子囊扁圆形，无柄，下陷，沿囊托两侧各排列成一行。(彩图1)

生于海拔400~1800米的草丛中和开阔的灌丛边缘。产于万县、西昌、凉山、重庆等地、州、市。分布于江西、安徽、福建、广东、台湾、云南、贵州等省。

我省还有四种同属植物，亦同样入药，为了便于区别，现列种的检索表如下：

1. 小形植物，高5~15厘米，少有较高，不育叶为披针形，如为椭圆形，则长仅达2厘米，叶宽通常不超过15毫米。

2. 不育叶为披针形或阔披针形，远高出地面上，总柄长8~13厘米。……

(1) 狭叶瓶尔小草 *Ophioglossum thermale* Kom., 产于绵阳、南充、万县、江津、西昌等地区。

2. 不育叶椭圆形或椭圆状卵形，长达2厘米，总柄长4~8厘米。……(2) 小叶瓶尔小草 *Ophioglossum parvifolium* Grev. et Hook., 产于阿坝、

甘孜等州，海拔一般在2500米以上。

1. 植物通常较高(若高度不到12厘米，则叶基部阔楔形或圆截形，具明显的柄)，不育叶为卵形或卵圆形，长度通常超过2厘米，宽度通常超过15毫米。

3. 不育叶卵状矩圆形，基部下延为狭长楔形，无柄，网眼狭长。……(3) 瓶尔小草 *Ophioglossum vulgatum* L..

3. 不育叶为卵形、卵圆形或近圆形、卵状三角形，基部心形或截形，有柄，网眼较短而宽。

4. 不育叶卵圆形或近圆形，长3~8厘米，宽2.5~5厘米，长稍过于宽或长宽几相等，边缘波状，基部心形。……(4) 心叶瓶尔小草 *Ophioglossum reticulatum* L., 产于南充、万县、宜宾、乐山等地区，海拔一般均在1000米以上。

4. 不育叶卵形或卵状三角形，长(2~)4~6厘米，宽(1.5~)2~2.8厘米，基部圆截形或阔楔形，边缘不呈波状，叶柄较宽而明显，长5~10毫米。……(5) 一支箭 *Ophioglossum pedunculatum* Desv., 产于万县、凉山、重庆等地、州、市。

医疗用途

性味 苦，平。

功用 清热解毒，活血通瘀。用于湿热毒疮、疥疮、跌打损伤、烧烫伤、痔疮等。

用量 15~30克。

附方

1. 一支箭30克，蒲公英30克，鱼鳅串30克，鱼腥草30克，水煎服，治湿热毒疮。

2. 一支箭60克，峨参60克，大血藤60

克，红牛膝60克，泡酒，每服15克，治跌打损伤、血瘀肿痛。

3. 鲜品适量，捣烂外敷，治毒蛇咬伤、疮疖肿痛、烧烫伤等。

2. 一点血

原植物 为秋海棠科秋海棠属植物网脉秋海棠 *Begonia wilsonii* Gagnep., 以根状茎入药。

多年生草本，高20~30厘米。根状茎短而成块状，肥厚，节处有环纹，断面红色，具须根。基生叶1~2片，近菱形，长10~15厘米，宽10~12厘米，顶端3~5

(~9)浅裂，裂片三角形，基部偏心形，边缘有突尖细锯齿，主脉3~7条，掌状，叶面淡绿色，疏被短刺毛，背面略带红紫色，可见网状细脉；叶柄光滑，基部肥厚，托叶膜质。7月开淡红色花，6~7朵呈伞房状排列，花序梗粗壮，根出，长达10~20厘米，光滑，基部具卵圆状披针形的小苞片；雌雄同株，花梗长达8厘米；雄花花被片4，外列花被片2，卵圆形，顶端钝圆形，基部略呈心形，长约11毫米，内列花被片2，椭圆形，长约6毫米，宽1~2毫米；雄蕊10~15枚，离生；雌花花被片3，内1外2，外花被片宽卵圆形，内花被片卵圆形至长椭圆形；子房呈纺锤形，3棱、无翅，3室，胚珠多数，花柱3。(彩图2)

生于阴湿处的岩石上或溪边。产于绵阳、涪陵、乐山、雅安、西昌等地区。

秋季采挖根状茎，洗净，切片，晒干。根状茎粗壮，外皮红色，肉质，性脆。

成份 根状茎显强心甙、黄酮类、皂甙、三萜类、甾醇、酚类和鞣质等反应。

医疗用途

性味 甘、酸，凉。

功用 止血、活血。用于吐血、咯血、衄血、外伤出血和功能性子官出血。

用量 15~30克。

附方

1. 一点血60克，阴地蕨30克，炖鸡服，治冲任不固的崩漏、劳伤吐血、咯血。

2. 一点血30克，鹿啣草30克，牛膝10克，蓝布政15克，炖鸡服，治血虚经闭。

3. 一点血鲜品120~150克(或干品60~90克)，炖鸡服，治功能性子官出血。忌生、冷、酸、硷。

4. 鲜一点血30克，洗净捣烂，取汁兑童便服，药渣外敷患处，用布包扎，治外伤出血。

3. 丁 癸 草

别名 二叶人字草、水细辛连。

原植物 为豆科丁癸草属植物丁癸草 *Zornia diphylla* (L.) Pers., 以全草入药。

多年生小草本，高15~60厘米。茎由基部分枝，披散。复叶互生，小叶2片，呈人字形，故有二叶人字草之称，叶片披

针形，长1~3.5厘米，宽0.5~1厘米，顶端急尖或具短刺，基部近圆形，两面无毛，叶面具有黑色或褐色腺点；托叶狭披针形，基部有长约3毫米的距。7~8月开黄花，总状花序腋生或顶生，有花数朵，花无梗；苞片2，卵形，薄纸质，基部延伸成距，有明显的脉纹，边缘有白色缘毛；

克，红牛膝60克，泡酒，每服15克，治跌打损伤、血瘀肿痛。

3. 鲜品适量，捣烂外敷，治毒蛇咬伤、疮疖肿痛、烧烫伤等。

2. 一点血

原植物 为秋海棠科秋海棠属植物网脉秋海棠 *Begonia wilsonii* Gagnep., 以根状茎入药。

多年生草本，高20~30厘米。根状茎短而成块状，肥厚，节处有环纹，断面红色，具须根。基生叶1~2片，近菱形，长10~15厘米，宽10~12厘米，顶端3~5

(~9) 浅裂，裂片三角形，基部偏心形，边缘有突尖细锯齿，主脉3~7条，掌状，叶面淡绿色，疏被短刺毛，背面略带红紫色，可见网状细脉；叶柄光滑，基部肥厚，托叶膜质。7月开淡红色花，6~7朵呈伞房状排列，花序梗粗壮，根出，长达10~20厘米，光滑，基部具卵圆状披针形的小苞片；雌雄同株，花梗长达8厘米；雄花花被片4，外列花被片2，卵圆形，顶端钝圆形，基部略呈心形，长约11毫米，内列花被片2，椭圆形，长约6毫米，宽1~2毫米；雄蕊10~15枚，离生；雌花花被片3，内1外2，外花被片宽卵圆形，内花被片卵圆形至长椭圆形；子房呈纺锤形，3棱、无翅，3室，胚珠多数，花柱3。(彩图2)

生于阴湿处的岩石上或溪边。产于绵阳、涪陵、乐山、雅安、西昌等地区。

秋季采挖根状茎，洗净，切片，晒干。根状茎粗壮，外皮红色，肉质，性脆。

成份 根状茎显强心甙、黄酮类、皂甙、三萜类、甾醇、酚类和鞣质等反应。

医疗用途

性味 甘、酸，凉。

功用 止血、活血。用于吐血、咯血、衄血、外伤出血和功能性子官出血。

用量 15~30克。

附方

1. 一点血60克，阴地蕨30克，炖鸡服，治冲任不固的崩漏、劳伤吐血、咯血。

2. 一点血30克，鹿啣草30克，牛膝10克，蓝布政15克，炖鸡服，治血虚经闭。

3. 一点血鲜品120~150克(或干品60~90克)，炖鸡服，治功能性子官出血。忌生、冷、酸、硷。

4. 鲜一点血30克，洗净捣烂，取汁兑童便服，药渣外敷患处，用布包扎，治外伤出血。

3. 丁 癸 草

别名 二叶人字草、水细辛连。

原植物 为豆科丁癸草属植物丁癸草 *Zornia diphylla* (L.) Pers., 以全草入药。

多年生小草本，高15~60厘米。茎由基部分枝，披散。复叶互生，小叶2片，呈人字形，故有二叶人字草之称，叶片披

针形，长1~3.5厘米，宽0.5~1厘米，顶端急尖或具短刺，基部近圆形，两面无毛，叶面具有黑色或褐色腺点；托叶狭披针形，基部有长约3毫米的距。7~8月开黄花，总状花序腋生或顶生，有花数朵，花无梗；苞片2，卵形，薄纸质，基部延伸成距，有明显的脉纹，边缘有白色缘毛；

花萼钟状，二唇形，被短柔毛；花冠蝶形，长约1.2厘米；雄蕊10个合成1组；花药2型，花丝较长的药底着，花丝较短的药背着；子房无柄，有柔毛。荚果不裂，条形，具小刺毛，有2~6节，每节有种子1粒。（彩图3）

生于温暖地带的山坡村落附近或小溪边向阳处或平坝。产于西昌地区。分布于浙江、江西、福建、广东、广西、湖南、云南等省区。

四季采集全草入药。

成份 全草含黄酮甙、酚类、氨基酸。

医疗用途

性味 淡，凉。

功用 解表清热，凉血解毒。用于风热感冒、咽喉不利、目赤肿痛、湿热泄泻、黄疸、痈疖肿毒和毒蛇咬伤。

用量 15~30克。

附方

1. 丁癸草15克，柳叶菊15克，银花藤30克，水煎服，治风热感冒。

2. 丁癸草15克，鱼腥草30克，藿香10克，水煎服，治湿热蕴结胃肠之呕吐腹泻。

3. 丁癸草30克，茵陈30克，虎杖30克，水煎服，治湿热黄疸。

4. 丁癸草30克，水煎服，或鲜品适量，捣烂外敷，治疮肿。

4. 七星剑

别名 星星草、兰雪花、搬倒甑。

原植物 为蓝雪科角柱花属植物紫金莲 *Ceratostigma willmottianum* Stapf, 以全株入药。

小灌木，高1~1.5米。小枝带紫红色，具棱槽和硬毛。叶互生，椭圆形至卵状椭圆形或倒披针形，长2~5厘米，宽1.2~2.5厘米，顶端急尖或钝，基部楔形下延，两面被伏生硬毛，背面有腺体，边缘具刺毛状睫毛；无柄。头状聚伞花序顶生，稀腋生；苞片与花萼等长或稍长，长披针形，宽2~3毫米；花萼长10~15毫米，无腺毛，萼筒长7~11毫米，绿色，裂片钻形，紫红色，具白色的棱，被稀疏长硬毛；花冠高脚碟状，长20~26毫米，花冠筒红紫色，裂片紫蓝色；雄蕊5，着生于花冠筒基部，花药紫色；花柱合生，带白色，柱头内侧具角状腺体。蒴果盖裂。（彩图4）

生于山坡、河谷。产于绵阳、雅安、宜宾、阿坝等地、州。分布于云南、贵

州、西藏等省区。

夏、秋季采全株，去掉泥砂杂质，切碎晒干。

成份 含鞣松素（plumbagin）。

药理

1. 抗菌作用：本品所含成份鞣松素（plumbagin）对流感杆菌、甲型链球菌、乙型链球菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌（甲型、乙型）、痢疾杆菌（舒密氏、弗氏）、粪产硷杆菌、卡他双球菌、脑膜炎双球菌、肺炎双球菌和葡萄球菌等均有抑制作用。尤其对葡萄球菌属更为敏感。

2. 祛痰作用：用小鼠酚红法试验，给以鞣松素灌胃80毫克/公斤，显示有明显的祛痰作用。

3. 止血作用：将兔和犬的肝叶部分切除，或将狗股动脉切开后，用本品根浸膏粉撒于切口处，稍加压迫，即有良好的止血效果。

4. 其他：本品酊剂对家兔正常或兴奋的离体肠肌均有抑制作用。对氯化钡引起