

连云港蔬菜品种志

连云港市农业科学研究所

前 言

蔬菜在人们生活中占有十分重要的地位。我国幅员辽阔，由于勤劳的人民在长期的生产斗争中，培育了适应各种气候和土壤条件的地方蔬菜品种，因此资源十分丰富，是开展科学的研究和生产单位开发利用的重要物质基础。

连云港市地处黄海之滨，是苏鲁两省蔬菜品种交流最多的古城之一，品种极为丰富，并且具有地方特色。但近年来，由于科学技术和生产水平的提高，新品种不断引进，原有地方品种有的濒于绝种边缘，因此有必要采取措施收集整理，妥善保存，以便在科研和生产上有计划地开发利用。在江苏省农科院蔬菜研究所的具体指导下，在邻县和市有关部门的积极支持下，我所从1978年起，至1981年止，对全市蔬菜品种资源进行了调查、征集、资料整理并编写了这本品种志。除介绍了当地的主要农家品种和少数野生品种外，也收集了一部分引进多年已在生产上推广应用的外地品种和少数从国外引进不久的品种，共计195个。供有关部门参考。

本品种志由储祖欣同志负责编写，南京农学院李鸿渐教授热情给予指导。在资料收集和品种征集过程中得到连云港市农林水利局、市蔬菜办公室和公社有关的同志积极支持和帮助，在此表示感谢。由于我们的水平所限，一定存在不少缺点和错误，恳求批评指正，以便今后不断改进和充实。

连云港市农业科学研究所

1982年8月

目 录

一、根 茎 类

萝卜.....	3
小水泡.....	4
大水泡.....	5
小锥把.....	6
大锥把.....	7
羊角空.....	8
腊烛台.....	9
牛拔橛.....	10
小五月红.....	11
大五月红.....	12
小老鼠嘴.....	13
猪嘴萝卜.....	14
煨罐红.....	15
青园脆.....	16
四季白萝卜.....	17
短大青萝卜.....	18
胡萝卜.....	19
草胡萝卜.....	20
黄锥把只胡萝卜.....	21
红锥把只胡萝卜.....	22
牛蒡.....	23
牛蒡.....	24
马铃薯.....	25
74—4.....	26
高原七号.....	27
58—27混一.....	28
山药.....	29
山药.....	29
菊芋.....	30
菊芋.....	30
芋头.....	31
白芋头.....	31
生姜.....	32
生姜.....	32
苤蓝(球茎甘蓝).....	33
早白苤蓝.....	33
天津大.....	34
大头菜.....	35
本大头菜.....	35
芜菁甘蓝(洋大头菜).....	36
芜菁甘蓝.....	36
莴苣.....	37
尖叶紫莴苣.....	37
园叶紫莴苣.....	38
尖叶青莴苣.....	39
宽叶青莴苣.....	40
苔干.....	41

豆薯	42
豆薯	42
石刁柏(芦笋)	43
华盛顿500号石刁柏	43
云南农大石刁柏	44
竹笋	45
哺鸡笋	45
百合	46
白花百合	46
猫耳合	47

二、叶菜、花菜类

普通白菜	51
高腿黄	51
矮老	52
大白菜	54
小狮子头	54
大狮子头	55
结球甘蓝	58
报春	58
小鸡心	59
牛心	60
黑菜	64
小叶乌	64
大叶乌	65
芥菜	68
板叶芥	68
板叶雪里蕻	69
过寒菜	71
板叶过寒菜	71
芹菜	72
实心芹	73
苋菜	74
白苋菜	75
紫苋菜	76
叶用莴苣	78
懈叶生菜	78
菠菜	79
尖叶菠	79
大叶菠	80
香椿	82
香椿	82
芫荽	83
芫荽	83
扁根菜	53
中青麻叶	56
连杂一号	57
黑叶小平头	61
黄苗	62
京丰一号	63
仙鹤腿	66
毛叶黑菜	67
鸡冠雪里蕻	70
鸡冠过寒菜	72
空心芹	74
青番谷	77
园叶菠	81

小茴香	84
小茴香	84
茼蒿	85
茼蒿	85
甜菜	86
叶甜菜	86 红梗叶甜菜..... 87
花菜	88
60天花菜	88 杂交五号..... 89
黄花菜	90
丁庄大菜	90 孔望山野黄花菜..... 91

三、瓜类

梢瓜	95
小白草瓜	95 拦路青..... 97
白皮梢瓜	96
酥瓜	98
滑皮酥瓜	98 青皮酥瓜..... 101
黑皮酥瓜	99 白皮酥瓜..... 102
花皮酥瓜	100
黄瓜	103
洪门小刺瓜	103 74—18..... 107
辊子脐	104 津研一号..... 108
旱黄瓜	105 津研二号..... 109
唐山秋瓜	106 新杂一号..... 110
中国南瓜(番瓜)	111
草番瓜	111 灯瓜..... 114
黑皮牛腿番瓜	112 黑皮吊瓜..... 115
花牛腿番瓜	113 白皮吊瓜..... 116
印度南瓜	117
黄皮筍瓜	117
美国南瓜	118
一窝鸡	118 莴瓜..... 119
冬瓜	120
草冬瓜	120 人冬瓜..... 121
瓠子	122
线瓠子	122
丝瓜	123
短丝瓜	123 线丝瓜..... 125
生吃丝瓜	124 五寸丝瓜..... 126
香瓜	127
生甜瓜	127 小红种..... 131
面喉头	128 黑狗腿..... 132

关老脸	129	洋糖包	133
冬青瓜	130	苹果酥	134

四、豆类

四季豆	137		
黄子矮四季豆	137	钉耙齿	140
老来嫩	138	兔腿	141
关东青	139	八月梅	142
扁豆	143		
小猪耳朵	144	洋扁豆	151
大猪耳朵	145	小肉扁豆	152
大紫边	146	大肉扁豆	153
红绣鞋	147	紫边肉扁豆	154
兔腿	148	白皮扁豆	155
谢花饱	149	白绣鞋	156
大刀片	150	青皮扁豆	157
蚕豆	158		
大蚕豆	158		
豌豆	159		
铁子豌豆	159		
长豇豆	160		
红银边	161	园豆角	169
大红袍	162	钉耙齿	170
一点红	163	白羊肠	171
秋赤豇	164	六月鲜	172
水红秋二忙	165	盘香豇	173
绿皮秋二忙	166	小猪肠	174
白皮秋二忙	167	黑眼豇豆	175
草里攀	168		
毛豆	176		
四粒仓	176		
刀豆	177		
大刀豆	177		
黎豆	178		
毛兔子腿	178		
菜豆	179		
菜豆	179		

五、茄果类

番茄	183
-----------	-----

矮生黄	183	北京薯叶	187
北京早红	184	524	188
自封顶	185	强力米寿	189
66-13	186	早粉二号	190
大椒			191
小羊角椒	191	黑壳椒	194
朝天椒	192	上海甜椒	195
线椒	193		
茄子			196
小草茄	196	徐州长茄	198
大紫园茄	197		

六、葱韭蒜类

葱			201
大梧桐葱	201	楼葱	203
科葱	202	薤葱	204
洋葱			205
紫皮洋葱	205	黄皮洋葱	206
韭菜			207
小韭菜	207	大韭菜	208
大蒜			209
草四瓣	209	草六瓣	210

七、水生类

藕			213
美人红	213		
茭白			214
茭白	214		
菱			215
鸡头菱	215	两角菱	217
四角菱	216		

八、杂类

蘑菇			221
蘑菇	221		

一、根 茎 类

1、萝卜

学名：*Raphanus Sativus. L.* 十字花科


萝卜是本市主要蔬菜品种之一，除常年菜地种植外，粮区也有一部份季节性面积。在解放前以栽培早熟、生长期短的品种为主，著名的小水泡萝卜，肉质细嫩，适宜生食冷拌，是早春深受群众欢迎的极早熟的一个名贵品种。五十年代末期，引进了部份中晚熟品种，使品种更为丰富。目前多数品种为红皮、少数是青皮，按灌溉条件可分水园萝卜和旱园萝卜两种，依栽培季节可分以下三类：

(1) 春萝卜：小水泡萝卜、大水泡萝卜、小锥把、大锥把、羊角空、蜡烛台、

牛拔撒

(2) 秋萝卜：小老嘴、猪嘴萝卜、煨罐红、青园脆、四季白萝卜

(3) 四季萝卜：小五月红、大五月红



【品种名称】 小水泡萝卜

【栽培历史】 很久


【分布地区】 海州园林寺等地

【特征】 肉质根圆形略扁，象算盘珠，不露出土面。横径3cm左右，纵径2cm左右，单个重6至12克，每斤约50—70个。皮大红色，肉白色，植株直立，叶片板叶倒卵形，边缘有小缺刻。叶面和叶背有少量绒毛，叶柄略现淡暗红色，茎部不明显。

【特性】 极早熟、幼苗抗寒力强。3—4片叶肉质根开始膨大，5至6片叶即可上市。肉质细嫩、为生冷拌食主要品种之一。

【栽培要点】 农历七九开始催芽播种（约2月中旬）以八九一九九为主要播期，播种量七九每亩8斤，八九一九九每亩5斤，但七九播种遇到强寒流往往十天后才出苗，一半成铁锈根，不长萝卜头。清明开始间拔大株上市，一般分3—4次收完，生长期45—60天，亩产2000—4000斤。沙质地上市早，黑土地上市迟、结头少，播种时一般不带底粪，播种后盖土二分再盖一分干粪保温。盖土厚结萝卜少。子叶期不能上水，有2—3片真叶，肉质根有黄豆粒大时开始上水，以后每间拔一次上一次肥水。

【留种方法】 春季留种：选叶片少的拔出再栽一次收种，行距25厘米，株距20厘米，春季留的种子播种后上市早、皮薄。秋季留种：寒露播种，立冬收藏，第二年春分移栽，但秋季留的种子出苗慢、上市迟，且易抽苔。



【品种名称】 大水泡

【栽培历史】 很久


【分布地区】 锦屏公社岗嘴、朐山等

【特征】 肉质根形状不甚规则，一种较圆，一种略扁，横径4—5厘米、纵径3.2—5厘米。一般16个左右重1斤，单个重25—40克。皮大红色、薄而鲜亮，皮上白线横纹极少，肉白色、肉质根早期不露出，长足后略露出地面，尾根很细，食用部与尾根交界很明显，植株半直立，板叶（极个别为花叶）、一般有真叶8—9片，叶片宽7厘米左右，倒卵圆形，边缘不甚规则，但缺刻不深，茎短不明显。

【特性】 早熟、肉细嫩、不易糠心。

【栽培要点】 春种三月上旬（八九一出九约惊蛰前后）播种，每亩播量5斤，行株距1寸见方，4月下旬上市，生长期55—60天，亩产2000~2500斤。秋种8月上旬播种，每亩播量3斤，9月上中旬上市、生长期40天。

【留种方法】 秋季延迟播种，窖藏后第二年春移栽留种、收种量较多，春播留种必须拔起移栽，不移栽下一代会退化，形成早开花，肉质根小。



【品种名称】 小锥把

【别 名】 小锥把子


【栽培历史】 很久

【分布地区】 海州等地

【特 征】 肉质根圆锥形，头粗尾细，一般长6——8厘米，头部横切面2——4厘米，而尾部逐渐细小成锥形。表皮红色，皮厚中等，肉白色，每个1两左右。叶片为板叶，长卵圆形，边缘缺刻很浅，叶面有少量茸毛，叶柄暗红色，叶脉绿，色，一般7——8张叶片期上市，根不露出地面。

【特 性】 不易空心，可延长上市期。

【栽培要点】 2月下旬到3月上中旬（八九到出九）条播，每亩播量1.5—2斤出苗后按行距4寸，株距2寸定苗，4月下旬（谷雨）上市，亩产2000—3000斤左右。



【品种名称】 大锥把

【别 名】 大锥把子


【栽培历史】 当地农家品种

【分布地区】 海州等地

【特 征】 肉质根圆锥形，一般长12厘米左右，头部横切面4—5厘米，头部向下逐渐细小成圆锥形，皮红色，肉白色，每个重2两左右。叶片长卵形，板叶有茸毛，叶柄暗红色，叶脉绿色，一般十张叶片期上市。根不露出地面或略露出地面。

【特 性】 不易空心

【栽培要点】 2月下旬到3月上中旬（八九到出九）条播，每亩播量1.5斤，按行距4寸，株距2寸定苗，4月下旬（谷雨）上市，亩产2000—3000斤左右。



【品种名称】 羊角空


【栽培历史】 当地农家品种

【分布地区】 海州等地

【特征】 肉质根长圆柱形，一般长7——10厘米，粗2.5——4厘米，未长前，肉质根头部较大，尾部尖小，长足后中部略鼓起变粗，但尾部仍较尖，形似羊角。本品种的头部没有锥把子方正、而较圆溜，肉质根一般不露出地面，但长足后微露出地面，皮红色（沙地深红，水园多肥地淡红），叶片倒卵圆形板叶，边缘缺刻浅，有茸毛，叶柄暗红色，茎细，每个重0.5—1两。

【特性】 早熟，6—7叶即有萝卜，皮很薄，极易空心。

【栽培要点】 2月下旬到3月上中旬条播，每亩用种1.5斤，行距4寸，株距2寸，4月中旬上市，生长期45——50天，亩产1500斤左右，



【品种名称】 腊烛台

【栽培历史】 当地农家品种


【分布地区】 海州等地

【特征】 肉质根细长，上下一样大，长不粗，一般长10—13厘米，粗2.3—3.5厘米，红皮白肉，皮比羊角空厚，头部约露出土面半寸，茎比羊角空粗，板叶长椭圆形，表面略有茸毛，叶柄暗红，成株有叶片8—10片。

【特性】 不易空心，可延迟供应。

【栽培要点】 3月上中旬播种，条播或撒播，每亩播量1.5斤，行距4寸，株距2寸，5月上中旬上市，生长期55—60天，亩产2000斤左右。

留种株拔起另栽，要及时防治蚜虫。



【品种名称】 牛拔梢

【栽培历史】 当地农家品种

【分布地区】 海州等地

【特征】 肉质根圆柱形，大红色，上下部一样粗，一般长25—30厘米，横径5.5—6.5厘米，皮厚约0.2厘米，单个重0.6—0.7斤，约有1寸左右露出土面，茎粗，叶片长椭圆形，板叶或花叶，有不明显短茸毛，叶缘缺刻不明显，叶柄下部红色。

【特性】 中熟

【栽培要点】 3月中旬撒播或条播，每亩播量1.5斤，行距4—5寸，株距2—3寸，5月上、中旬上市，亩产2000—3000斤。