

003966

湖南药物志

第一辑

湖南人民出版社

湖南药物志

第一辑



湖南中医药研究所编
湖南人民出版社

一九七〇年·长沙

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

没有正确的政治观点，就等于没有灵魂。

提高警惕，保卫祖国。

备战、备荒、为人民。

人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。

中国应当对于人类有较大的贡献。

为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。……这个根本问题不解决，其他许多问题也就不易解决。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

抓革命，促生产，促工作，促战备。

湖南药物志

第一辑

湖南中医药研究所编

*

湖南人民出版社出版

湖南省新华书店发行

湖南省新华印刷二厂印刷

*

1962年4月第一版

1970年6月第2次印刷

书号：14109·62 定价：五元

再 版 前 言

伟大领袖毛主席一贯非常关心人民的卫生事业，早在新民主主义革命时期就指出：“应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。”在社会主义革命和社会主义建设时期，毛主席对卫生工作作了一系列重要指示，明确规定了人民卫生工作的路线、方针和政策，为我国医学发展指明了前进的方向。在党的“九大”精神的鼓舞下，全国人民以豪迈的步伐，跨进了伟大的七十年代，广大医药卫生人员，深入批判了叛徒、内奸、工贼刘少奇反革命修正主义路线，使卫生战线斗、批、改进一步发展。毛主席关于“中国应当对于人类有较大的贡献”的伟大教导，鼓舞广大革命医药卫生工作者努力攀登医学科学高峰，使医药卫生事业更好地为无产阶级政治服务，为工农兵服务，为工农业生产新高潮服务。

《湖南药物志》（第一辑）出版于一九六二年四月，收载了省内常用药物四百一十七种，这些中草药是我省取之不尽，用之不竭，任何战争打不烂的天然药库中的一部分。本书所载普及与提高相结合的内容，为我们继承发扬祖国医药学遗产，总结推广各地民间利用中草药除害灭病的新经验，介绍新品种，澄清名实混淆，鉴定辨认药物以及发展药材生产提供了参考资料。我省药物丰富，本书所录还不能反映全貌。在上级革委会的领导和关怀下，我们正着手完成《湖南药物志》（第二辑）的编辑工作。

为了落实伟大领袖毛主席关于“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针，巩固和发展受到贫下中农欢迎的合作医疗制度，广大读者迫切要求本书再版，以支援广大工农兵自采、自种、自制、自用中草药群众运动，充分发挥中草药在防病治病中的作用。因为时间仓卒，除个别错误作了更正和部分草药作了别名补遗于书后外，来不及全面补充和修订。为此，我们恳切地希望广大医药卫生人员，通过工作实践，对本书提出补充修改意见，使之不断提高，以期能在继承发扬祖国医药学遗产及为社会主义革命和建设中作出新的贡献。

湖南省中医药研究所革委会

一九七〇年四月

凡例

一、本志收載之药物，均通过实地调查，采集有原植物标本，經鉴定后，查明科属，訂出学名，并搜集《本草纲目》、《植物名实图考》等古籍及近代中药書籍、杂志等有关資料分类叙述，按志書形式編纂。內容着重記載調查研究之实际情况，以供进一步实验研究时参考。

二、本志收載药物按中文名称首字笔划順序排列。

三、每种药物一般均有下列各項記載，若某一項缺乏可靠資料，編者又无增补可能者，则缺項不列。各項編寫体例如下：

中文名称 以全国通用名称为主；缺者則用本省通用名称。

各地別名 記載本省各地习惯用名，以括弧注明县名。（其中如藍嘉、汝桂、桂新等县現已划分为藍山、嘉禾、汝城、桂东、桂阳、新田等县，仍用原县名，未予分列。）其中亦有属該县少数草医、药农之习惯用名者。

学 名 根据标本鉴定，查明科別，訂出学名。

【原 植 物】 記載該药原植物之有关資料。

形 态 根据采集标本，参考有关文献，按照現代科学方法加以描述，并繪图以資識別。

生长环境 記載药物生长时对土壤、气候、地形地勢、阳光等之要求，为各地寻找药物及变野生为家种等研究提供資料。

分 布 根据调查資料記錄該药在我省的分布情况，借以帮助各地寻找药源及引种参考之用。由于調查不够全面，此項記載尚不能反映全省药物分布实况，有待补充。

栽 培 凡本省已栽培之品种确已取得丰产經驗者，则詳細介紹其栽培方法。虽已栽培未取得成熟經驗及尚未栽培之品种，只提供方向，供各地試驗研究。

【药材部分】 記載中药有关下列資料（民間草药无此項記載）。

产 地 記載本省主产地、次产地及一般产地。

采 收 記載本省采收季节及方法。

产地加工 記載本省产地初步加工方法。

品 質 此項記載以本省各地传授之实际經驗为主。

炮 制 炮制方法一般如洗、切、烘、炒、炙、煅等，均列入本項。

储 藏 包括儲藏、保管方法的有关注意事項。

【效 用】 主要記載本省民間經驗。其次如《本草纲目》、《植物名实图考》、《本草纲目拾遺》、《救荒本草》等書的有关效用部分，亦予适当收入。《本草纲目》所載之諸家各說均以《纲目》为准，故統以《纲目》概括。至于《纲目》所未具載者，则以括弧注明出处，如《植考》、《纲目拾遺》、《救荒》等。民間經驗尤其是有效用而无詳細用法者，为了保存民間經驗及提供应用参考，均将其效用收

入此項，亦以括弧注明（民間）。

性 味 中藥以歷代本草記載多數相同及與效用相符者為准；民間草藥則以原始資料為據。

功 效 同上。

主 治 同上。

民間應用 包括本省各地民間流傳的使用經驗及群眾在除害滅病運動中創造的新經驗，均一一記載其處方。惟因原始資料不够完整和民間習慣所稱病名無法統一，雖經整理加工，仍有少數病症名稱過於廣泛、用法不全及處方中有个別藥不知其為何藥之缺點。為提出作為今后研究之線索，此項資料仍予載入本志。

【附 注】以上各項未能包括之問題均列入此項。

四、本志採用國家科學技術委員會公布的統一公制計量單位。藥用量仍沿用舊制。

長 度： 米（1米=3市尺）

厘米（1厘米=3市分）

毫米（1毫米=3市厘）

容 量： 升（1升=1市升）

毫升（1毫升=1/1000市升）

藥用重量： 斤（1斤=16兩=500克）

兩（1兩=10錢=31.2克）

錢（1錢=10分=3.12克）

公斤（1公斤=2斤=1000克）

目 录

一枝黃花	(1)	万年青	(65)	长叶冻绿	(129)
刀豆	(3)	飞龙掌血	(67)	文殊兰	(131)
人苋	(5)	天葵	(69)	石蕨	(133)
丁香蓼	(7)	天麻	(71)	石松	(135)
八角枫	(9)	天名精	(73)	石吊兰	(137)
九里光	(11)	天胡荽	(75)	石胡荽	(139)
九头狮子草	(13)	木樨	(77)	龙葵	(141)
千层塔	(15)	木槿	(79)	龙芽草	(143)
千日红	(17)	木姜子	(81)	白前	(145)
女萎	(19)	木芙蓉	(83)	白勒	(149)
女贞	(21)	水苏	(85)	白蔹	(151)
土荆芥	(23)	水蘗	(87)	白薇	(153)
土囷儿	(25)	水蜈蚣	(89)	白芨	(155)
土大黄	(27)	水杨梅	(91)	白牛胆	(157)
土马鬃	(29)	五加	(93)	白叶野桐	(159)
大青	(31)	五色梅	(95)	白花除虫菊	(161)
大麻	(33)	五叶木通	(97)	四方麻	(163)
大血藤	(35)	牛蒡	(99)	四片瓦	(165)
大车前	(37)	牛皮消	(101)	玉簪	(167)
大叶三七	(39)	牛筋草	(103)	玉竹	(169)
大叶井口边草	(41)	毛茛	(105)	冬葵	(171)
三白草	(43)	毛大丁草	(107)	玄参	(173)
三七草	(45)	凤尾草	(109)	甘遂	(175)
三色堇	(47)	凤仙花	(111)	瓜子金	(177)
三叶木通	(49)	凤丫蕨	(113)	仙人掌	(179)
小蘖	(51)	云实	(115)	仙人球	(181)
小槐花	(53)	及己	(117)	东风菜	(183)
山蚂蝗	(55)	元宝草	(119)	半边莲	(185)
山药	(57)	化香树	(121)	兰香草	(187)
山木香	(59)	无花果	(123)	节节草	(189)
山梗菜	(61)	六月雪	(125)	西番莲果	(191)
卫矛	(63)	月季花	(127)	西氏毛茛	(193)

羊乳	(195)	麦门冬	(277)	芡	(365)
羊踯躅	(197)	车前草	(281)	泡桐	(367)
合欢	(199)	补骨脂	(283)	泥胡菜	(369)
合萌	(201)	鸡矢藤	(285)	迎春花	(371)
合掌消	(203)	鸡冠花	(287)	远志	(373)
地黄	(205)	鸡眼草	(289)	奇蒿	(375)
地茄	(207)	何首乌	(291)	昆明鸡血藤	(377)
地瓜	(209)	牡丹	(293)	抱石莲	(379)
地锦	(211)	肖梵天花	(295)	刺槐	(381)
地榆	(213)	辛夷	(301)	板栗	(383)
地耳草	(215)	芒萁	(303)	枇杷	(385)
地构叶	(217)	决明	(305)	委陵菜	(387)
地瓜儿苗	(219)	芋	(307)	枸杞	(389)
地刷子	(221)	芦	(309)	枸骨	(391)
华山矾	(223)	杉	(311)	柳	(393)
华荠苨	(225)	丽春花	(313)	柚	(395)
百日草	(227)	泽泻	(315)	柞木	(397)
老枪谷	(229)	泽漆	(317)	柘树	(399)
伏石蕨	(231)	狗牙根	(319)	柃木	(401)
杠板归	(233)	狗筋蔓	(321)	枳椇	(403)
向日葵	(235)	芫花	(323)	茅根	(405)
竹叶椒	(237)	虎刺	(325)	茅薺菜	(407)
夹竹桃	(239)	虎杖	(327)	苦参	(409)
光叶海桐	(241)	虎耳草	(329)	苦棟	(411)
吉祥草	(243)	兔丝子	(331)	苦蘗	(413)
观音座莲	(245)	兔儿伞	(333)	茉莉	(415)
安石榴	(247)	金毛狗	(335)	胡桃	(417)
阴行草	(249)	金樱子	(337)	胡麻	(419)
阴地蕨	(251)	金锦香	(339)	胡荽	(421)
赤小豆	(253)	金丝梅	(341)	胡氏排草	(423)
赤车使者	(255)	金挖耳	(343)	胡萝卜	(425)
过坛龙	(257)	金丝桃	(345)	姜	(427)
过路黄	(259)	金果榄	(347)	前胡	(429)
杜若	(261)	金钱草	(351)	美人蕉	(433)
杜仲	(263)	金疮小草	(353)	红花	(435)
杜茎山	(265)	金色狗尾草	(355)	红麸杨	(437)
沙参	(267)	青葙	(357)	韭	(439)
沙氏鹿茸草	(271)	卷柏	(359)	扁豆	(441)
杏香兔儿风	(273)	芭蕉	(361)	香椿	(443)
麦斛	(275)	花榈木	(363)	牵牛	(445)

看麦娘	(447)	射干	(531)	商陆	(621)
秋海棠	(449)	盐肤木	(533)	寄生	(623)
匍伏堇	(451)	桃	(535)	侧柏	(629)
厚朴	(453)	桑	(538)	假地兰	(631)
盾蕨	(457)	积雪草	(541)	降龙草	(633)
窃衣	(459)	细叶鼠鞠草	(543)	棕榈	(635)
南天竹	(461)	细叶沙参	(545)	酢酱草	(637)
南蛇藤	(463)	蛇莓	(547)	裂叶秋海棠	(641)
兗州卷柏	(465)	蛇菰	(549)	蕷藺菜	(643)
乌柏	(467)	蛇含	(551)	菸草	(645)
鸟芋	(469)	野山楂	(553)	薹菜	(647)
鸟药	(471)	野鴉椿	(555)	菰	(649)
鸟蔹莓	(473)	野芝麻	(557)	博落回	(651)
鸟龙摆尾	(475)	野棉花	(559)	筋骨草	(653)
马桑	(477)	野扇花	(561)	棣棠花	(655)
马尾松	(479)	野苋	(563)	结香	(657)
马鞭草	(481)	紫薇	(565)	络石	(659)
臭娘子	(483)	紫荆	(567)	景天	(661)
臭牡丹	(485)	紫苏	(569)	费菜	(663)
铁线莲	(487)	紫葳	(571)	棠梨	(665)
铁扫帚	(489)	紫茉莉	(575)	钩藤	(667)
海芋	(491)	紫牵牛	(577)	黄荆	(671)
海金沙	(493)	紫花堇菜	(579)	黄独	(676)
浮萍	(495)	鹿藿	(581)	黄檀	(678)
粉背蕨	(499)	鹿蹄草	(583)	黄杨	(679)
粉条儿菜	(501)	硃砂根	(585)	黄蜀葵	(681)
狭叶山胡椒	(503)	接骨金粟兰	(589)	黄胆草	(683)
狼尾草	(505)	麻口皮子药	(591)	黄常山	(685)
夏枯草	(507)	婆婆纳	(593)	葫	(687)
茵陈蒿	(509)	淡竹叶	(595)	葱	(689)
草石蚕	(511)	透骨草	(597)	荭草	(691)
苘蒿	(513)	通泉草	(599)	萹蓄	(693)
茺蔚	(515)	连钱草	(601)	萱草	(695)
茴香	(517)	梧桐	(603)	落花生	(697)
荏	(519)	梔子	(605)	楸树	(699)
荼	(521)	梅叶冬青	(607)	杨梅	(701)
蚕豆	(523)	莎草	(609)	枫	(703)
徐长卿	(525)	苋菜	(611)	枫杨	(705)
缺腰叶蓼	(527)	苘麻	(613)	瑞香	(707)
鬼臼	(529)	败酱	(615)	廊菌	(709)

雷公藤	(711)	腊梅	(753)	赛番红花	(797)
腹水草	(713)	漆姑草	(755)	柽柳	(799)
蜈蚣草	(715)	漆树	(757)	蕺菜	(801)
碎米荠	(717)	银线草	(759)	爵床	(803)
饭汤子	(719)	银杏	(761)	薯莨	(805)
鼠麹草	(721)	樟	(763)	鹅掌金星草	(807)
蜀葵	(723)	槲蕨	(765)	韩信草	(809)
蜀黍	(725)	醉鱼草	(767)	槿花	(811)
楼梯草	(727)	豌豆	(769)	荠菜	(813)
豨莶	(729)	铺地蜈蚣	(771)	翻白草	(815)
酸模	(731)	蔊菜	(773)	藿香	(817)
翠云草	(733)	蒌蒿	(775)	桔兰	(819)
算盘子	(735)	莲	(777)	猕猴桃	(821)
蒟蒻	(737)	蔓性千斤拔	(781)	榉树	(823)
蒺藜	(739)	荞麦	(783)	樱桃	(825)
蓍草	(741)	雀麦	(785)	繁缕	(827)
蓖麻	(743)	橐吾	(787)	续断	(829)
绶草	(745)	鸭跖草	(789)	续随子	(833)
福氏星蕨	(747)	薤	(791)	鳢肠	(835)
蜘蛛抱蛋	(749)	薜荔	(793)		
槐	(751)	薏苡	(795)		

一枝黃花

各地別名 小白龍須、朝天一柱香、黃花草(長沙)、薺子草(衡山)、開喉劍(湘陰)、次澤蘭(漣源)、小柴胡(衡南)、紅柴胡(新寧)、一柱香(岳陽)、黃花箭(麻陽)、見血飛、黃花馬蘭(永興)、鴻油草(藍嘉)、五爪見(辰谿)、小救駕(桃源)、三鳳散(耒陽)、紅花刀、青山菜(藍嘉)、大敗毒(吉首)、一枝箭(衡陽)、升麻(安化)。

學名 *Solidago virgo-aurea* L. ——菊科

【原植物】

形 态 多年生草本，高20—70厘米。莖直立，光滑，暗紅色，不分枝。莖上葉互生，卵圓形至長圓形，長1—2.5厘米，先端尖，基部楔形或下延成柄，近全緣，葉面有疏毛；根生葉橢圓形或長卵形，長3—6.5厘米，寬1—3厘米，先端尖或鈍圓，基部渾圓，葉片下延成翼，邊緣細疏齒，有長柄。深秋，莖頂或葉腋開黃色小花，頭狀花序，排列成總狀；苞片通常三層，外層苞片呈卵狀披針形。瘦果，圓筒形，光滑或有小柔毛。

【效 用】

性 味 辛苦微甘無毒(民間)。

功 效 疏風解毒，退熱行血，消腫止痛，散寒止嘔，去頭風(民間)。

主 治 洗肿毒(植考)。

民間應用

1. 小兒臘風 全草3錢，水煎服(永興)。

2. 腹痛泄泻 一枝黃花、大紅花、算盤子、夏枯草、地枇杷、三月泡、石榴、夜关门、鳳仙花，各2錢水煎，加紅糖沖服(麻陽)。

3. 喉痛 根搗汁，加白糖开水沖服，或晒干研末，开水沖服(湘陰)。

4. 头风 根3錢，水煎服。

5. 腰痛 全草4錢，水煎服(衡山)。

6. 劳伤吐血 一枝黃花、肺經草、老鴉花、麥冬、沙參，各3錢，水煎服(新寧)。

7. 瘦积 全草3錢，水煎服(永興)。



图1 一枝黄花 *Solidago virgo—aurea* L.

刀豆

各地別名 刀坝豆(长沙)。

学 名 *Canavalia gladiata*(Jacq.)DC.——豆科

【原植物】

形 态 一年生纏繞状草本，高达数米。莖纏繞他物而向上长，淡綠色，有3—4条縱紋，被短茸毛。三出复叶，互生；小叶闊卵形，長6—14厘米，寬5—12厘米，先端渐尖或急尖，基部圆形，两侧小叶基部偏斜，全緣，叶面深綠色，背面淡綠色，主脉隆起，側脉8—9对。夏末，叶腋生花数朵，白色或淡紅紫色，总状花序，長3—3.5厘米。莢果，带形，稍弯，長10—30厘米。种子10—14粒。

【药材部分】

产 地 各县均有产。

采 收 农历7—8月。

产地加工 摘取成熟的莢果，剥开莢壳，取出种子，分別晒干或烘干。

品 質

刀豆(莢) 以全干肥厚，外黃褐色，內白色者为佳。

种子 以全干，粒大饱满，淡紅色，无虫伤者为佳。

炮 制

刀豆(莢) 洗淨润透，切成約0.3厘米厚的片絲，晒干或烘干。

种子 拣去杂质，洗淨晒干或烘干。

貯 藏 放干燥处，防虫霉鼠食。

【效 用】

性 味 甘平无毒(纲目)。

功 效 溫中下气，利腸胃，止呃逆，益腎补元(纲目)；滋阴补虛，祛风散寒(民間)。

主 治 久痢(民間)。

民間应用

1.鼻渊 老刀豆壳不去子，焙干研末，每次3钱，酒调服(长沙)。

2.腰痛 刀豆壳烧存性研末，每次3钱，甜酒冲服，或用开水送下(东安)；又方 刀豆壳1片、辣椒莖(根及莖之近地部份)5钱、豨莶草5钱、徐长卿5钱、天芥菜5钱，煮鸭蛋食(长沙)；又方 刀豆壳1片、絲瓜莖(根及莖之近地部份)3钱，燒存性，兑酒服(长沙)。

3.嘔吐 刀豆壳焙枯研末，每次1钱半，开水泡服(长沙)。

4.坐板疮 刀豆壳燒灰，调桐油外擦(芷江)。

5.月經病 刀豆3钱，水煎，冲白糖服(长沙)。

6.呃逆 种子研粉，每次2钱，加白糖开水冲服(永兴)。

7.小儿疝气 种子研粉，每次1钱半，开水冲服(新邵)。



图2 刀豆 *Canavalia gladiata*(Jacq.)DC.

人 莧

各地別名 皮撮珍珠、海蚌含珠、珍珠草(长沙)、海藏珠(衡南)、铁莧菜、瓢里珍珠(湘阴)、田螺草(新宁)、海底藏珍珠(永兴)。

学 名 *Acalypha australis* L. ——大戟科

【原植物】

形 态 一年生草本，高30—60厘米。莖直立，細長，多分枝，有縱條紋，具毛。葉互生，菱狀卵形、卵狀披針形或橢圓形，長2—6厘米，寬1—3厘米，先端尖，基部楔形，邊緣有鋸齒，基部有時全緣，兩面有毛或近於光滑；葉柄長約1—3厘米。夏季，葉腋生細小褐色花，單性，雌雄同株，雄花成穗狀花序，雌花單生；花被三角形舟狀，邊緣有鋸齒，基部心臟形，合時成蚌形。無花瓣。蒴果，三角狀半球形，含於苞內。

生长环境 生於山坡、原野、半陰濕肥沃的地方。多為群生。

【效 用】

性 味 辛苦无毒(民間)。

功 效 清熱止血，順氣(民間)。

主 治 腹脹痛，泄瀉(民間)。

民間应用

1.痢疾 人莧5錢、鳳尾草1兩、翻白草6錢、辣蓼5錢、烏梅肉2錢，水煎服，每日3次(衡山)；又方 人莧1—2兩，水煎服(衡南)。

2.刀傷出血 叶搗烂，敷伤口。



图3 人 苋 *Acalypha australis* L.