

007210

四川中藥志

SICHUAN ZHONGYAOZHI

第二卷

四川人民出版社

四川中药志

第二卷

《四川中药志》协作编写组编



四川人民出版社

一九八二年·成都



C196-1

四川中药志 (第二卷)

四川人民出版社出版 (成都盐道街三号)
四川省新华书店发行 四川新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/16 印张18.5 插页173 字数393千
1982年6月第一版 1982年6月第一次印刷
印数: 1—2,800册

书号: 14118·31

定价: 14.00 元

《四川中药志》协作单位

四川省中药研究所

成都中医学院

四川省中药材公司

四川医学院

重庆医学院

南充师范学院

泸州医学院

重庆市中医研究所

重庆市第二中医院

成都市第一人民医院

四川农学院

四川省中药学校

成都市药品检验所

成都中药材站

重庆市财贸学校

西南师范学院

万县地区卫生局

南川药物试验种植场

目 录

一 画	
301.	一点红..... 1
302.	一枝黄花..... 1
二 画	
303.	刀口药..... 2
304.	八棱麻..... 4
305.	九子连环草..... 4
三 画	
306.	广扁线..... 5
307.	三七..... 6
308.	三月泡..... 8
309.	三楞草..... 8
310.	万年青..... 9
311.	土大黄..... 10
312.	土百部..... 11
313.	土燕窝..... 11
314.	土鳖虫..... 12
315.	大蒜..... 13
316.	大丁草..... 15
317.	大石韦..... 16
318.	大乌泡根..... 17
319.	大鹅儿肠..... 18
320.	大叶青木香..... 18
321.	马兜铃..... 19
	青木香..... 20
	附：天仙藤..... 21

322.	马脰儿..... 22
323.	小箭..... 22
324.	小发表..... 23
325.	小白薇..... 23
326.	小青草..... 24
327.	小接骨..... 24
328.	小牛肋巴..... 25
329.	小巴蕉头..... 26
330.	小乌泡根..... 26
331.	小花黄堇..... 27
332.	山石榴..... 27
333.	山香根..... 28
334.	山活麻..... 29
335.	川渡疏..... 29
四 画	
336.	火炭母..... 30
337.	火棘根..... 31
338.	火焰草..... 32
339.	五谷子根..... 32
340.	天麻..... 33
341.	天青地白草..... 36
342.	太白黄连..... 36
343.	车前草..... 37
	车前仁..... 38
344.	木姜子..... 39
345.	支柱蓼..... 40
346.	瓦韦..... 41
347.	瓦莲花..... 41

348.	水仙	42
349.	水蓼	43
350.	水灯心	44
351.	水茴香	45
352.	水浮莲	45
353.	水菖蒲	46
354.	水案板	47
355.	水蜈蚣	48
356.	水藿香	49
357.	水荳花子	50
358.	水韩信草	50
359.	见血清	51
360.	毛茛	52
361.	毛水苏	53
362.	毛狗苔	53
363.	毛黄堇	54
364.	毛蕊花	54
365.	毛薄荷	55
366.	牛毛七	56
367.	牛毛毡	56
368.	牛耳大黄	57
369.	牛角瓜叶	58
370.	牛尾泡根	59
371.	乌鸦肉	59
372.	乌梢蛇	60
373.	乌骚风	61
374.	月下参	61
375.	凤眼莲	62
376.	巴蕉头	63
377.	元叶母草	63

五 画

378.	头花蓼	64
379.	玄参	64
380.	兰布正	66
381.	兰蕨草	67
382.	半边莲	67
383.	半边旗	69

384.	玉柏	70
385.	玉米须	70
386.	玉珊瑚	71
387.	打不死	72
388.	打破碗花花	73
389.	石韦	73
390.	石刷把	75
391.	石柑子	75
392.	石草鞋	76
393.	石南藤	76
394.	对马耳蕨	77
395.	白及	78
396.	白前	79
397.	白蜡	80
398.	白薇	82
399.	白屈菜	83
400.	白绒草	85
401.	白血皮菜	85

六 画

402.	问荆	86
403.	百合	87
404.	吉祥草	88
405.	西南山梗菜	89
406.	老虎泡	89
407.	老鸦蒜	90
408.	老鼠刺	92
409.	老鹳草	93
410.	观音莲	94
411.	防风草	94
412.	阴行草	95
413.	光苦子	96
414.	光明草	97
415.	光棍草	97
416.	血盆草	98
417.	竹叶心	98
	附：阴笋子	99
418.	竹林消	99

419.	地木耳	100
420.	地蜂子	100
421.	红花	101
422.	红枣	103
423.	红活麻	104
424.	红牛皮菜	105
425.	红茎黄芩	106

七 画

426.	补骨脂	106
427.	赤车	108
428.	杠板归	108
429.	君迁子	109
430.	鸡内金	110
	凤凰衣	110
431.	鸡爪莲	111
432.	鸡腊草	112
433.	陈艾	112
434.	陈棕皮	114
435.	芦苇根	115
436.	花脸晕药	116
437.	吴茱萸	117
438.	芸香草	119
439.	旱莲草	120
440.	龟板	121
	附：龟胶	123
	龟壳	123
	龟肉	123
441.	利筋藤	124
442.	卵子草	124
443.	伸筋草	125

八 画

444.	油葱	126
445.	泽泻	127
446.	京大戟	129
447.	青果	130
448.	松节	132

	松香	133
	附：松花粉	133
	松针	134
	松树皮	134
	松子仁	134
449.	松蒿	135
450.	虎杖	135
451.	苦荞头	137
452.	岩姜七	138
453.	金边莲	138
454.	金刚藤	139
455.	金钱草	140
456.	金钱豹	141
457.	委陵菜	142
458.	肿节风	142
459.	狗牙根	144
460.	抽刀红	144
461.	拟金茅	145
462.	板栗	145

九 画

463.	扁竹根	146
464.	穿龙薯蓣	147
465.	姜花根	148
466.	鸢尾	149
467.	珍珠风	149
468.	南山藤	150
469.	胡芦壳	151
470.	胡豆草	151
471.	枳椇子	152
472.	柿蒂	153
473.	柃木	154
474.	树蕨	155
475.	柳兰	155
476.	屎蹦蹦	156
477.	点地梅	156
478.	茴香虫	157
479.	茵陈	158

480.	茯苓	160
	茯苓皮	162
	茯神	162
481.	茶叶	163
482.	茶菊	164
483.	草柏枝	166
484.	芥子	167
485.	茭白	167
486.	荸荠	168
487.	苎草	169
488.	垂盆草	169
489.	香叶	170
490.	香通	171
	甲沉香	172
	樟脑	173
491.	香附子	174
492.	香柯柯	175
493.	待霄草	176
494.	肺癆草	177
495.	急性子	177
	附：凤仙花	178
496.	独脚鸡	179
497.	娃娃拳	179
498.	盾叶薯蓣	180
499.	狭叶水竹叶	181
500.	梔子	181

十 画

501.	高乌头	183
502.	高粱子	184
503.	海金沙	185
	附：海金沙藤	186
504.	唐菖蒲	186
505.	粉条儿菜	187
506.	桂花根	187
507.	桔梗	188
508.	破血丹	189
509.	破骨风	190

510.	夏至草	191
511.	桑寄生	192
512.	通泉草	193
513.	峨山雪莲花	193
514.	鸭内金	194
515.	鸭舌草	195
516.	倒生根	195
517.	徐长卿	196
518.	铁杆地柏枝	197
519.	笋壳菜	198
520.	臭草根	198
521.	鬼针草	199
522.	透骨草	200
523.	脆蛇	201

十 一 画

524.	麻柳叶	202
525.	盘龙参	203
526.	旋覆花	203
	金佛草	204
527.	淡竹叶	205
528.	剪刀草	206
529.	雪茶	207
530.	接骨木	207
531.	球核荚蒾	208
532.	黄瓜	209
533.	黄柏	209
534.	黄水枝	212
535.	黄芥子	213
536.	药黄泡	213
537.	蛇含	214
538.	蛇莓	215
539.	蛇伤草	215
540.	蚱蜢	216
541.	野菊花	217
542.	野罌粟	218
543.	野鸡尾草	219
544.	猫儿屎	220

545.	猫眼睛	220
546.	猪毛刚	221
547.	银耳	221
548.	犁头尖	222
549.	续随子	223

十二画

550.	游草	224
551.	普贤菜	224
552.	棉花根	225
553.	楮实子	226
	附: 楮白皮	227
	楮叶	228
554.	散瘀草	228
555.	斑鸠	228
556.	隔山撬	229
557.	落地生根	230
558.	葶苈子	231
559.	葛根	232
	葛花	234
560.	紫参	235
561.	紫茉莉	235
562.	紫荆榧	236
563.	紫万年青	237
564.	黑大豆	237
	淡豆豉	238
565.	黑木耳	239
566.	黑壳楠	240
567.	黑点草	240
568.	啤酒花	241
569.	戟叶酸模	242
570.	粟米草	243
571.	提灯藤	243

十三画

572.	密蒙花	244
	附: 密蒙花根	245
	密蒙花叶	245

573.	椿树皮	245
	椿花	246
574.	碎米荠	247
575.	蒲黄	247
	附: 水蜡烛根	249
576.	蒲草根	249
577.	蜂糖花	250
578.	鼠曲草	250
579.	摇钱树根	251

十四画

580.	碧桃	252
581.	满江红	253
582.	蜘蛛香	253
583.	蓼子七	254
584.	鼻血草	255

十五画

585.	聚花过路黄	256
586.	蜈蚣	256
587.	僵蚕	257
	蚕沙	259

十六画

588.	薏苡仁	259
589.	薯蓣	261
590.	薹秧泡	262

十七画

591.	攀蓝	263
592.	蟑螂	263
593.	藤藤菜	264
594.	藤贝	265
595.	翻天印	265
596.	鞭打绣球	266
597.	攀枝花	267
598.	糯米藤	267
599.	鳖甲	268

附：鳖甲胶..... 269

 鳖肉..... 269

二十一画

600. 魔芋..... 269

附 录

一、中文名索引..... 271

二、拉丁名索引..... 278

301. 一点红

别名 红背叶、叶下红、紫背地丁。

原植物 为菊科一点红属植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC., 以全草入药。

一年生或多年生直立或近直立草本，高10~70厘米。根或带紫红色，有的具匍匐茎，节处发芽形成新的植株；直立茎或带紫红色，疏被白色柔毛，有时分枝。生于茎下部的叶大头羽状分裂，长3~10厘米，宽1.5~5厘米，边缘具齿，或成翅状；茎上部的叶较小，全缘或不规则地分裂，基部耳状，多少抱茎，叶背常为紫红色，无毛或被白色疏柔毛；全无柄。夏秋开紫红色花；头状花序，直径0.4~1.3厘米，具长总梗，常组成疏散的伞房花序，花枝常2歧分枝；总苞圆柱状，总苞片1层；全为两性管状花，花冠顶端5裂。瘦果长圆柱形，长约2.4毫米，有棱，冠毛白色。（彩图334）

生于村旁、路旁、山坡草地和荒地。产于我省各地区。分布于江西、福建、广东、广西、湖南、云南、贵州等省区。

夏秋季采收，晒干。

成分 全草显生物碱、酚类反应。

茎、叶、根含微量氢氰酸。

药理 体外试验证明，本品对痢疾杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌有抑制作用。

医疗用途

性味 苦、微辛，凉。

功用 清热解毒，散瘀消肿。用于痢疮疖肿，湿热泻痢，热淋，咽喉、目赤红肿疼痛，湿疹搔痒，毒蛇咬伤，跌打损伤。

用量 15~30克；外用适量。

附方

1. 一点红、蒲公英、木芙蓉叶各适量，捣绒外敷，治乳痈，疮疖肿痛。

2. 一点红30克，鬼针草15克，马兰15克，六月雪15克，水煎服；或一点红鲜品适量，捣取汁服，治感冒发热、咽喉红肿疼痛。

3. 一点红15克，凤尾草15克，仙鹤草15克，柚子皮15克，水煎服，治湿热泻痢。

4. 一点红、酢浆草鲜品各适量，捣烂，加酒少许，炒热外包，治跌打损伤、瘀血肿痛。

302. 一枝黄花

别名 金柴胡。

原植物 为菊科一枝黄花属植物，一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour.

[*Solidago virgaurea* L. var. *leioca-*

rpa (Benth.) A. Gray] 和加拿大一枝黄花 *Solidago canadensis* L., 以全草入药。

一枝黄花 为多年生草本，高达70厘

米，根状茎粗短，须根多条，纤细，浅棕色。茎基部木质化，略带红色，不分枝或上部稍有分枝，有细毛。叶互生，卵形，长圆形或披针形，长4~7厘米，宽1.5~2.5厘米，先端渐尖，基部骤缩下延成柄，边缘具锐锯齿，两面稍被短柔毛。5~6月开黄花，头状花序排列成顶生或腋生的总状花序，整个花序成窄长圆锥状，总苞钟状，总苞片3层，条形，边缘近膜质，中央绿色，呈条状，托盘小而平，具小凹点；外围1轮雌花舌状，舌片顶端微3齿裂，中央花两性，管状，先端5齿裂。7~9月结果，圆筒形，冠毛白色。

(彩图 335)

生于山坡林下、灌丛和路边。产于我省宜宾、乐山、重庆等地市。分布于华东、华中、西南、华南和台湾等省区。

加拿大一枝黄花 与上种主要区别在于头状花序均集成偏向一侧、稍弯曲的总状花序，再构成锥状花丛。瘦果均有细毛。叶片基部有明显的3条脉，两侧脉延伸直达顶端，上部边缘有内弯锯齿。(彩图 336)

我省有栽培。

夏季采全草，晒干。

成分 全草含槲皮甙、异槲皮甙、芸香甙、紫云英甙、山奈酚—鼠李葡萄糖甙，并含羟基肉桂酸、咖啡酸、奎尼酸、绿原酸。此外，尚含少量挥发油及皂甙、烟酸、烟酸酰胺、2, 6—二甲氧基苯甲酸苄酯、乙醇酸。鲜根含挥发油，主要为聚乙炔化合物；2, 8—顺—顺—母菊酯(2, 8—*cis-cis-matricaria ester*)、母菊γ—内酯Ⅰ及Ⅱ (*matricaria-γ-lacto-*

ne I, II)。另含毛叶菊内酯 (*lachnophyllum lactone*) 及环氧行生物A、B。

药理 1. 抗菌作用：一枝黄花煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌、肺炎双球菌、伤寒杆菌、甲型溶血性链球菌、以及红色癣菌、白色念珠菌等均有抑制作用。

2. 对家兔实验性气管炎的作用：对于由氨雾引起的家兔实验性气管炎，喂以一枝黄花煎剂，可缓解喘息状态，使哮喘音消失，干性罗音减少。一枝黄花含有皂甙，有一定祛痰作用。

3. 其它作用：一枝黄花提取物，给小白鼠皮下注射，有利尿作用；剂量过大，反而可使尿量减少。动物实验证明，一枝黄花有促进白细胞吞噬细菌的作用。

4. 毒性：一枝黄花毒性低，但长期大量服用，可引起肠出血。

医疗用途

性味 苦、辛，凉。

功用 清热解毒，消肿止痛。用于感冒风热头痛，咽喉肿痛，肺热咳嗽，疮痈肿毒，毒蛇咬伤，肺结核咳嗽咯血，外伤出血，脚癣，手癣，鹅掌风。

用量 15~30克；外用适量。

附方

1. 一枝黄花15~30克，水煎服，治感冒风热头痛，咽喉肿痛。

2. 一枝黄花15克，肺经草15克，兔耳风15克，地龙6克，水煎服，治肺热咳嗽，百日咳。

3. 鲜一枝黄花适量，洗净，捣烂外敷，同时用鲜草30~60克，水煎服，治毒蛇咬伤、疮痈肿毒。

303. 刀 口 药

原植物 为萝藦科马利筋属植物马利

筋 *Asclepias curassavica* L.，以全草

米，根状茎粗短，须根多条，纤细，浅棕色。茎基部木质化，略带红色，不分枝或上部稍有分枝，有细毛。叶互生，卵形，长圆形或披针形，长4~7厘米，宽1.5~2.5厘米，先端渐尖，基部骤缩下延成柄，边缘具锐锯齿，两面稍被短柔毛。5~6月开黄花，头状花序排列成顶生或腋生的总状花序，整个花序成窄长圆锥状，总苞钟状，总苞片3层，条形，边缘近膜质，中央绿色，呈条状，托盘小而平，具小凹点；外围1轮雌花舌状，舌片顶端微3齿裂，中央花两性，管状，先端5齿裂。7~9月结果，圆筒形，冠毛白色。

(彩图 335)

生于山坡林下、灌丛和路边。产于我省宜宾、乐山、重庆等地市。分布于华东、华中、西南、华南和台湾等省区。

加拿大一枝黄花 与上种主要区别在于头状花序均集成偏向一侧、稍弯曲的总状花序，再构成锥状花丛。瘦果均有细毛。叶片基部有明显的3条脉，两侧脉延伸直达顶端，上部边缘有内弯锯齿。(彩图 336)

我省有栽培。

夏季采全草，晒干。

成分 全草含槲皮甙、异槲皮甙、芸香甙、紫云英甙、山奈酚—鼠李葡萄糖甙，并含羟基肉桂酸、咖啡酸、奎尼酸、绿原酸。此外，尚含少量挥发油及皂甙、烟酸、烟酸酰胺、2,6-二甲氧基苯甲酸苄酯、乙醇酸。鲜根含挥发油，主要为聚乙炔化合物；2,8-顺—顺—母菊酯(2,8-cis-cis-matricaria ester)、母菊γ-内酯Ⅰ及Ⅱ(matricaria-γ-lacto-

ne Ⅰ、Ⅱ)。另含毛叶菊内酯(lachnophyllum lactone)及环氧行生物A、B。

药理 1. 抗菌作用：一枝黄花煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌、肺炎双球菌、伤寒杆菌、甲型溶血性链球菌、以及红色癣菌、白色念珠菌等均有抑制作用。

2. 对家兔实验性气管炎的作用：对于由氨雾引起的家兔实验性气管炎，喂以一枝黄花煎剂，可缓解喘息状态，使哮喘音消失，干性罗音减少。一枝黄花含有皂甙，有一定祛痰作用。

3. 其它作用：一枝黄花提取物，给小白鼠皮下注射，有利尿作用；剂量过大，反而可使尿量减少。动物实验证明，一枝黄花有促进白细胞吞噬细菌的作用。

4. 毒性：一枝黄花毒性低，但长期大量服用，可引起肠出血。

医疗用途

性味 苦、辛，凉。

功用 清热解毒，消肿止痛。用于感冒风热头痛，咽喉肿痛，肺热咳嗽，疮痈肿毒，毒蛇咬伤，肺结核咳嗽咯血，外伤出血，脚癣，手癣，鹅掌风。

用量 15~30克；外用适量。

附方

1. 一枝黄花15~30克，水煎服，治感冒风热头痛，咽喉肿痛。

2. 一枝黄花15克，肺经草15克，兔耳风15克，地龙6克，水煎服，治肺热咳嗽，百日咳。

3. 鲜一枝黄花适量，洗净，捣烂外敷，同时用鲜草30~60克，水煎服，治毒蛇咬伤、疮痈肿毒。

303. 刀 口 药

原植物 为萝藦科马利筋属植物马利

筋 *Asclepias curassavica* L.，以全草

和种毛入药。茎的液汁亦供药用。

多年生直立草本，高60~100厘米，无毛，全株有白色乳汁。主根圆柱形，疏生细长支根。叶对生，披针形或椭圆状披针形，长6~13厘米，宽1~3.5厘米，顶端渐尖，全缘，基部楔形至阔楔形。5~9月开花，聚伞花序顶生及腋生，有花10~20朵；花冠红色，裂片5，矩圆形，反折；副花冠5裂，黄色，生于雄蕊背面，匙形；雌蕊和雄蕊合生成合蕊柱，花丝、花药合生，形成合蕊冠，花粉块下垂。蓇葖果刺刀形，顶端渐尖，长6~10厘米，光滑，直径1~1.5厘米；种子卵圆形，顶端具白绢质长达2.5厘米的种毛。（彩图337）

生于温暖的旷野、河谷湿地。我省各地有栽培。分布于我国各地。

夏季采全株，秋季采收果实，取出种毛，干燥。

成分 全草含卡罗托甙（即牛角瓜甙，Calotropin）。叶和花显生物碱反应。

药理 1. 强心作用：马利筋茎的煎剂及叶、花、种子、果壳的酊剂，由蛙淋巴囊注射时，对在位心脏均有强心作用，都能以0.1克左右使的剂量（以生药汁），于1小时左右使心脏停止于收缩期。马利筋花的作用强度与茎相似，叶的作用较差，蒴壳最弱。通过在位猫心与猫肺装置及心电图描记，在用巴比妥钠伤害心脏后静注马利筋种子酊，1分钟左右，即可引起心肌收缩振幅增强达1.5倍，随后出现马利筋中毒现象，心脏振幅变小，停止于舒张期，心电图描记观察到PR间隔与PQ间隔都有延长。从马利筋全植物分离得的粗甙—马利筋甙0.5毫克，从蛙腿淋巴囊给药，使在位心脏停止于收缩状态；在位兔心实验及离体豚鼠心脏灌注及心电图观察

均证明马利筋甙与马利筋酊的作用一致，具有正性肌力作用，负性频率与负性传导作用，并且与毒毛旋花子素G作用性质很相似，作用迅速而蓄积性很小，马利筋甙的生物学强度比原生药大732倍，而仅为毒毛旋花子素G的1/4~1/5。马利筋甙对鸽的静注MLD为 0.75 ± 0.017 毫克/公斤，马利筋酊对鸽的MLD为 54.97 ± 19.4 毫克/公斤，可能为有用的强心药。本品所含卡罗托甙的药理作用，见牛耳树药理项下。

2. 催吐作用：马利筋的根茎有催吐作用。

3. 毒性：马利筋茎、叶的水、醇、石油醚提取物，分别给予大鼠，每天剂量少于原生药2克，连续给药4周，未引起动物死亡，对体重和生殖功能都没有影响。马利筋乙醇提取物，注射于家兔腹腔，每日5毫克/公斤，连续5日后，未产生积蓄作用，但是兔和大鼠静注马利筋的醇提取物时，可引起肺和胃肠道变得苍白，肾脏充血，以及脑、肺、肠系膜小动脉、脊髓的颈腰部位出血。马利筋属植物具有一定毒性，凡野生此属植物较多的草原，不利于放牧。

医疗用途

性味 苦，寒。有小毒。

功用 活血止血，清热解毒。用于跌打损伤，外伤出血，痈疮肿痛，顽癣。

用量 3~9克。

附方

1. 刀口药9克，红泽兰15克，牛膝15克，透骨消15克，水煎服，治跌打损伤。

2. 刀口药适量，晒干研末，撒敷伤口，治外伤出血。

3. 刀口药6~9克，水煎服，并用鲜品适量，捣烂敷患处，治痈疮肿毒。

4. 鲜刀口药折断后流出的白浆搽患处，每日2次，治顽癣。

304. 八 棱 麻

别名 四棱香、四棱麻。

原植物 为菊科风毛菊属植物风毛菊 *Saussurea japonica* DC. 以全草入药。

多年生草本，高30~150厘米。茎粗壮，具疏生的腺点和细毛，纵棱显著，具翅，上部分枝开展。叶互生，长椭圆形，长10~30厘米，宽2~4厘米，稍呈羽状分裂，裂片7~8对，顶端钝，基部渐窄，两面均具腺点和细毛，上部叶椭圆形、披针形或条状披针形，全缘；叶柄具下延窄翼直至基部。9~11月开紫红色花，头状花序顶生，直径1~1.5厘米，成密集的伞房花丛；总苞筒状，长8~12毫米，宽5~8毫米，总苞片多层，外层苞片较短小，中层和内层苞片条形，顶端具膜质圆形的附片，背部和顶端通常紫红色；管状花长10~14毫米。瘦果有条纹，稍弯曲，长约4毫米，无毛，冠毛2轮，外轮较短。（彩图338）

生于山坡草地。产于我省绵阳、涪

陵、乐山、阿坝、重庆等地州市。分布于山东、江苏、浙江、江西、安徽、福建、广东、广西、湖北、湖南等省区。

夏秋季采全草，去净泥土，晾干。

医疗用途

性味 辛，微温。

功用 祛风除湿，舒筋活络，散寒止咳。用于风寒湿痹，跌打损伤，风寒咳嗽，皮肤搔痒。

用量 9~15克。

禁忌 孕妇忌服。

附方

1. 八棱麻30克，伸筋草30克，舒筋草30克，石南藤30克，红牛膝30克，续断15克，泡酒服，治风湿筋骨疼痛，寒湿腰痛。

2. 八棱麻30克，泡酒服，治跌打损伤。

3. 八棱麻15克，散寒草15克，蛇含15克，水煎服，治风寒咳嗽。

4. 八棱麻、毛桐各等量，煎水常洗患处，治皮肤搔痒。

305. 九子连环草

别名 肉连环、铁连环、硬九子连。

原植物 为兰科虾脊兰属植物马里虾脊兰 *Calanthe mannii* Hook. f. 和流苏虾脊兰 *C. fimbriata* Franch.，以根状茎（假鳞茎）入药。

马里虾脊兰 多年生草本，高20~30厘米。假鳞茎数个串连着生，倒圆锥形，肉质，直径0.8~1.5厘米。叶2枚基生，长椭圆形，长15~20厘米，宽6~8厘米，基部抱合折叠，全缘，先端骤尖，主脉通常5条，两面绿色，下部的叶小至无叶片。

6~7月开花，黄色，花茎自叶丛中抽出，长约30厘米，总状花序，花少数，外轮花被3，长8~11毫米，有5条脉纹，内轮花被较小，脉纹3条，唇瓣淡黄色，3裂，中央裂片较大，质较厚，具紫色斑纹，先端具尖头，距短，长约2毫米。（彩图339）

多生于海拔1200~2800米山地林下。产于我省乐山、雅安、西昌、绵阳等地区。分布于陕西、云南、西藏等省区。

流苏虾脊兰 与上种的主要区别在于

假鳞茎椭圆形，叶常为3枚。花茎中部具1膜质总苞，花多数，紫蓝色，唇瓣先端近截形，呈不整齐的流梳状浅裂，距细长。(彩图340)

生境分布同马里虾脊兰。

夏、秋季采挖假鳞茎，除去须根，洗净，晒干。

医疗用途

性味 苦、微辛，凉。

功用 软坚散结，清热解毒。用于痰核瘰疬，疮疖肿痛，痔疮，咽喉肿痛。

用量 9~15克，外用适量。

附方

1.九子连环草15克，夏枯草15克，水煎服，并以九子连环草、韭菜各适量，捣绒外敷，治痰核瘰疬。

2.九子连环草15克，金银花藤15克，野菊花15克，千里光15克，水煎服，并用九子连环草研末，调油或调醋敷患处，治脓肿初起，红肿疼痛。

3.九子连环草为末，调清油涂搽患处，治痔疮肿痛。

4.九子连环草6克，朱砂根6克，水煎服，治咽喉肿痛。

306. 广 扁 线

别名 捆仙绳(重庆)。

原植物 为罂粟科血水草属植物血水草 *Eomecon chionantha* Hance, 以根和根状茎入药，其茎叶亦供药用。

多年生草本，高30~60厘米。根和根状茎均为黄色，剖面橙黄色，味苦，有黄色汁液。茎紫绿色，有光泽，含红黄色汁液。叶全为基生，卵状心形，长3~15厘米，宽5~12厘米，顶端急尖，基部深心形，边缘波状，叶面青绿色，叶背灰绿色，被白粉，叶脉呈掌状5~7条，明显；叶柄长10~30厘米，基部具窄鞘。夏季开花，花较大，顶生伞房状的稀疏聚伞花序；花萼2，下部合生，船形，浅绿色，长0.6~1.5厘米，顶端渐尖，开花时破裂，脱落；花瓣4，白色，倒卵形，长1.4~1.8厘米；雄蕊多数，花药矩圆形，花丝丝状；雌蕊单1，子房卵形，花柱明显，顶端2浅裂。蒴果棱形，黑褐色，两端尖；种子多数，椭圆形，深褐色。(彩图341)

生于沟边或低平地方，喜生于肥厚而湿润的土壤，海拔900~2000米。产于我省

绵阳、万县、涪陵、江津、宜宾、乐山等地区。分布于江西、广西、湖北、湖南、贵州等省区。

秋季采挖全草，将根和根状茎与茎叶分开，晒干。

医疗用途

性味 苦、辛，微寒。有小毒。

功用 清热解毒，活血止痛。用于肝热目赤，跌打损伤，腰痛。外用治毒蛇咬伤，疔疮疖肿，湿疹疥癣。

用量 3~9克，外用适量。

附方

1.广扁线9克，木贼9克，夏枯草15克，荆芥6克，水煎服，治肝经风热、目赤多泪、头晕。

2.广扁线12克，狗脊15克，续断15克，骨碎补15克，红花6克，水煎服或酒浸服，治跌打损伤腰脊疼痛。

3.广扁线、蛇床子、硫黄各等分，研末，用水调敷患处，治疥癣、疮肿、湿疹。

假鳞茎椭圆形，叶常为3枚。花茎中部具1膜质总苞，花多数，紫蓝色，唇瓣先端近截形，呈不整齐的流梳状浅裂，距细长。(彩图340)

生境分布同马里虾脊兰。

夏、秋季采挖假鳞茎，除去须根，洗净，晒干。

医疗用途

性味 苦、微辛，凉。

功用 软坚散结，清热解毒。用于痰核瘰疬，疮疖肿痛，痔疮，咽喉肿痛。

用量 9~15克，外用适量。

附方

1.九子连环草15克，夏枯草15克，水煎服，并以九子连环草、韭菜各适量，捣绒外敷，治痰核瘰疬。

2.九子连环草15克，金银花藤15克，野菊花15克，千里光15克，水煎服，并用九子连环草研末，调油或调醋敷患处，治脓肿初起，红肿疼痛。

3.九子连环草为末，调清油涂搽患处，治痔疮肿痛。

4.九子连环草6克，朱砂根6克，水煎服，治咽喉肿痛。

306. 广 扁 线

别名 捆仙绳(重庆)。

原植物 为罂粟科血水草属植物血水草 *Eomecon chionantha* Hance, 以根和根状茎入药，其茎叶亦供药用。

多年生草本，高30~60厘米。根和根状茎均为黄色，剖面橙黄色，味苦，有黄色汁液。茎紫绿色，有光泽，含红黄色汁液。叶全为基生，卵状心形，长3~15厘米，宽5~12厘米，顶端急尖，基部深心形，边缘波状，叶面青绿色，叶背灰绿色，被白粉，叶脉呈掌状5~7条，明显；叶柄长10~30厘米，基部具窄鞘。夏季开花，花较大，顶生伞房状的稀疏聚伞花序；花萼2，下部合生，船形，浅绿色，长0.6~1.5厘米，顶端渐尖，开花时破裂，脱落；花瓣4，白色，倒卵形，长1.4~1.8厘米；雄蕊多数，花药矩圆形，花丝丝状；雌蕊单1，子房卵形，花柱明显，顶端2浅裂。蒴果棱形，黑褐色，两端尖；种子多数，椭圆形，深褐色。(彩图341)

生于沟边或低平地方，喜生于肥厚而湿润的土壤，海拔900~2000米。产于我省

绵阳、万县、涪陵、江津、宜宾、乐山等地区。分布于江西、广西、湖北、湖南、贵州等省区。

秋季采挖全草，将根和根状茎与茎叶分开，晒干。

医疗用途

性味 苦、辛，微寒。有小毒。

功用 清热解毒，活血止痛。用于肝热目赤，跌打损伤，腰痛。外用治毒蛇咬伤，疔疮疖肿，湿疹疥癣。

用量 3~9克，外用适量。

附方

1.广扁线9克，木贼9克，夏枯草15克，荆芥6克，水煎服，治肝经风热、目赤多泪、头晕。

2.广扁线12克，狗脊15克，续断15克，骨碎补15克，红花6克，水煎服或酒浸服，治跌打损伤腰脊疼痛。

3.广扁线、蛇床子、硫黄各等分，研末，用水调敷患处，治疥癣、疮肿、湿疹。