

家有中草原色图谱 鉴别真伪药无烦恼

林余霖 李葆莉 魏建和 ◆ 主编

中草药

真伪鉴别原色图谱

2



黄柏

味苦，性寒。有清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮的功能。



仙鹤草

味苦、涩，性平。有收敛止血，补虚，截疟，止痛，解毒的功能。



党参

味甘、性平。有补中益气，健脾益肺，生津的功能。



大黄

味苦，性寒。有泻火通便，破积滞，行瘀血的功能。



华龄出版社
HUALING PRESS



中草药

真伪鉴别原色图谱

家有中草原色图谱

辨别真伪药无烦恼



中草药真伪鉴别

原色图谱

编委会

主 编 林余霖 李葆莉 魏建和

编著者 胡炳义 张本刚 李 标 王 瑀 彭 勇 胡灏禹

张 昭 陈菁瑛 李学兰 吕惠珍 凯撒·苏来曼

宋经元 赵鑫磊 姚 辉 黄林芳 冯璟璐 潘佳韵

2卷



华龄出版社
HUALING PRESS

责任编辑：郑建军

责任印制：李未圻

图书在版编目（CIP）数据

中草药真伪鉴别原色图谱 / 林余霖，李葆莉，魏建和主编. — 北京：华龄出版社，2020.1

ISBN 978-7-5169-1499-1

I. ①中… II. ①林… ②李… ③魏… III. ①中药鉴定学—图谱 IV. ①R282.5-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第249253号

书 名：中草药真伪鉴别原色图谱

作 者：林余霖 李葆莉 魏建和

出 版 人：胡福君

出版发行：华龄出版社

地 址：北京市东城区安定门外大街甲57号 邮 编：100011

电 话：010-58122246 传 真：010-84049572

网 址：<http://www.hualingpress.com>

印 刷：德富泰（唐山）印务有限公司

版 次：2020年1月第1版 2020年1月第1次印刷

开 本：710×1000 1/16 印 张：52

字 数：580千字

定 价：360.00元（全四卷）

版权所有 翻印必究

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

编写范例

1、本书收载《中华人民共和国药典》（2015年版，以下简称《药典》）中以植物为基源的药材400种，依笔画顺序编排。

2、每种药物的内容文字说明均按以下顺序编排


[1] **【来源】**说明基源植物的名称及所属的科名，以及该植物的入药部位。

[2] **【原植物】**原植物的拉丁学名使用《药典》2015年版的记述，有些学名与《Flora of China》，《中国植物志》，《中国高等植物图鉴》等不一致，本书则在〔附注〕或〔混伪品〕中另有介绍，植物别名仅收载常用的名称，本项还记述植物的形态特征、花果期。

[3] **【生境分布】**记述该物种的生长环境和分布地区。

[4] **【采收加工】**记述该药材的采收时间和产地的加工方法。

[5] **【药材性状】**记述药材的形态特征，力求对多基源的药材分别叙述，如药材麻黄来源于草麻黄、中麻黄及木贼麻黄的地上部分，本书在**【药材性状】**项下分别记述基源为草麻黄、中麻黄及木贼麻黄的麻黄性状。



[6] **【炮制与饮片】**依《药典》2015 版描述，按净制、切制、炮炙工艺描述。

[7] **【性味功能】**记述该药的性味和功能。

[8] **【主治用法】**记述该药物的主要途。

[9] **【混伪品】**及**【附注】**凡是与《药典》2015 年版中规定不符的均列在此项下，包括物种混乱、药用部位混乱、地方习惯用药、有意造假等。

3、图片为便于读者使用，本书配有丰富的图片，包括原植物、原药材及饮片图。图注括号内容说明该药材的基源植物，如“秦艽药材（粗茎秦艽）”指基原植物为粗茎秦艽的秦艽药材、“秦艽药材（麻花秦艽）”指基原植物为麻花秦艽的秦艽药材。

本书的出版得到中国医学科学院医学与健康科技创新工程（编号 2016-12M-2-003）、学科建设专项建设项目“国家药用植物园体系中医药文化传承建设”（清华 211-201920100902）以及国家科技基础资源调查专项（编号 2018FY100700）的支持，在此表示感谢。

目 录

丁香; 母丁香·····	1	千金子·····	63
八角茴香·····	3	川木香·····	65
人参·····	5	川木通·····	68
九里香·····	8	川贝母·····	72
刀豆·····	10	川牛膝·····	78
三七·····	12	川乌; 制川乌·····	80
三白草·····	14	川芎·····	83
三棱·····	16	川射干·····	85
干姜·····	18	川楝子·····	87
土木香·····	20	广枣·····	89
土贝母·····	22	广藿香·····	90
土荆皮·····	24	女贞子·····	92
土茯苓·····	26	小茴香·····	94
大血藤·····	28	小通草·····	96
大青叶·····	30	小蓟·····	100
大黄·····	32	马齿苋·····	102
大蓟·····	34	马钱子·····	104
大枣·····	36	马兜铃·····	106
大腹皮·····	38	马鞭草·····	110
山麦冬·····	40	王不留行·····	112
山豆根·····	43	天仙子·····	114
山茱萸·····	45	天仙藤·····	115
山药·····	47	天门冬·····	116
山柰·····	50	天花粉·····	118
山银花·····	52	天麻·····	120
山楂·····	56	天葵子·····	123
山慈菇·····	59	木瓜·····	125
千年健·····	61	木香·····	127

木贼·····	130	北豆根·····	213
木通·····	133	北沙参·····	214
木蝴蝶·····	135	生姜·····	216
木鳖子·····	137	仙茅·····	217
五加皮·····	139	仙鹤草·····	219
五味子·····	142	白及·····	221
五倍子·····	144	白术·····	224
太子参·····	147	白头翁·····	226
车前子·····	149	白芍·····	228
牛蒡子·····	152	白芷·····	230
牛膝·····	154	白附子·····	232
升麻·····	157	白茅根·····	235
片姜黄·····	161	白果·····	237
化橘红·····	162	白前·····	239
月季花·····	165	白扁豆·····	242
丹参·····	167	白蔹·····	244
乌药·····	170	白鲜皮·····	246
乌梅·····	172	白薇·····	248
火麻仁·····	174	瓜蒌·····	252
巴豆·····	176	瓜蒌子·····	254
巴戟天·····	178	瓜蒌皮·····	256
水红花子·····	180	冬瓜皮·····	258
功劳木·····	182	冬虫夏草·····	259
甘松·····	184	玄参·····	261
甘草·····	186	冬凌草·····	263
甘遂·····	190	半边莲·····	264
艾叶·····	192	半枝莲·····	265
石斛·····	194	半夏; 法半夏·····	267
玉竹·····	199	丝瓜络·····	270
石韦·····	202	老鹳草·····	272
石菖蒲·····	205	地肤子·····	276
龙胆·····	207	地骨皮·····	278
龙眼肉·····	211	地黄; 熟地黄·····	280
平贝母·····	212	地榆·····	282

地锦草·····	285	苏木·····	363
亚麻子·····	287	杜仲·····	365
西红花·····	289	巫山淫羊藿·····	367
西洋参·····	291	豆蔻·····	369
百合·····	293	两面针·····	372
百部·····	297	连钱草·····	374
当归·····	300	连翘·····	376
肉豆蔻·····	303	吴茱萸·····	379
肉苁蓉·····	305	牡丹皮·····	381
肉桂·····	307	何首乌; 制何首乌·····	384
竹节参·····	309	伸筋草·····	387
延胡索·····	311	佛手·····	389
合欢皮·····	313	皂角刺·····	391
合欢花·····	315	余甘子·····	393
决明子·····	316	谷芽·····	395
关黄柏·····	319	谷精草·····	397
灯心草·····	321	辛夷·····	399
防己·····	323	羌活·····	403
防风·····	326	沙苑子·····	405
红豆蔻·····	328	忍冬藤·····	407
红花·····	330	鸡血藤·····	408
红芪; 炙红芪·····	332	鸡骨草·····	410
麦冬·····	334	鸡冠花·····	412
麦芽·····	336	玫瑰花·····	414
远志·····	337	青风藤·····	416
赤小豆·····	340	青皮·····	418
赤芍·····	342	青果·····	420
芫花·····	345	青箱子·····	422
花椒·····	347	青蒿·····	424
芥子·····	351	板蓝根·····	425
苍术·····	354	苦木·····	427
苍耳子·····	357	苦地丁·····	429
芡实·····	359	苦杏仁·····	431
芦根·····	361	苦参·····	434

苦楝皮·····	436	茜草·····	508
苘麻子·····	438	澄茄子·····	510
枇杷叶·····	440	草乌; 制草乌·····	511
松花粉·····	442	草豆蔻·····	513
刺五加·····	444	草果·····	515
郁李仁·····	446	茵陈·····	517
郁金·····	451	茯苓·····	519
虎杖·····	456	菴蔚子·····	521
明党参·····	458	胡芦巴·····	523
罗布麻叶·····	460	胡椒·····	525
罗汉果·····	461	荔枝核·····	527
知母·····	463	南五味子·····	529
委陵菜·····	465	南板蓝根·····	531
垂盆草·····	467	枳壳·····	533
使君子·····	469	枳实·····	535
侧柏叶·····	471	柏子仁·····	538
佩兰·····	473	梔子; 焦梔子·····	539
金果榄·····	474	枸杞子·····	541
金佛草·····	476	枸骨叶·····	543
金荞麦·····	478	柿蒂·····	544
金钱草·····	479	威灵仙·····	545
金银花·····	482	厚朴·····	548
金樱子·····	484	砂仁·····	550
狗脊·····	486	牵牛子·····	554
肿节风·····	488	鸦胆子·····	556
鱼腥草·····	490	韭菜子·····	558
京大戟·····	492	骨碎补·····	559
闹羊花·····	494	钩藤·····	561
卷柏·····	496	香加皮·····	565
泽兰·····	498	香附·····	566
泽泻·····	500	香橼·····	568
细辛·····	502	香薷·····	570
荆芥·····	506	重楼·····	572

独活·····	576	粉草薺·····	641
胖大海·····	579	益母草·····	642
急性子·····	580	益智·····	644
前胡·····	581	拳参·····	646
首乌藤·····	583	浙贝母·····	649
姜黄·····	584	海金沙·····	651
洋金花·····	586	浮萍·····	653
穿心莲·····	588	预知子·····	655
络石藤·····	590	桑叶·····	658
秦艽·····	592	桑白皮·····	659
秦皮·····	595	桑枝·····	660
珠子参·····	598	桑寄生·····	661
桂枝·····	600	桑葚·····	663
桔梗·····	601	通草·····	664
桃仁·····	603	黄芩·····	666
胡桃仁·····	606	黄芪·····	668
莱菔子·····	608	黄连·····	671
莲子·····	610	黄柏·····	674
莲子心·····	611	黄精·····	676
莪术·····	612	菝葜·····	680
荷叶·····	614	菟丝子·····	682
夏天无·····	615	菊花·····	685
夏枯草·····	617	梅花·····	687
柴胡·····	619	常山·····	689
党参·····	622	野菊花·····	691
鸭跖草·····	625	蛇床子·····	693
铁皮石斛·····	627	银杏叶·····	694
积雪草·····	629	银柴胡·····	695
射干·····	631	猪牙皂·····	697
徐长卿·····	633	猪苓·····	699
凌霄花·····	635	猫爪草·····	700
高良姜·····	637	旋覆花·····	701
粉葛·····	639	麻黄·····	704

麻黄根·····	707	槐角·····	764
鹿衔草·····	708	路路通·····	766
商陆·····	710	锦灯笼·····	768
淫羊藿·····	712	满山红·····	770
淡竹叶·····	717	蔓荆子·····	771
密蒙花·····	718	蓼大青叶·····	774
川续断·····	720	槟榔·····	776
贯众·····	723	榧子·····	778
绵萆薢·····	727	酸枣仁·····	780
款冬·····	729	豨莶草·····	782
葛根·····	731	罌粟壳·····	785
葶苈子·····	733	漏芦·····	787
篇蓄·····	735	槲寄生·····	789
楮实子·····	736	墨旱莲·····	791
棕板·····	738	稻芽·····	793
紫花地丁·····	740	橘核·····	795
紫苏子·····	742	橘红·····	796
紫苏叶·····	744	鹤虱·····	797
紫苏梗·····	745	薤白·····	798
紫菀·····	746	薏苡仁·····	800
黑芝麻·····	748	薄荷·····	802
鹅不食草·····	749	颠茄·····	804
湖北贝母·····	751	藏菖蒲·····	805
蓖麻子·····	753	藁本·····	807
蒺藜·····	755	檀香·····	810
蒲公英·····	756	藕节·····	812
蒲黄·····	758	覆盆子·····	813
椿皮·····	760	瞿麦·····	814
槐花·····	762		

玉竹 Yuzhu

【来源】玉竹为百合科（Liliaceae）植物玉竹的根茎。

【原植物】玉竹 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce. 别名：地管子，铃铛菜。

多年生草本，高20～60cm。根茎横生，长柱形，黄白色，节间长，有结节，密生多数须根。茎单一，生长时向一边斜立，有纵棱，有时稍带紫色。叶互生，几无柄，叶椭圆形或卵状长圆形，长5～12cm，宽3～6cm，先端钝尖，基部楔形，全缘，上面绿色，下面灰白色，中脉隆起，平滑或有乳头突起。花腋生，常1～3朵簇生，花梗下垂，总花梗长1～1.6cm，无苞片或有线状披针形苞片；花被筒状，白色，先端6裂，裂片卵圆形，常带绿色；雄蕊6，着生于花被筒中部，花丝丝状，白色，花药黄色，不外露；子房上位，长3～4mm，3室，花柱线形，长1～1.4cm。浆果球形，熟时紫黑色。花期4～6月。果期7～9月。



【生境分布】生于林下或山野阴湿处。分布于东北、华北、西北及黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、内蒙古、甘肃、青海、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、台湾、湖南、湖北、广东、广西等省、自治区。

【采收加工】野生品全年可采；栽培品种植2～3年后于春、秋两季采挖，去须根及泥土，稍晾后用手揉搓，反复晒揉2～3次，至内无硬心，晒干。

【药材性状】根茎圆柱形或扁圆柱形，有分枝，长5～15cm，直径约1cm。淡

黄棕色或黄棕色，半透明，有皱纹及环节，可见须根痕，根茎一端有时有叶芽，外有鳞叶，每隔5~10cm处有圆形茎痕。质硬，受潮软韧，易折断，断面棕黄色，肉质，微透明或半透明。气微，味甘带粘性。

【炮制及饮片】 除去杂质，洗净，润透，切厚片或段，干燥。

【性味功能】 味甘，性平。有养阴润燥，生津止渴的功能。

【主治用法】 用于热病伤阴，口燥咽干，干咳少痰，心烦心悸，肺结核咳嗽，糖尿病，心脏病等症。用量9~15g。



【混伪品】

玉竹为常用中药，临床用量大，同科多种植物的根茎，如康定玉竹、二苞黄精、小玉竹、热河黄精与玉竹近似，应注意区别。5种玉竹基源植物的检索表：

1、花被长6~8mm；根状茎细圆柱形，节和节间粗细等……康定玉竹
Polygonatum prattii

1、花被长(1.3~)1.5~3cm

2、苞片叶状，卵形，长1~3.5cm，具多脉；花序具2苞片……二苞黄精
Polygonatum involucreatum

2、苞片钻形或线状披针形，微小，稀长达1.2cm，无脉或具3~5脉，或无苞片

3、叶下面被短糙毛……小玉竹
Polygonatum humile

3、叶下面无毛

4、花序具 1 ~ 2 (~ 4) 花…………… 玉竹 *Polygonatum odoratum*

4、花序具 (3 ~)5 ~ 12 (~ 17) 花…………… 热河黄精 *Polygonatum macropodium*



石韦 Shiwei

【来源】 石韦为水龙骨科 (Polypodiaceae) 植物庐山石韦、石韦或有柄石韦的干燥叶。

【原植物】 1、庐山石韦 *Pyrrrosia sheareri* (Bak.) Ching 别名：大叶石韦，刀口药，光板石韦。

多年生草本。植株高 20 ~ 60cm。根状茎粗壮，横走或斜升，密生棕色鳞片。叶一型，近生，坚革质。叶柄长 10 ~ 30cm，粗壮。叶片阔披针形，长 20 ~ 40cm，宽 3 ~ 5cm，向顶部渐狭，锐尖头，向基部变宽，为不等的圆耳形或心形，不下延，上面有小凹点，下面生黄色紧密的星状毛。孢子囊群在侧脉间排成多行，无盖。

2、石韦 *Pyrrrosia lingua* (Thunb.) Farwell 别名：石兰，石剑，小石韦。

多年生草本，高 10 ~ 30cm。根状茎细长，横走，密被棕色鳞片。叶二型，远生，草质。能育叶与不育叶同形，披针形至矩圆披针形，渐尖头，叶片上面有凹点，偶见星状毛，下面密生星状毛，侧脉明显。孢子囊群在侧脉间整齐紧密排列，无盖。

3、有柄石韦 *Pyrrrosia petiolosa* (Christ) Ching 别名：石茶，独叶菜。

多年生草本。根状茎长而横走，密被棕褐色披针形鳞片，边缘有锯齿。叶二型，疏生；营养叶柄较孢子叶柄为短，革质，上面无毛，有排列整齐的小凹点，下面密



被棕色星状毛，干后通常向上内卷成筒状。叶片长圆形或卵状长圆形，全缘，顶端钝头，偶为锐尖，叶脉不明显。孢子囊群深棕色，成熟时满布于叶片的背面。

【生境分布】 庐山石韦生于林下岩石或树干上，分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾及中南、西南等地区。石韦生于岩石或树干上，分布于长江以南各省区。有柄石韦生于裸露干旱岩石上，分布于东北、华北、西南和长江中、下游各省区。

【采收加工】 四季均可采收。摘取叶片，除去根状茎及须根，晒干或阴干即可。



【药材性状】 1、庐山石韦 叶片略皱缩，展平后呈披针形，长10~25cm，宽3~5cm。先端渐尖，基部耳状偏斜，全缘，边缘常向内卷曲；上表面黄绿色或灰绿色，散布有黑色圆形小凹点；下表面密生红棕色星状毛，有的侧脉间布满棕色圆点状的孢子囊群。叶柄具四棱，长10~20cm，直径1.5~3mm，略扭曲，有纵槽。叶片革质。气微，味微涩苦。

2、石韦 叶片披针形或长圆披针形，长8~12cm，宽1~3cm。基部楔形，对称。孢子囊群在侧脉间，排列紧密而整齐。叶柄长5~10cm，直径约1.5mm。

3、有柄石韦 叶片多卷曲呈筒状，展平后呈长圆形或卵状长圆形，长3~8cm，宽1~2.5cm。基部楔形，对称。下表面侧脉不明显，布满孢子囊群。叶柄长3~12cm，直径约1mm。



石韦药材(石韦)



石韦药材(有柄石韦)



石韦药材(庐山石韦)

【炮制及饮片】 除去杂质，洗净，切段，晒干，筛去细屑。

【性味功能】 味苦、甘，性微寒。有利尿通淋，清肺止咳，止血的功能。

【主治用法】 用于小便不利，血淋，尿血，尿路结石，肾炎浮肿，肺热咳嗽，崩漏等。用量6~12g。