

家有中草原色图谱 鉴别真伪药无烦恼

林余霖 李葆莉 魏建和 ◆ 主编

中草药

真伪鉴别原色图谱

3



黄柏

味苦，性寒。有清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮的功能。



仙鹤草

味苦、涩，性平。有收敛止血，补虚，祛瘀，止痛，解毒的功能。



党参

味甘、性平。有补中益气，健脾益肺，生津的功能。



大黄

味苦，性寒。有泻火通便，破积滞，行瘀血的功能。

 华龄出版社
HUALING PRESS



中草药

真伪鉴别原色图谱

家有中草原色图谱

辨别真伪药无烦恼



中草药真伪鉴别

原色图谱

编委会

主 编 林余霖 李葆莉 魏建和

编著者 胡炳义 张本刚 李 标 王 瑀 彭 勇 胡灏禹

张 昭 陈菁瑛 李学兰 吕惠珍 凯撒·苏来曼

宋经元 赵鑫磊 姚 辉 黄林芳 冯璟璐 潘佳韵

3卷



华龄出版社
HUALING PRESS

责任编辑：郑建军

责任印制：李未圻

图书在版编目（CIP）数据

中草药真伪鉴别原色图谱 / 林余霖，李葆莉，魏建和主编. — 北京：华龄出版社，2020.1

ISBN 978-7-5169-1499-1

I. ①中… II. ①林… ②李… ③魏… III. ①中药鉴定学—图谱 IV. ①R282.5-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 249253 号

书 名：中草药真伪鉴别原色图谱

作 者：林余霖 李葆莉 魏建和

出 版 人：胡福君

出版发行：华龄出版社

地 址：北京市东城区安定门外大街甲 57 号 邮 编：100011

电 话：010-58122246 传 真：010-84049572

网 址：<http://www.hualingpress.com>

印 刷：德富泰（唐山）印务有限公司

版 次：2020 年 1 月第 1 版 2020 年 1 月第 1 次印刷

开 本：710×1000 1/16 印 张：52

字 数：580 千字

定 价：360.00 元（全四卷）

版权所有 翻印必究

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

编写范例

1、本书收载《中华人民共和国药典》（2015年版，以下简称《药典》）中以植物为基源的药材400种，依笔画顺序编排。

2、每种药物的内容文字说明均按以下顺序编排


[1] **【来源】**说明基源植物的名称及所属的科名，以及该植物的入药部位。

[2] **【原植物】**原植物的拉丁学名使用《药典》2015年版的记述，有些学名与《Flora of China》，《中国植物志》，《中国高等植物图鉴》等不一致，本书则在〔附注〕或〔混伪品〕中另有介绍，植物别名仅收载常用的名称，本项还记述植物的形态特征、花果期。

[3] **【生境分布】**记述该物种的生长环境和分布地区。

[4] **【采收加工】**记述该药材的采收时间和产地的加工方法。

[5] **【药材性状】**记述药材的形态特征，力求对多基源的药材分别叙述，如药材麻黄来源于草麻黄、中麻黄及木贼麻黄的地上部分，本书在**【药材性状】**项下分别记述基源为草麻黄、中麻黄及木贼麻黄的麻黄性状。



[6] **【炮制与饮片】**依《药典》2015 版描述，按净制、切制、炮炙工艺描述。

[7] **【性味功能】**记述该药的性味和功能。

[8] **【主治用法】**记述该药物的主要途。

[9] **【混伪品】**及**【附注】**凡是与《药典》2015 年版中规定不符的均列在此项下，包括物种混乱、药用部位混乱、地方习惯用药、有意造假等。

3、图片为便于读者使用，本书配有丰富的图片，包括原植物、原药材及饮片图。图注括号内容说明该药材的基源植物，如“秦艽药材（粗茎秦艽）”指基原植物为粗茎秦艽的秦艽药材、“秦艽药材（麻花秦艽）”指基原植物为麻花秦艽的秦艽药材。

本书的出版得到中国医学科学院医学与健康科技创新工程（编号 2016-12M-2-003）、学科建设专项建设项目“国家药用植物园体系中医药文化传承建设”（清华 211-201920100902）以及国家科技基础资源调查专项（编号 2018FY100700）的支持，在此表示感谢。

目 录

丁香; 母丁香·····	1	千金子·····	63
八角茴香·····	3	川木香·····	65
人参·····	5	川木通·····	68
九里香·····	8	川贝母·····	72
刀豆·····	10	川牛膝·····	78
三七·····	12	川乌; 制川乌·····	80
三白草·····	14	川芎·····	83
三棱·····	16	川射干·····	85
干姜·····	18	川楝子·····	87
土木香·····	20	广枣·····	89
土贝母·····	22	广藿香·····	90
土荆皮·····	24	女贞子·····	92
土茯苓·····	26	小茴香·····	94
大血藤·····	28	小通草·····	96
大青叶·····	30	小蓟·····	100
大黄·····	32	马齿苋·····	102
大蓟·····	34	马钱子·····	104
大枣·····	36	马兜铃·····	106
大腹皮·····	38	马鞭草·····	110
山麦冬·····	40	王不留行·····	112
山豆根·····	43	天仙子·····	114
山茱萸·····	45	天仙藤·····	115
山药·····	47	天门冬·····	116
山柰·····	50	天花粉·····	118
山银花·····	52	天麻·····	120
山楂·····	56	天葵子·····	123
山慈菇·····	59	木瓜·····	125
千年健·····	61	木香·····	127

木贼·····	130	北豆根·····	213
木通·····	133	北沙参·····	214
木蝴蝶·····	135	生姜·····	216
木鳖子·····	137	仙茅·····	217
五加皮·····	139	仙鹤草·····	219
五味子·····	142	白及·····	221
五倍子·····	144	白术·····	224
太子参·····	147	白头翁·····	226
车前子·····	149	白芍·····	228
牛蒡子·····	152	白芷·····	230
牛膝·····	154	白附子·····	232
升麻·····	157	白茅根·····	235
片姜黄·····	161	白果·····	237
化橘红·····	162	白前·····	239
月季花·····	165	白扁豆·····	242
丹参·····	167	白蔹·····	244
乌药·····	170	白鲜皮·····	246
乌梅·····	172	白薇·····	248
火麻仁·····	174	瓜蒌·····	252
巴豆·····	176	瓜蒌子·····	254
巴戟天·····	178	瓜蒌皮·····	256
水红花子·····	180	冬瓜皮·····	258
功劳木·····	182	冬虫夏草·····	259
甘松·····	184	玄参·····	261
甘草·····	186	冬凌草·····	263
甘遂·····	190	半边莲·····	264
艾叶·····	192	半枝莲·····	265
石斛·····	194	半夏; 法半夏·····	267
玉竹·····	199	丝瓜络·····	270
石韦·····	202	老鹳草·····	272
石菖蒲·····	205	地肤子·····	276
龙胆·····	207	地骨皮·····	278
龙眼肉·····	211	地黄; 熟地黄·····	280
平贝母·····	212	地榆·····	282

地锦草·····	285	苏木·····	363
亚麻子·····	287	杜仲·····	365
西红花·····	289	巫山淫羊藿·····	367
西洋参·····	291	豆蔻·····	369
百合·····	293	两面针·····	372
百部·····	297	连钱草·····	374
当归·····	300	连翘·····	376
肉豆蔻·····	303	吴茱萸·····	379
肉苁蓉·····	305	牡丹皮·····	381
肉桂·····	307	何首乌; 制何首乌·····	384
竹节参·····	309	伸筋草·····	387
延胡索·····	311	佛手·····	389
合欢皮·····	313	皂角刺·····	391
合欢花·····	315	余甘子·····	393
决明子·····	316	谷芽·····	395
关黄柏·····	319	谷精草·····	397
灯心草·····	321	辛夷·····	399
防己·····	323	羌活·····	403
防风·····	326	沙苑子·····	405
红豆蔻·····	328	忍冬藤·····	407
红花·····	330	鸡血藤·····	408
红芪; 炙红芪·····	332	鸡骨草·····	410
麦冬·····	334	鸡冠花·····	412
麦芽·····	336	玫瑰花·····	414
远志·····	337	青风藤·····	416
赤小豆·····	340	青皮·····	418
赤芍·····	342	青果·····	420
芫花·····	345	青箱子·····	422
花椒·····	347	青蒿·····	424
芥子·····	351	板蓝根·····	425
苍术·····	354	苦木·····	427
苍耳子·····	357	苦地丁·····	429
芡实·····	359	苦杏仁·····	431
芦根·····	361	苦参·····	434

苦楝皮·····	436	茜草·····	508
苘麻子·····	438	澄茄子·····	510
枇杷叶·····	440	草乌; 制草乌·····	511
松花粉·····	442	草豆蔻·····	513
刺五加·····	444	草果·····	515
郁李仁·····	446	茵陈·····	517
郁金·····	451	茯苓·····	519
虎杖·····	456	菟蔚子·····	521
明党参·····	458	胡芦巴·····	523
罗布麻叶·····	460	胡椒·····	525
罗汉果·····	461	荔枝核·····	527
知母·····	463	南五味子·····	529
委陵菜·····	465	南板蓝根·····	531
垂盆草·····	467	枳壳·····	533
使君子·····	469	枳实·····	535
侧柏叶·····	471	柏子仁·····	538
佩兰·····	473	梔子; 焦梔子·····	539
金果榄·····	474	枸杞子·····	541
金佛草·····	476	枸骨叶·····	543
金荞麦·····	478	柿蒂·····	544
金钱草·····	479	威灵仙·····	545
金银花·····	482	厚朴·····	548
金樱子·····	484	砂仁·····	550
狗脊·····	486	牵牛子·····	554
肿节风·····	488	鸦胆子·····	556
鱼腥草·····	490	韭菜子·····	558
京大戟·····	492	骨碎补·····	559
闹羊花·····	494	钩藤·····	561
卷柏·····	496	香加皮·····	565
泽兰·····	498	香附·····	566
泽泻·····	500	香橼·····	568
细辛·····	502	香薷·····	570
荆芥·····	506	重楼·····	572

独活·····	576	粉草薺·····	641
胖大海·····	579	益母草·····	642
急性子·····	580	益智·····	644
前胡·····	581	拳参·····	646
首乌藤·····	583	浙贝母·····	649
姜黄·····	584	海金沙·····	651
洋金花·····	586	浮萍·····	653
穿心莲·····	588	预知子·····	655
络石藤·····	590	桑叶·····	658
秦艽·····	592	桑白皮·····	659
秦皮·····	595	桑枝·····	660
珠子参·····	598	桑寄生·····	661
桂枝·····	600	桑葚·····	663
桔梗·····	601	通草·····	664
桃仁·····	603	黄芩·····	666
胡桃仁·····	606	黄芪·····	668
莱菔子·····	608	黄连·····	671
莲子·····	610	黄柏·····	674
莲子心·····	611	黄精·····	676
莪术·····	612	菝葜·····	680
荷叶·····	614	菟丝子·····	682
夏天无·····	615	菊花·····	685
夏枯草·····	617	梅花·····	687
柴胡·····	619	常山·····	689
党参·····	622	野菊花·····	691
鸭跖草·····	625	蛇床子·····	693
铁皮石斛·····	627	银杏叶·····	694
积雪草·····	629	银柴胡·····	695
射干·····	631	猪牙皂·····	697
徐长卿·····	633	猪苓·····	699
凌霄花·····	635	猫爪草·····	700
高良姜·····	637	旋覆花·····	701
粉葛·····	639	麻黄·····	704

麻黄根·····	707	槐角·····	764
鹿衔草·····	708	路路通·····	766
商陆·····	710	锦灯笼·····	768
淫羊藿·····	712	满山红·····	770
淡竹叶·····	717	蔓荆子·····	771
密蒙花·····	718	蓼大青叶·····	774
川续断·····	720	槟榔·····	776
贯众·····	723	榧子·····	778
绵萆薢·····	727	酸枣仁·····	780
款冬·····	729	豨莶草·····	782
葛根·····	731	罂粟壳·····	785
葶苈子·····	733	漏芦·····	787
篇蓄·····	735	槲寄生·····	789
楮实子·····	736	墨旱莲·····	791
棕板·····	738	稻芽·····	793
紫花地丁·····	740	橘核·····	795
紫苏子·····	742	橘红·····	796
紫苏叶·····	744	鹤虱·····	797
紫苏梗·····	745	薤白·····	798
紫菀·····	746	薏苡仁·····	800
黑芝麻·····	748	薄荷·····	802
鹅不食草·····	749	颠茄·····	804
湖北贝母·····	751	藏菖蒲·····	805
蓖麻子·····	753	藁本·····	807
蒺藜·····	755	檀香·····	810
蒲公英·····	756	藕节·····	812
蒲黄·····	758	覆盆子·····	813
椿皮·····	760	瞿麦·····	814
槐花·····	762		

沙苑子 Shayuanzi

【来源】沙苑子为豆科 (Leguminosae) 植物扁茎黄芪的种子。

【原植物】扁茎黄芪 *Astragalus complanatus* R. Br. ex Bunge. 别名：蔓黄芪。

多年生草本，高 30 ~ 100cm。根粗壮，暗褐色，全体疏生柔毛。茎稍扁，多分枝，基部倾斜。羽状复叶互生；叶柄短；托叶小，狭披针形；小叶 9 ~ 21，椭圆形，长 0.7 ~ 2cm，宽 3 ~ 8mm，先端钝或微缺，有小尖，基部圆形，全缘。总状花序腋生，有花 3 ~ 9 朵；花萼钟状，萼齿 5，披针形，与萼筒等长，萼下有线形小苞片 2；花冠蝶形，旗瓣近圆形，先端凹，基部有短爪，翼瓣稍短，龙骨瓣与旗瓣等长；雄蕊 10，9 枚合生，1 枚分离；雄蕊较雌蕊短；子房上位，密生白色柔毛；花柱无毛，柱头有髯毛。荚果纺锤形，稍膨胀，长 2.5 ~ 3.5cm，先端有喙，背腹稍扁，疏生短毛。种子 20 ~ 30 粒，圆肾形。花期 8 ~ 9 月。果期 9 ~ 10 月。



扁茎黄芪花枝



扁茎黄芪果枝

【生境分布】生于路边潮湿处、阳坡或灌丛中，分布于东北、华北及陕西、宁夏、甘肃等省区。

【采收加工】秋末冬初果实成熟尚未开裂时，连茎割下，晒干打下种子，除去杂质，

晒干。


【药材性状】 种子扁圆形或肾形，长2~2.5mm，宽1.5~2mm，厚约1mm。灰褐色或绿褐色，光滑，腹面凹陷处有种脐。质坚硬，子叶2枚，淡黄色及弯曲胚根。气微弱，味淡，嚼之有豆腥气。

【炮制及饮片】 沙苑子 除去杂质，洗净，干燥。

盐沙苑子 取净沙苑子，加盐水拌匀，闷透，置锅内，以文火加热，炒干，取出，放凉。每100kg净沙苑子用食盐2kg。

【性味功能】 味甘、性温。有补肾，固精，缩尿，养肝明目的功能。

【主治用法】 用于头晕目昏，肾虚腰痛，遗精早泄，白浊带下，遗尿尿频，小便余沥，尿血，痔漏等症。用量6~9g。



沙苑子(左)，盐沙苑子(右)

【混伪品】

华黄芪 *Astragalus chinensis* 的果实在少数地区混充沙苑子入药。

华黄芪与扁茎黄芪相似，主要区别为：茎直立，有棱。小叶21~31，椭圆形或卵状椭圆形，长1.2~2.5cm，宽0.5~0.9cm。荚果椭圆形，有密横纹，膨胀，长1~1.5cm，宽0.8~1cm，无毛，成熟开裂。种子10~12，肾形，花期5~6月。果期7~8月。

种子为较规则的肾形，饱满，长2~2.5mm，宽1.8~2mm，厚1mm。暗绿色或棕绿色，中央凹陷处有种脐。质坚硬。气微，味淡。



华黄芪

忍冬藤 Rendongteng

【来源】忍冬藤为忍冬科 (Caprifoliaceae) 植物忍冬的干燥茎枝。

【原植物】忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 参见“金银花”项。



忍冬果枝



忍冬花枝

【生境分布】生于山坡灌丛或疏林中、田埂、路边等处。分布于全国大部分省区。

【采收加工】秋、冬二季采割，晒干。

【药材性状】呈长圆柱形，多分枝，常缠绕成束，直径 1.5 ~ 6mm。表面棕红色至暗棕色，有的灰绿色，光滑或被茸毛；外皮易剥落。枝上多节，节间长 6 ~ 9cm，有残叶及叶痕。质脆，易折断，断面黄白色，中空。无臭，老枝味微苦，嫩枝味淡。

【炮制及饮片】除去杂质，洗净，闷润，切段，干燥。

【性味功能】味甘，性寒。有清热解毒，疏风通络的功能。

【主治用法】用于温病发热，热毒血痢，痈肿疮疡，风湿热痹，关节红肿热痛。
用量 9 ~ 30g。



忍冬藤药材



忍冬藤饮片

鸡血藤 Jixueteng

【来源】 鸡血藤为豆科 (Leguminosae) 植物密花豆的干燥藤茎。

【原植物】 密花豆 *Spatholobus suberectus* Dunn 别名：血藤，猪血藤、血龙藤。

攀援木质大藤本，长可达 20 ~ 30m。枝圆柱形，灰绿色，老茎扁圆柱形，灰棕褐色，砍断后有鲜红色汁液流出。叶互生，近革质，叶柄较长，小叶 3，小叶柄上面有一条纵槽，被疏短毛；顶生小叶片阔椭圆形，长 12.5 ~ 22cm，宽 7.5 ~ 15cm，先端短渐尖，基部圆楔形，全缘，上面绿色，下面淡绿色，侧生小叶偏斜卵形。圆锥花序生于枝顶的叶腋内，花萼筒状，萼片 5，二唇形，肉质，上面 2 萼齿合生，两面均被淡黄色短柔毛；蝶形花冠黄白色，旗瓣肉质，近圆形，长约 8mm，具爪，无耳；翼瓣同龙骨瓣，长约 7mm，具爪及耳；雄蕊 10，合生成二组，长约 1cm；花柱稍向上弯，长约 4mm，柱头小，头状，子房上位，密被白色短毛，长约 5mm。荚果扁平，长 8 ~ 11cm，顶端圆形。花期 7 月，果期 8 ~ 10 月。



【生境分布】 生于林中、灌丛中或山谷林中。分布于福建、广东、广西、云南、贵州等省、自治区。

【采收加工】 秋、冬二季采收藤茎，除去枝叶，切片或切成短段，晒干。

【药材性状】 鸡血藤茎扁平板状圆形或圆柱形，多切成椭圆、长圆形或不规则的斜切片，厚0.2～3cm。栓皮灰棕色，有灰白色斑块，栓皮脱落处显红棕色。横切面韧皮部与木质部相间排列，呈3～8个偏心性环。韧皮部有红棕色至黑棕色的树脂分泌物，木部红棕色或棕色，有多数导管形成小孔；髓部偏向一侧。质坚硬。气微，味涩。

【炮制及饮片】 除去杂质，洗净，润透，切碎，晒干。

【性味功能】 味苦、甘，性温。有补血，活血，通络的功能。

【主治用法】 用于月经不调，血虚萎黄，麻木瘫痪，风湿痹痛。用量9～15g。



鸡血藤药材



鸡血藤饮片

【混伪品】

本品易与大血藤科植物大血藤 *Sargentodoxa cuneata* 混淆。参见“大血藤”项。



大血藤鲜茎切面