

钦察汗国

元代子部書一卷

元代

史料刊
叢編
初編

泰山書社



元代子部書 一卷

元

代

史料
叢刊
初編

黃山書社

人參羌活散治疹豆因多服熱藥發而不透身體頭面
兩目皆腫連日風搐奮身硬直

方見前

香葛湯治時令不正發為疹瘡解腸胃中一切熱毒皆

可服之

方見大方科傷寒類

三豆飲治天行疹豆活血解毒或覺鄉中有此證預防
之則不染

赤小豆

黑豆

綠豆

各一升

甘草

半兩

右淘淨水煮熟逐日空心任意服已染則輕解未染

服之七日不發

發出紫草飲治豆瘡欲發未發或未透者

紫草

北芍藥

去蘆

麻黃

去節

當歸

甘草

各等分

右剉散每服二錢水一盞煎不拘時服

加味四聖散治瘡豆出不快及變陷倒靨小便赤澁餘

熱不除一切惡候或被風吹復不見入皮膚內者

紫草茸

木通

去皮節

南木香

黃耆

炒

川芎

甘草

人參

各等分

蟬退

去足
翼十

箇

右剉散每服二錢水一盞煎不拘時候溫服大便秘
加枳殼少許大便如常加糯米百粒性解毒能釀而
發之

紫草木香湯治瘡出不快大便泄利

紫草

木香

茯苓

白朮

甘草

炒
各等分

右剉散每服二錢水一盞糯米三十粒煎溫服蓋紫
草能利大便木香白朮所以佐之也

紫草木通湯治瘡疹出不快

紫草

人參

去蘆

木通

去皮節

茯苓

糯米

各等分

甘草

減半

右剉散每服二錢水一盞煎溫服大便利者可入南

木香去紫草

快斑散治豆瘡出不快

紫草

蟬退

去足翼及土

人參

白芍藥

各一

分

木通

一錢

甘草

炙半錢

右剉散每服二錢水一盞煎溫服

人參羌活散治同上

前方見前

活血散治豆瘡已出未出煩燥大人同

北白芍藥

不以多少

右為末白湯調下大能活血止豆瘡脹痛屢用屢效

薑附湯治四肢冷極疹瘡黯色不發或泄瀉不止身熱

欽定四庫全書

世醫得效方

重者不宜服

方見大方
科中寒類

黃芩甘草湯治挾熱作疹瘡不出煩燥不得服

黃芩

七錢半

赤芍藥

甘草

各五錢

右剉散每服三錢水一盞煎溫服若胃中虛冷其人

能食飲水即噦脉浮發熱口鼻中燥或衄加大棗一

枚嘔者加半夏少許生薑三片煎食少者加人參紅

棗煎量大小加減服

萬金散治瘡疹已出未能勻徧色不紅潤

防風 三錢

人參

蟬退 各二錢

右為末蘿蔔煎湯調下服了急用芥子末白湯調如膏塗兒脚心乾即再傳其毒漸漸復出瘡疹依前紅活

又方治瘡疹出不透腹痛甚或黑靨者

右以蟬退二十五箇去足翼洗淨為末每服一錢熟水調下腹痛立止而出透神效乳母亦可服一錢

又方用乾山楂子為細末湯點服立見出透紅活荔枝

殼煎湯溫服亦效

發脹調解散治瘡豆已發或為風冷所折榮衛不和或為宿食所傷內氣壅遏以致冰硬並主之

青皮 去白

陳皮 去白

桔梗 去蘆

枳殼 去穰

當歸 去尾

半夏 湯洗

川芎

木通 去皮節

乾葛

甘草

紫蘇

紫草 各等分

人參 減半

右剉散每服二錢薑二片棗一枝煎服未效加楂根

三寸

藿香正氣散治疹瘡根脚白色冰粗頂淡紅色而不發

加川芎若惡寒加官桂

方見大方
科傷寒類

龍腦膏子治時疾豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂燥氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不爾毒入臟必死

生龍腦

一錢

右研細旋滴猪心血和圓如小指頭大每服一圓心

順狂燥者用紫草湯化下若瘡子陷伏者溫酒化下
少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息取安或祇
用猪尾血亦可

救陷加味宜風散治腎虛證疹瘡變黑

雞心檳榔 一箇

陳皮 去白

青皮 去穰

甘草 炙各
錢半

黑牽牛 二兩
半生半炒熟

右為末蜜湯調下氣怯者加南木香一錢先下黑糞
次下楮糞後以四君子湯加厚朴木香陳米湯服和

胃良冬糞黃瘡自微出又以葫荈煎酒傳其身即發起

獨聖散治疹瘡陷入不發黑色而氣欲絕服此漸蘇紅潤

穿山甲

湯洗淨炒
令焦黃

右為末每服半錢入麝香少許南木香煎湯調下或紫草煎湯入紅酒少許服

五福化毒丹減毒

方見
後

人齒散治瘡豆初出光壯忽然黑陷心煩性躁氣喘妄
語或見鬼神並宜速治不然毒氣入臟必死

人齒 燒存性

右為末每箇作一服酒調下

靈破酒治疹瘡黑陷不起以好酒磨化三五粒服效
民望方治瘡疹漸黑面陷大便不固乳母同服亦可

人參

白朮

肉豆蔻

麵裹煨

白茯苓

黃耆 各半兩

甘草 二錢半

右劉散每服一錢水一盞薑二片棗一枚煎五分乳
母倍之若大瀉手足厥冷詳病加炮附子入

催乾犀角地黃湯瘡疹出大盛者以此解之

芍藥

生地黃

牡丹

犀角屑

無以

升麻代之

右劉散每服二錢水一盞煎溫服欲乾犀角飲

後方見

小驚圓

前方見

如聖湯治疹瘡毒攻咽喉腫痛

桔梗

甘草

牛蒡子

炒各一分

麥門冬

去心

一錢半

右為末每服一錢沸湯點服入竹葉煎尤妙

護眼神應膏治疹瘡正發時可用以防豆花入眼生翳

黃蘗 一兩

真綠豆粉 兩半

甘草 四兩

紅花 二兩

右為末生清油調塗兩眼四畔用之瘡豆面上亦少

或但用乾胭脂塗抹亦可

加減四物湯治斑瘡入目或瘡豆收後

當歸尾

芍藥

川芎

蒼朮

白菊花

乾葛

羌活

各等分

右剉散每服二錢水一盞入生地黃少許槌碎同煎
半盞量兒大小服之乳食後服忌一切動風毒物雖
愈後忌三二月日方可

蟬菊散治斑瘡入目或病後生翳障

蟬退

淨洗
去塵土

白菊花

各等分

右剉散每服二錢水一盞入蜜少許煎乳食後量兒