


路麗明
編

民國時期醫藥衛生文獻集成
28



上海科學技術文獻出版社



路麗明 編

民國時期醫藥衛生文獻集成

第二十八冊

 上海科學技術文獻出版社

第二十八冊目錄

天花	王光宇著 湘雅醫科大學民國十八年（一九二九）鉛印本	一
預防天花	中央防疫處編 中央防疫處民國間鉛印本	三一
四川鼠患及肅清方法	曾省等著 四川地方實際問題研究會民國二十九年（一九四〇）鉛印本	六一
鼠疫概要	俞松筠、祝紹煌著 商務印書館民國三十一年（一九四二）鉛印本	八七
猩紅熱	胡定安編 商務印書館民國二十三年（一九三四）鉛印本	一三七
危險的猩紅熱	東北行政委員會衛生部編 東北書店民國三十七年（一九四八）鉛印本	一七五
腦膜炎及其預防方法	內政部衛生署編 內政部衛生署民國二十一年（一九三二）鉛印本	二〇五
結核病預防法	朱燁著 世界書局民國三十七年（一九四八）鉛印本	二一七
可怕的蠅	陸衣言、蔣鏡芙編 中華書局民國三十三年（一九四四）鉛印本	二七七
種痘章程	民國二十八年（一九三九）鉛印本	三〇五
種痘與痘苗	衛生部中央防疫處編 衛生部中央防疫處民國間鉛印本	三一
種牛痘	教育部通俗教育研究會編 教育部通俗教育研究會民國間鉛印本	三二五
香山慈幼院學生腸內寄生蟲及血液檢查成績	洪式閻等著 民國十三年（一九二四）鉛印本	三四三

醫藥常識叢刊第二種

天花

湘雅醫科大學發行

醫藥常識叢刊總敘

佛說以疾病標爲八苦，醫藥列於五明。人生百年，蓋無有不與疾病醫藥爲緣者。故具足醫藥常識，實爲人生切要之圖。唐王勃嘗謂人子不可不知醫。見新唐書卷二百零一王勃傳。擴而言之，人人均應具此常識，豈獨人子爲然哉。

醫藥常識約可分爲二種。一爲預防疾病之常識，一爲治療疾病之常識。

疾病預防之重要，夫人皆已知之。在昔醫學樁昧，所謂預防之法，不過普通頤養而已。自細菌學免疫學次第成立，日有發明。知致病之原因不同，將防病之方各異。於是『預防醫學』，遂卓然獨立

以成科。預防疾病之方，亦愈精而益密。凡人於此，固應具有相當之常識，庶可於適當之時，在適當之地，施適當之法。疾病無緣而至，人人得遂其生。此預防常識之所以重要也。

若一旦疏於預防，發生疾病，則不得不有事於治療。醫師之賢愚，爲病人性命所繫。故治療之要，首在慎醫。苟得一良醫焉，針藥之，劑注之，然飲食起居，終在在需病人之合作。病人果能具有治療常識，則於慎醫之理，與夫合作之方，自能明辨而篤行，必可收指日霍然之效。論語曰，子之所慎齋戰疾。康子饋藥，則曰未達不敢嘗。夫齋所以交神明，戰所以存家國，而疾與乎其中。聖人慎疾慎醫之心，蓋可想見。欲求慎之道，始病不至張皇，已病知圖補救，此治療常識之所以重要也。

本校成立有年，規模粗具。自維職責，厥有二端。一則研精殫思，以探求高深之學理。一則宣傳醫藥常識，以促進社會之衛生。收效之宏，後者尤大。爰集同志，編輯叢刊。期以最淺顯之文詞，述最切要之常識。凡疾病預防治療之法，皆將分編別類，次第述陳，而於其原理，尤三致意。蘄使讀者知其當然之方，並明其所以然之理。庶於養生慎疾之道，或亦不無小補與。

中華民國十八年十月十日 永新王光宇敍

天花目錄

第一章	天花之歷史……………	一
第二章	天花之定義……………	三
第三章	天花之原因……………	四
第四章	天花之傳染徑路……………	六
第五章	天花之經過……………	七
第六章	天花之症狀……………	九
第七章	天花之種類……………	一〇
第一節	普通天花……………	一〇
第二節	融合性天花……………	一三
目 錄		一

目 錄

二

第三節	出血性天花·····	一四
第四節	假天花·····	一六
第八章	天花之合併症·····	一六
第九章	天花之豫後·····	一七
第十章	天花病人之處置法·····	一八

天花

永新王光宇箸

第一章 天花之歷史

天花這種病我國在古時候就有的。晉葛洪肘後備急方上面叫做虜瘡。隋巢元方諸病源候論，及唐孫思邈千金要方上面叫做豌豆瘡，宋陳言三因極一病證方論上面叫做天行痘瘡。昔人相傳說後漢馬援征伐武陵蠻的時候，士兵都生瘡病，就是這類的天花病。但是『後漢書』上却並沒有載記。我國書籍上載記天花這種病，最早的要算晉葛洪肘後備急方。唐王燾『外臺秘要』引『肘後備急方』說：『比歲有病，天行發斑瘡，頭面及身，須臾周匝，狀如火瘡，皆載

白漿，劇者數日必死，此惡毒之氣也。世人以建武中，於南陽擊虜所得，仍呼虜瘡』。有些人因爲後漢光武帝的年號是建武，誤認肘後備急方裏頭所說的建武，是指光武帝的時候。於是就以爲天花這種病，是後漢馬援征伐武陵蠻傳染得來的。殊不知肘後備急方是東晉時候葛洪所著的。據其所說比歲有病這句話，大約看來，天花必起於東晉時候。晉元帝的年號也叫建武，葛洪肘後方所稱的建武，大約是晉元帝的年號，並不是後漢光武帝的年號。

天花在從前的時候是極危險最可怕的疾患。在那時候沒有發明預防的法子，所以每年由此病而致死的，總有數百千萬人。即或僥倖免死的，他們的面容每每變了極醜的形狀，以至終生不能再恢復。自從近世『牛痘接種法』發明以後，天花的流行就極少了。凡屬

種過牛痘的人，都具有抵抗天花之能力。但也有些人，或者偶然沒有種得十分如法的，或者種過一次以後沒有再種的，如果不幸得着天花病的時候，那種症狀也必極輕，絕無什麼危險。大約種牛痘一次的防護力可支持四五年，人民注意種牛痘的國家，天花病必稀少。就是仍有此病流行，必定是從不喜歡種牛痘地方的人傳染來的。

假若各國的人民能夠兩三年種牛痘一次，則天花病在全世界上必定完全消滅。瑞士國雖然舉行慈善事業比別的國早些，然而不講究種牛痘，所以變成天花發源地。凡屬人民不喜歡種牛痘的地方，天花流行必盛，死亡的也就多了，遇着這種人民，就非用強制的種痘法不可。

第二章 天花之定義

天花是一種急性傳染病。患這種病的病人，皮膚上必定要發疹。起初是蕾疹，漸漸就變成水疱，漸漸又變成膿疱，最後膿疱漸漸乾固而結成痂皮。

除了這發疹以外，還有種種全身的症狀，如發熱等。

第三章 天花之原因

本病的病原是細菌或是原動物，至今猶未能確定。但是牠的原因為一種外來的病毒，却是可確定的。這種病毒多存在痘疱內容物裏頭。水疱的內容物含有病毒，膿疱的內容物也含有病毒。就是痘疱乾固以後，剝脫的痂皮，也含有病毒，有傳播本病的力量。大凡病人的分泌物和排泄物，如果含有痘疱內容物的，都可以傳播本病。病人血液內和皮膚面上，時常也有這種病毒的存在。

本病的病毒，抵抗力很大，生存的時間很久，就是遇見日光和

本病的病毒，抵抗力很大，生存的時間很久，就是遇見日光和乾燥，也不容易死滅。

有天花病的人，不但在膿疱期及結痂期有傳染性，就是在潛伏期和初期，都能將本病傳染於人。

凡未經種牛痘的人，最易傳染這種病毒。妊婦及產婦也容易感受此病，小兒比較尤其容易些。不過在已得麻疹，猩紅熱，及傷寒等病期間內，染天花病的很少。如若上述各病好了之後，仍可傳染本病。

凡曾患本病一次的人，可有十年以上的免疫力。就是說，在病後十年以內，不致再得本病。也偶然有人一生一世連着患本病七八次的，但是極少見。