

第二版

XINBIAN ZHONGCAOYAO  
SHIBIE YU YINGYONG CAISE TUPU

# 新编中草药 识别与应用彩色图谱

■ 潘超美 主编



全国百佳图书出版单位  
中国中医药出版社



XINBIAN ZHONGCAOYAO  
SHIBIE YU YINGYONG CAISE TUPU

# 新编中草药 识别与应用彩色图谱

(第二版)

主 编 潘超美  
编 委 赖珍珍 夏 静 梁钻姬 郑芳昊  
吴 波 刘 欣 黄崇才 黄昌杰  
摄 影 潘超美 (署名的图片除外)



中国中医药出版社  
北 京

图书在版编目 ( CIP ) 数据

新编中草药识别与应用彩色图谱 / 潘超美主编. —2版. —北京 :  
中国中医药出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5132-2253-2

I . ①新… II . ①潘… III . ①中草药-图谱 IV . ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字 ( 2014 ) 第313145号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦16层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

廊坊成基包装装潢有限公司印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880 × 1230 1/32 印张 18.875 字数 652千字

2015年4月第2版 2015年4月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-2253-2

\*

定价 69.00元

网址 [www.cptcm.com](http://www.cptcm.com)

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 [csln.net/qksd/](http://csln.net/qksd/)

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

# 编写说明

1. 本书共收集了临床上治疗常见病症广泛应用的中草药300种,以《中华人民共和国药典》以及全国中医药类高等院校规划教材《中药学》列出的常见中药为主,加入部分现代临床广泛应用的天然植物药。依据功效进行归类,分为解表药、清热药、泻下药、祛风湿药、化湿药、利水渗湿药、温里药、理气药、消食药、驱虫药、止血药、活血化瘀药、化痰止咳平喘药、安神药、平肝息风药、补虚药、收涩药十七类。

2. 每种植物药分为文字和彩色照片两部分,以《中国药典》《中药大辞典》的药名为正名。文字内容包括中草药中文名称、别名、基原植物中文名和拉丁名、原植物识别特征、药材性状特征、性味与功用、常见病配伍、验方精选、使用禁忌和其他功用等,着重描述性状特征。每种药最多只列举3个常见的别名,植物形态特征、性味功效及应用等内容的编写主要参考《中华人民共和国药典》《中药大辞典》《中国高等植物图鉴》《中国植物志》《全国中草药汇编》等。

3. 每个品种配原植物图和饮片图者,不再单独标注,其余需特别说明者彩图下加文字图注。

4. 凡有毒植物药,不论毒性大小,均在性味功效中注明“有毒”二字,无毒性的植物药则不再标明“无毒”。

5. 性味功效包括了性味、功效、用法和用量。用量为成人的一日量。应用时须根据具体情况灵活掌握,对有毒性药尤其要慎重。

6. 本书后附有中草药的中文名称笔画索引和南北方常用中药基原对照表。

# 目 录

## 一、解表药

- |           |            |           |           |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 生姜 / 002  | 香薷 / 016   | 木贼 / 030  | 淡豆豉 / 044 |
| 西河柳 / 004 | 桂枝 / 018   | 牛蒡子 / 032 | 葛根 / 046  |
| 防风 / 006  | 麻黄 / 020   | 升麻 / 034  | 蔓荆子 / 048 |
| 苍耳子 / 008 | 葱白 / 022   | 柴胡 / 036  | 薄荷 / 050  |
| 辛夷 / 010  | 紫苏叶 / 024  | 桑叶 / 038  |           |
| 细辛 / 012  | 鹅不食草 / 026 | 浮萍 / 040  |           |
| 胡荽 / 014  | 藁本 / 028   | 菊花 / 042  |           |

## 二、清热药

- |           |             |            |            |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 天花粉 / 052 | 黄芩 / 082    | 连翘 / 112   | 拳参 / 142   |
| 决明子 / 054 | 黄连 / 084    | 青果 / 114   | 野菊花 / 144  |
| 芦根 / 056  | 土茯苓 / 086   | 苦瓜 / 116   | 绿豆 / 146   |
| 谷精草 / 058 | 大血藤 / 088   | 败酱 / 118   | 紫花地丁 / 148 |
| 青箱子 / 060 | 大青叶 / 090   | 委陵菜 / 120  | 蒲公英 / 150  |
| 知母 / 062  | 山豆根 / 092   | 金荞麦 / 122  | 锦灯笼 / 152  |
| 栀子 / 064  | 千里光 / 094   | 金银花 / 124  | 漏芦 / 154   |
| 夏枯草 / 066 | 马齿苋 / 096   | 鱼腥草 / 126  | 玄参 / 156   |
| 鸭跖草 / 068 | 木蝴蝶 / 098   | 绵马贯众 / 128 | 地黄 / 158   |
| 淡竹叶 / 070 | 四季青 / 100   | 南板蓝根 / 130 | 赤芍 / 160   |
| 密蒙花 / 072 | 白头翁 / 102   | 鸦胆子 / 132  | 牡丹皮 / 162  |
| 白鲜皮 / 074 | 白花蛇舌草 / 104 | 重楼 / 134   | 白薇 / 164   |
| 黄柏 / 076  | 白苣 / 106    | 穿心莲 / 136  | 青蒿 / 166   |
| 苦参 / 078  | 半边莲 / 108   | 积雪草 / 138  | 银柴胡 / 168  |
| 秦皮 / 080  | 地锦草 / 110   | 射干 / 140   |            |

## 三、泻下药

- |           |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 大黄 / 170  | 巴豆 / 176 | 郁李仁 / 182 | 商陆 / 188 |
| 千金子 / 172 | 甘遂 / 178 | 京大戟 / 184 |          |
| 火麻仁 / 174 | 芦荟 / 180 | 牵牛子 / 186 |          |

## 四、祛风湿药

- |           |            |           |           |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 丁公藤 / 190 | 路路通 / 203  | 络石藤 / 214 | 五加皮 / 226 |
| 木瓜 / 192  | 飞天螭蛸 / 205 | 秦艽 / 216  | 狗脊 / 228  |
| 伸筋草 / 195 | 丝瓜络 / 206  | 海桐皮 / 218 | 桑寄生 / 230 |
| 松节 / 197  | 老鹳草 / 208  | 雷公藤 / 220 | 鹿衔草 / 232 |
| 草乌 / 199  | 防己 / 210   | 豨莶草 / 222 | 落马衣 / 234 |
| 威灵仙 / 201 | 穿山龙 / 212  | 千年健 / 224 |           |

## 五、化湿药

红豆蔻 / 236  
苍术 / 238  
佩兰 / 240  
草豆蔻 / 242  
厚朴 / 244  
砂仁 / 246  
藿香 / 248

## 六、利水渗湿药

广金钱草 / 250  
车前草 / 252  
冬瓜皮 / 254  
玉米须 / 256  
田基黄 / 258  
石韦 / 260  
灯心草 / 262  
鸡骨草 / 264  
苘麻子 / 266  
虎杖 / 268  
垂盆草 / 270  
泽泻 / 272  
泽漆 / 274  
枳椇 / 276  
珍珠草 / 278  
茵陈 / 280  
荠菜 / 282  
香加皮 / 284  
海金沙 / 286  
篇蓄 / 288  
薏苡仁 / 290  
瞿麦 / 292

## 七、温里药

丁香 / 294  
八角茴香 / 296  
小茴香 / 298  
花椒 / 300  
荜茇 / 302  
荜澄茄 / 304  
胡椒 / 306  
高良姜 / 308

## 八、理气药

刀豆 / 310  
川楝子 / 312  
广陈皮 / 314  
天仙藤 / 316  
化橘红 / 318  
乌药 / 320  
佛手 / 322  
沉香 / 324  
青皮 / 326  
玫瑰花 / 328  
荔枝核 / 330  
柿蒂 / 332  
香附 / 334  
桂花 / 336  
檀香 / 338

## 九、消食药

山楂 / 340  
鸡屎藤 / 342  
莱菔子 / 344  
稻芽 / 346

## 十、驱虫药

土荆芥 / 348  
苦楝皮 / 350  
使君子 / 352  
南瓜子 / 354  
蛇床子 / 356  
榧子 / 358  
槟榔 / 360

## 十一、止血药

大蓟 / 362  
小蓟 / 364  
艾叶 / 366  
仙鹤草 / 368  
白及 / 370  
白茅根 / 372  
地榆 / 374  
羊蹄 / 376  
苈麻根 / 378  
降香 / 380  
茜草 / 382  
紫珠 / 384  
槐花 / 386  
蒲黄 / 388  
槲木 / 390

## 十二、活血化瘀药 / 392

儿茶 / 392  
川芎 / 394  
马钱子 / 396  
牛膝 / 398  
丹参 / 400  
北刘寄奴 / 402  
延胡索 / 404  
血竭 / 406

红花 / 408  
苏木 / 410  
连钱草 / 412

鸡血藤 / 414  
郁金 / 416  
泽兰 / 418

骨碎补 / 420  
姜黄 / 422  
莪术 / 424

桃仁 / 426  
凌霄花 / 428  
益母草 / 430

### 十三、化痰止咳平喘药

天南星 / 432  
白果 / 434  
白前 / 436  
半夏 / 438  
百部 / 440

竹茹 / 442  
皂荚 / 444  
枇杷叶 / 446  
罗汉果 / 448  
胡颓子叶 / 450

胖大海 / 452  
前胡 / 454  
洋金花 / 456  
桔梗 / 458  
黄药子 / 460

旋覆花 / 462  
紫菀 / 464  
矮地茶 / 466  
满山红 / 468

### 十四、安神药

合欢皮 / 470

远志 / 472

灵芝 / 474

柏子仁 / 476

### 十五、平肝息风药

刺蒺藜 / 478

罗布麻叶 / 480

钩藤 / 482

### 十六、补虚药

人参 / 484  
大枣 / 486  
山药 / 488  
女贞子 / 490  
天冬 / 492  
太子参 / 494  
巴戟天 / 496  
玉竹 / 498  
甘草 / 500  
龙眼肉 / 502

北沙参 / 504  
南沙参 / 506  
仙茅 / 508  
白术 / 510  
白扁豆 / 512  
冬虫夏草 / 514  
百合 / 516  
麦冬 / 518  
杜仲 / 520  
何首乌 / 522

沙棘 / 524  
补骨脂 / 526  
核桃仁 / 528  
枸杞子 / 530  
韭菜子 / 532  
绞股蓝 / 534  
党参 / 536  
铁皮石斛 / 538  
益智 / 540  
黄芪 / 542

黄精 / 544  
菟丝子 / 546  
银耳 / 548  
淫羊藿 / 550  
续断 / 552  
楮实子 / 554  
黑芝麻 / 556  
墨旱莲 / 558

### 十七、收涩药

山茱萸 / 560  
五味子 / 562  
乌梅 / 564  
石榴皮 / 566

肉豆蔻 / 568  
诃子 / 570  
鸡冠花 / 572  
金樱子 / 574

莲子 / 576  
椿皮 / 578

正别名索引 580

南北方常用中药基原对照表 592

新 编

# 中草药识别



# 应用彩色图谱



▼ 理气药

▼ 温里药

▼ 利水渗湿药

▼ 化湿药

▼ 祛风湿药

▼ 泻下药

▼ 清热药

▼ 解表药

▼ 收涩药

▼ 补虚药

▼ 平肝息风药

▼ 安神药

▼ 化痰止咳平喘药

▼ 活血化瘀药

▼ 止血药

▼ 驱虫药

▼ 消食药

# 一、解表药

## （一）发散风寒药

生姜



生姜

干姜



**【来源】**为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的新鲜根茎。

**【野外识别特征】**多年生草本，高50～80cm。根茎肥厚，断面黄白色，有浓烈的辛辣气味。叶互生，排成2列，无柄，有长鞘，抱茎；叶片披针形至线状披针形。花葶自根茎中抽出，长15～25cm；穗状花序椭圆形，长4～5cm；苞片淡绿色，边缘淡黄色，先端有小尖头；花冠黄绿色，裂片3，唇瓣的中间裂片较花冠裂片短，有紫色条纹和淡黄色斑点，两侧裂片黄绿色，具紫色边缘。蒴果3瓣裂，种子黑色。花期7～8月。我国中部、东南部至西南部各省有栽培。

**【药材性状】**呈不规则块状，略扁，具指状分枝。表面黄褐色或灰棕色，有环节，分枝顶端有茎痕或芽。质脆，易折断，断面浅黄色，内皮层环纹明显，维管束散在。气香特异，味辛辣。

**【性味功效】**辛，温。解表散寒，降逆止呕，化痰止咳，解诸毒。内服煎汤3～9g。

#### 【常见病配伍】

1. 外感风寒 常与桂枝配伍使用。
2. 胃寒呕吐 常与半夏配伍使用。
3. 风寒咳嗽 常与杏仁、紫苏、陈皮、半夏配伍使用。

#### 【验方精选】

1. 外感风寒，头痛发热，汗出恶风 生姜、桂枝、芍药各9g，甘草6g，大枣12枚。水煎服。
2. 胃寒呕吐 生姜18g，半夏15g。水煎服。
3. 风寒咳嗽 生姜、制半夏、苏叶、陈皮、前胡、杏仁、桔梗、茯苓、炙甘草各6g。水煎服。

**【其他功用】**干燥根茎（干姜）能温中散寒，回阳通脉，温肺化饮；根茎外皮（生姜皮）能行水消肿；茎叶（姜叶）能活血散结。

#### 【使用禁忌】

阴虚内热及实热证禁服。

# 西河柳




药材



药材



西河柳花



**【别名】** 三春柳、垂丝柳。

**【来源】** 为柽柳科植物柽柳 *Tamarix chinensis* Lour. 的嫩枝叶。

**【野外识别特征】** 灌木或小乔木，高3～6m。幼枝柔弱，开展而下垂，红紫色或暗紫色。叶鳞片状、钻形或卵状披针形，长1～3mm，半贴生，背面有龙骨状脊。每年开花2～3次；春季在去年生小枝上侧生总状花序，花稍大而稀疏；夏、秋季在当年生幼枝顶端形成总状花序组成顶生大型圆锥花序，常下弯，花略小而密生，花5数，粉红色。蒴果长约3.5mm，3瓣裂。花期4～9月，果期6～10月。常生于河流冲积地、海滨、滩头、潮湿盐碱地和沙荒地。野生于河北、辽宁、江苏、安徽、山东、河南等地；我国东部至西南部各地有栽培。

**【药材性状】** 枝细圆柱形，直径0.5～1.5mm，表面黄绿色，节较密，叶鳞片状，钻形或卵状披针形，长1～3mm，背面有龙骨状脊。质脆，易折断，断面黄白色，中心有髓。气微，味淡。

**【性味功效】** 甘、辛，平。疏风，解表，透疹，解毒。内服煎汤10～15g，外用适量，煎汤擦洗。

#### **【常见病配伍】**

1. 麻疹初期 常与牛蒡子、荆芥、蝉蜕等配伍使用。
2. 风寒痹痛 常与秦艽、独活等配伍使用。

#### **【验方精选】**

1. 麻疹透发不出 西河柳、玄参各6g，荆芥穗、干葛、炒牛蒡各4.5g，蝉蜕、薄荷、知母、甘草各3g，麦冬9g，淡竹叶5g。水煎服。
2. 风湿痹痛 西河柳、虎杖根、鸡血藤各30g。水煎服。
3. 痧疹发不出，喘嗽，烦闷，躁乱 西河柳叶12g，研末。以水调服。

#### **【使用禁忌】**

麻疹已透及体虚多汗者禁服。

# 防风



【别名】铜芸、回云、屏风。

【来源】为伞形科植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 的根。

【野外识别特征】多年生草本，高30~80cm。根粗壮，有分枝，淡红棕色，根头处密生纤维状叶柄残基及明显的环纹。茎单生，二歧分生。基生叶丛生，有扁长的叶柄，基部有宽叶鞘，稍抱茎；叶片长圆形，二至三回羽状分裂。复伞形花序多数，生于茎顶和分枝顶端。双悬果狭圆形。花期8~9月，果期9~10月。生于草原、丘陵和多石砾山坡上。分布于华北、东北及山东、陕西、甘肃、宁夏等地。

【药材性状】呈长圆锥形或长圆柱形，下部渐细。表面灰棕色，粗糙，有纵皱纹、多数横长皮孔及点状突起的细根痕。根头部有明显密集中环纹，有的环纹上残存棕褐色毛状叶基。体轻，质松，易折断，断面不平坦，皮部浅棕色，有裂隙，散生黄棕色油点，木部浅黄色。气特异，味微甘。

【性味功效】辛、甘，微温。祛风解表，胜湿止痛，止痉，止痒。内服煎汤4.5~9g。

#### 【常见病配伍】

1. 外感风寒 常与荆芥配伍使用。
2. 风热壅盛，表里俱实 常与荆芥、大黄、连翘等配伍使用。
3. 风寒湿痹 常与羌活、细辛、苍术等配伍使用。

#### 【验方精选】

1. 感冒、支气管炎、皮肤瘙痒 防风、荆芥、羌活、独活、柴胡、前胡、枳壳、茯苓、桔梗、川芎各5g，甘草3g。水煎服。
2. 偏头痛、习惯性便秘 防风、川芎、当归、芍药、大黄、薄荷叶、麻黄、连翘、芒硝各6g，黄芩、桔梗各12g，滑石20g，甘草10g，荆芥、白术、栀子各3g。水煎服。
3. 流行性感冒、风湿性关节炎 防风、苍术各6g，羌活10g，细辛2g，川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草各3g。水煎服。
4. 风痰壅盛之破伤风 防风、胆南星、白芷、天麻、羌活、白附子各6g。水煎服。

【其他功用】叶可用治中风热汗出；花可用治心腹痛，四肢拘急，行履不便，骨节间疼痛。

#### 【使用禁忌】

血虚发痉及阴虚火旺者慎服。

# 苍耳子



【别名】牛虱子、苍耳实、只刺。

【来源】为菊科植物苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. 的成熟带总苞的果实。

【野外识别特征】一年生草本，高20～90cm。全株被灰白色糙伏毛。叶互生；具长柄，叶片三角状卵形，近全缘，或有3～5不明显浅裂，基出三脉。头状花序近无柄，聚生，单性同株。瘦果2，倒卵形，包在有刺的总苞片内。花期7～8月，果期9～10月。生于丘陵、低地、荒野、路边、沟边、田边、草地等。分布于全国各地。

【药材性状】呈纺锤形或卵圆形，长1～1.5cm，直径0.4～0.7cm。表面黄棕色或黄绿色，全体有钩刺，顶端有2枚较粗的刺，分离或相连，基部有果梗痕。质硬而韧，横切面中央有纵隔膜，2室，各有1枚瘦果。瘦果略呈纺锤形，气微，味微苦。

【性味功效】苦、甘、辛，温，有毒。散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痒。内服煎汤3～9g。

#### 【常见病配伍】

1. 外感风寒 常与白芷、防风、羌活等配伍使用。
2. 风寒犯鼻致鼻渊 常与辛夷、白芷等配伍使用。
3. 风疹瘙痒、疥癣 常与地肤子、白鲜皮等配伍使用。

#### 【验方精选】

1. 风邪上攻之鼻渊、鼻塞 苍耳子5g，辛夷6g，白芷9g，薄荷叶3g。研末，每次6g，以茶调服。
2. 急性毛囊炎，急慢性湿疹 苍耳子120g，苦参、野菊花各60g。水煎，洗涤患处。
3. 阴囊湿疹 苍耳子、蛇床子、甘草各10g。水煎，外洗阴囊。

【其他功用】根可清热解毒，利湿；花可祛风散热，除湿解毒。

#### 【使用禁忌】

本品有毒，剂量过大可致中毒，故不宜过量服用。

# 辛夷

