

元代子部書 一卷

元

代

史料
叢刊
初編

黃山書社

浮椒丸治脾疼不可忍及療冷氣疼

陳菜萸 二兩

浮椒 即胡

蚌粉 炒赤色 各一兩

右為末醋糊圓如梧子大每服二十九丸用溫酒或鹽

湯下遇發時服甚者不過二三服立效

附朮湯治脾積氣婦人諸般氣痛

香附子 五兩炒去毛 赤色止

莪朮 醋煮

甘草 各二兩

右為末每服二錢入鹽少許百沸湯空心點服

九氣湯治心脾疼不可忍一九痛圓一服而止

與諸氣類神

欽定四庫全書

世醫得效方

九氣湯同一九
痛圓方見前

三和散治腹脹脾疼中滿痞悶不食大小便或澁加生

薑燈心縮砂仁煎服仍服理中湯半貼立效或加白茯

苓厚朴各二錢

方見諸氣及泄瀉類

神保丸治心氣築刺痛甚掃蒂燈心湯下

方見諸氣類

奪命抱刀散治男子婦人脾胃積冷中焦不和心下虛

痞腹中痛胸脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫

酸吞酸口苦無味不思飲食及婦人久患冷氣刺痛男

子或當空露卧感受風露之邪得心痛積年服之大效

乾薑

剉入巴豆半錢同炒至黑色去巴豆不用

良薑

入斑猫一百個同炒去斑猫各二兩

石菖蒲

二兩二錢
不見火

糯米

二兩半
炒

右為末每服二錢鹽少許沸湯點服不拘時或溫酒調尤佳一方以去殼巴豆炒蚌粉去巴豆加蚌粉入抽刀散內煎服若尋常氣痛不用巴豆只加炒蚌粉亦得或甚而心腹痛大便秘者巴豆同粉研爛同抽刀散醋糊丸服二三粒大腑通為度

參朮散治虛弱人脾疼

人參

白朮

去蘆炒

乾薑

炮

白豆蔻仁

砂仁

丁香

橘皮

甘草

畧炒

右等分剉散每服三錢薑三片煎取藥汁調炒過真

蚌粉一大錢并服

加味烏沈湯生氣補血心腎虛損之人服此勝大建中

湯

人參

當歸

大者去蘆

白朮

炒各一兩

沈香

半兩

天台烏藥

白茯苓

去皮

附子

煨去皮臍
各一兩

肉桂

去皮
半兩

右剉散每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎空心服

單方治苦熱食冰雪過多又頻飲冷漿積冷于中脾疼

半歲不愈

□椒

二十粒浸於漿水盆中一宿取出
還原水吞之其病即脫更不復作

大理中圓治因食水太過脾疼久不愈以水煎一二圓服立效又方治心脾氣痛加泡過茱萸三十粒入圓末

欽定四庫全書

世醫得效方

皆可

方見泄瀉類

神效散治遠年近日一切脾疼遇食冷物或天氣寒陰
冷便作胸間一點痛起或引入背脊痛不可忍服之即
絕根

南木香

青皮

陳皮

麥蘖

炒

大枳殼

炮

京三稜

蓬莪朮

神麩

炒

甘草

炙各二錢半

北白芍藥

川白芷

肉桂

去皮

玄胡索

破故紙

各二錢半

華澄茄

丁香

各一錢

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至七分空心服臨睡加鹽一捻再煎兩沸忌麪食豆腐一切生冷

茴薑湯治男子婦人一切心腹脹滿氣滯走痛神效

茴香 二兩半
青皮 一兩
良薑 一兩酒浸炒

九粒鹽湯吞下婦人當歸醋湯下空心服病甚者加至十五粒忌茶立效如神

竒方治中風牙已緊無門下藥

天南星末半錢白龍腦一字頻擦令熱牙自開

又治暗風倒地北細辛為末每挑一字搐鼻中

神應方治諸風癰久服其涎自大便中出生白礬一兩

研好臘茶半兩煉蜜為圓梧子大三十圓再用臘茶

湯下

烏蝎圓治手足拳攣痛不可忍者

乳香

沒藥

另研

地龍

去土

全蝎

去足翅

草烏

各五錢

烏藥

炒

麝香

一兩

蜈蚣 一條去足炒 川烏 二隻生用去皮尖

右為末麪糊圓梧桐子大每服七圓至十圓十五圓
用麝香少許好小酒送下空心服服至七日畧利至
半月或滿身發風丹經月方沒名服其病安全后常
用生川烏沒藥浸酒日二服通氣驢風湯加乳香沒
藥生川烏麝香少許酒調服不飲木瓜湯下服此忌
熱食一時

四神圓治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急

欽定四庫全書

世醫得效方

大天麻

大南星

各湯洗淨

防風

去蘆各一兩

薄荷葉

兩半

右為末酒煮薄麪糊圓菜豆大每服二十圓荆芥生

薑煎湯送下

腎瀝湯腎虛為厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯胣脚跛
蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利耳聾塞腰背相引

羊腎 一具

黃耆

芎藭

桂心

當歸

人參

防風

甘草

五味子

各一兩

玄參

芍藥

茯苓

各一兩
二錢半

磁石

一兩七錢

地骨皮

五錢

生薑

二兩

右剉散以水一斗煮羊腎取五升下諸藥取二升分

三服

缺

痛圓治中風癱瘓不遂手足躄曳口眼喎斜或

旋運僵卧涎潮搐搦卒中急風不省人事每服二十圓

黑豆淋酒下風虛眩冒項筋拘急太陽穴疼痛亦用生

地黃汁調酒下腰肢疼重行步艱辛筋脉攣促俛仰不

利賊風所中痛如錐刺皮膚頑厚麻痺不仁或血脉不

行肌拘乾瘦生葱酒下或生葱茶亦可風濕脚氣腿膝無力或腫或疼不能舉步兩脚生瘡膿血浸清痒痛無時愈而又發溫鹽酒下打撲閃肭筋骨內損已經多年每遇天寒時發疼痛沒藥酒下

乳香

川烏

沒藥

五靈脂

白膠香

地龍

白薑

半夏

五加皮

赤小豆

各等分

右為末糊圓隨證湯引如前並空心服

牛黃清心圓治諸風緩縱不曠語言蹇澁痰涎壅盛心
怔健忘或發顛狂並皆治之

白芍藥

一兩半

柴胡

去苗

桔梗

各一兩二錢半

甘草

剉炒五兩

乾山藥

麥門冬

去心

黃芩

各一兩半

食證二陳湯治胸腹脹滿因傷宿食或吐後噫敗卯氣

加丁香縮砂生薑七片烏梅一箇煎未效服治中湯治

同前兼療中寒飲食不化吞酸喎碗食則膨亨脹滿嘔

逆

欽定四庫全書

世醫得效方

人參

白朮

乾薑

炮

甘草

炙

青皮

陳皮

各等分

右剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓大便秘

入大黃棊子大兩枚

血證茯苓湯治憂怒並氣攻血溢停留胃管噯聞血腥

嘔吐食飲及妊娠中脘宿冷冷血侵脾惡聞食氣病名

惡阻

半夏

一兩湯洗七次

茯苓

熟地黃

各二兩

橘皮

細辛

人參

芍藥

川芎

各一兩
二錢

右剉散每服四大錢水二盞薑七片煎七分去滓空
腹服有客熱煩渴口瘡者去橘皮細辛加前胡知母
腹冷不利者去地黃入桂心炒胃中虛熱大便秘小
便澁去地黃加大黃一兩八錢黃芩六錢

當歸湯治三焦虛損或上下發泄唾血皆從三焦起或
因熱損發或因酒發主之