廈門大學

# 秘傳證治要訣卷之二

大醫院使戴元禮述

## 諸傷門

### 傷風寒 附感冒

凡看病不令染用雄黃末塗鼻孔及須知避忌行從客位邊入男子病穢氣出於口女子病穢氣出於陰坐立對語問宜識得尚書

傷風傷寒俗呼爲傷寒傳經分三陽三陰三陽是太陽陽明少陽經也三陰太陰少陰厥陰經也經之陰陽以臟腑言腑爲陽膀胱胃膽是也臟爲陰脾腎肝是也病之陰陽乃是外邪之陰陽陰氣陽氣是也陰陽二氣皆能犯臟腑故陽氣犯太陽則爲傷風惡風

而有汗陰氣犯太陽則爲傷寒惡寒而無汗在太陽未得解轉入陽明少陽二經則純乎陽不如太陽易其治若陽氣未能罷以次傳入陰經則爲陰中之陽蓋緣陽經之陽氣來入陰經雖有自利欲寐唇青手足厥冷舌卷囊縮等證不可妄投熱藥宜瀉其陽之在陰經也

若陽病下之太過陽氣已脫遂變爲陰所謂害熱未已寒病復起或初得病便是陰證此是陰中之陰蓋緣陰氣攻陰經陰自得傳非自傳諸陽經來只當以温藥回其陽故陽入陰者變陽以救陰陰入陽者

陽以救陽二者不可不辨

傷風傷寒初得病時俱見發熱頭疼體痛宜太陽經但傷風惡風有汗傷寒惡寒無汗並宜和解散苓芷香蘇散或養胃湯加草苓冬半錢熱服温覆若的是傷風有前自汗惡風等證可用桂枝湯令其熱服温覆喘加杏仁一錢咳加五味子一錢渴加參半錢外熱未止者敗毒散熱而有汗者敗毒散加桂枝半錢或陽旦湯嘔者不宜用桂枝湯合於本方加半夏一錢添姜煎此非合病之嘔係傷寒裸病即非正傷寒故可用也風寒二證理當發汗而其人虛不可汗者

宜桂枝湯加黃耆半錢若的是傷寒有前惡寒無汗等證可用五積散熱服厚被覆之取汗喘嗽者杏子湯加麻黃半錢欲汗而不得汗者再進已汗而身熱不退者參蘇飲或敗毒散加桂枝半錢嘔者養胃湯此非治合病之嘔若風寒俱傷或惡風而無汗或惡寒而無汗疑似之間只宜五積散半貼和敗毒散半貼名爲交加散喘嗽者小青龍湯有初得病太陽証具但寒而未即爲熱至二三日後方熱此傷於寒若傷風即有熱矣但寒未有熱者五積散發汗有已服解表藥不惡風不惡寒有証已罷於裏又未躁未渴

高安全本请访问 www.ertongbook.com

小便亦未赤大便如常獨身熱未除者宜香蘇飲
毒散小柴胡湯加桂枝半錢有已服解表藥証已罷
又無裏証其人體痛不減者恐是發汗多榮衛不和
所致宜小建中湯用半厚半薄之桂
若風寒二證傳經後身熱煩渴小便赤大便不通言
語不得睡不寧鼻乾頭目疼日晡增劇不惡寒反惡
熱舌上白胎中有斷文或黑胎方爲極熱甚則昏不
知人此屬陽明經宜大柴胡湯小承氣湯下之若具
諸証而大便自調者宜白虎湯少加小柴胡湯
若胸脇俱痛頭疼耳聾口苦或渴或嘔大小便或利

或不利往來寒熱如瘧此屬少陽証宜小柴胡湯噉加北五味子半錢渴甚加括樓根半錢不渴而外有熱者加桂枝半錢自汗而尚惡風者以小柴胡湯半貼加桂枝湯半貼

如婦人病中經水適來或經水失斷此為熱入血室其血必結故使往來如瘧晝則明了夜則讝語宜小柴胡湯或加生地黃半錢

若胸膈不快手足自温或自利而渴或腹滿時痛此屬太陰經或自利不渴宜理中湯重則加附子四逆湯此陰中之陰也腹滿而痛當得通塞宜桂枝湯加

芍藥即是小建中湯但湯厚桂爲桂枝耳不愈小柴胡湯去黃芩加芍藥一錢或枳芍各半錢腹痛甚大便不利者桂枝湯加大黃二錢臨熟入或大柴胡湯以諸實各痛當下此陰中之陽也

若兀兀欲吐心煩喜寐或自利口燥而渴或口中和而背惡寒此屬少陰經但少陰用藥有陰陽之分自利而渴者宜豬苓湯蓋陽熱傳入腎少陰經腎係舌本故自利口燥而渴以豬苓湯利腎中之熱不愈則當白大便去之古法合用大承氣湯若難用大承氣湯則用小承氣湯或且進白頭翁湯上項諸藥爲陰

中涵陽者也

泄利下重其人四逆先以水盞半葱白二根煎一盞去葱煎四逆散至七分咳加北五味子乾薑各半錢悸加桂枝一錢小便不利加茯苓一錢腹痛加熟附半錢

若審是下利清穀手足四逆其人面帶赤或腹痛或乾嘔或咽痛四逆湯倍乾薑面赤者加葱一根腹痛加芍藥一錢半嘔加生薑咽痛加桔梗一錢

若以中和而背惡寒宜正方四逆湯不必加減四逆散四逆湯俱治少陰不利四肢逆冷泄利下重者與

下利清穀者一涼一湯又自有陰有陽之別四逆散是治四逆陽症四逆湯是治四逆陰症

若初得病便見少陰証其人發熱惡寒身疼頭不痛者宜麻黃細辛附子湯微汗之或五積散加熟附半錢或五積散加以順元散若煩悶厥逆或舌捲囊縮或下利清穀裏寒外熱此屬厥陰經下利清穀者陰中之陰宜進通脉四逆湯或當歸四逆湯加生薑茱萸舌捲囊縮不特陰中之陰有之陽明之熱陷入厥陰亦有之蓋陽明主宗筋宗筋爲熱毒風所致故弗榮而急引舌與卵風以舌捲囊縮當瀉陽以救陰宜

大承　湯陽傳太陰而利故用小建中湯及小柴胡湯去黃芩加芍藥此一藥治太陰洩利腸鳴而痛已利而痛爲虛虛則腸鳴蓋爲傳陰之陽氣漸微不敢過用冷劑但以芍藥通壅耳

南陽謂傷寒手足必微冷若手足自温者係太陰也說欠分曉若陽明手足安得微冷少陽厥陰而大冷安得言微冷但當言三陰經少陰厥陰手足厥冷惟有太陰手足自温耳

凡渴問其所飲欲冷欲熱欲多欲少若飲多而欲冷者陽渴也更須審其有何證在經也其太陽證小便

不利而渴者五苓散其陽明證大便不利而渴者宜於前本經求之已利猶渴宜白虎湯其少陽證寒熱往來而渴者小柴胡湯去半夏加括蔞根如其數陰亦有自利而渴各已見本經但陰有渴古人多有冷劑以其皆挾陽氣耳經雖陰而病則陽也然亦有下利清穀不係熱利純是陰證而反見渴者此是陰在下隔陽於上蓋因洩瀉津液既去枯燥而渴其人雖引飲所飲自少而常喜温不可投冷劑宜理中湯或四逆湯加人參一錢渴甚連理湯

有陽證不渴陰証反渴者陽明不甚渴太陰乃大渴

不可不知治渴一也有堅腎水而渴止者有利小便而渴愈者堅腎水則用天花粉之屬利小便則用茯苓猪苓之類蓋太陰以利小便爲先陽明以利小便爲戒少陽以膽經半表半裏未可下之其人或大渴不止當以小柴胡湯加天花粉之屬堅其腎水腎水既堅自還滲入大陽大便微溏熱去而渴解若病在太陽太陽在膀胱腎經非利小便則熱無從去渴何由愈外有非陽證煩躁發渴此乃陰盛隔陽不當順其渴惟當治其陰

煩躁陰陽經皆有之陽明經胃有熱屎故煩此當下

之太陽經已得汗而煩者五苓散少陽亦或有煩喜
小柴胡湯陰煩少陰爲多由陽氣傳入陰經陰得陽
而煩自利而渴煩不眠者豉砂五苓散若非是陽氣
傳陰陰氣犯陰經吐利手足厥冷而煩經云陽虛陰
乘之故煩又云陰盛發躁欲坐井中吳茱萸湯甚者
四逆湯加葱白二根
外有虛煩一證乃是病愈後陰陽未復時發煩熱竹
葉石膏湯痰多睡不寧者溫膽湯嘔者橘皮湯詳見
寒熱門潮熱虛煩証若誤用藥下之身熱不去微煩
者梔子乾姜湯

自利須辨陰陽三陽自利各已本經見之太經與陽明合病下利頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾宜葛根湯陽明與少陽合病下利身熱胸脇痞滿而嘔或往來寒熱目疼鼻乾宜大柴胡湯大抵陽熱之利與陰熱之利與陰寒之利自不同陽利糞色必焦黃熱臭出作聲臍下必熱得凉藥則止得熱藥愈增陰利必洞下清穀糞色或白或淡黃臍下多寒宜温中止瀉之劑此之謂陰利陽利指陰陽二氣而言非曰陰陽二經也緣陰中亦自有陽利不可因下利便以爲陰也外有太陽證醫反下之遂下利清穀身體又自疼痛

者急用四逆湯救其裏後得大便已調身上疼痛用桂枝湯解其表（先救裏後解表恐洞下陽脫變生不測）又有內不太滿猶生寒熱未可下而便下之內虛熱入挾熱自利膿下必熱大便赤黃色及下腸間津汁垢膩名曰利腸宜白頭翁湯黃芩湯

要知均自爲利身不熱手足自溫者太陰身體四逆者少陰厥陰其餘身熱下利皆屬陽經然陰利有反發熱或初病無熱利後却熱或初得病即身熱繼而自利此陰利非陽傳陰經之利詳見後段發熱証

又有大便秘五六日以藥利之利遂不止用極熱劑

方瘥陽有利陽有秘當更以他證別之
外熱內煩下利上渴或痞或痛或嘔常法多用黃芩
湯半夏瀉心湯亦可不若生姜瀉心湯之當或溫膽
湯加入黃連其中枳殼去取在人
諸陽發熱已見前三陽經陰不發熱惟少陰能發熱
然少陰發熱有三證初得病即見少陰證發熱惡寒
頭不疼宜麻黃細辛附子湯少陰病始得之反發熱者多有表宜此湯
若下利清穀身熱躁擾裏寒外熱仲景謂之反發熱
此乃陰盛隔陽宜四逆湯附子理中湯益陽氣傳陰
經而下利者乃是熱利屬陰入裏外所以無熱陰

需要全本请访问 www.ertongbook.com