R241.1
1022

86836

新刊王氏脉經卷第七

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

病不可發汗證第一
病可發汗證第二
病發汗以後證第三
病不可吐證第四
病可吐證第五
病不可下證第六
病可下證第七
病發汗吐下以後證第八
病可温證第九

需要全本请访问 www.ertongbook.com

病不可灸證第十
病可灸證第十一
病不可刺證第十二
病可刺證第十三
病不可水證第十四
病可水證第十五
病不可火證第十六
病可火證第十七
熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十八
重實重虛陰陽相附生死證第十九
熱病生死期日證第二十
熱病十逆死日證第二十一

熱病五藏氣絕死日證第二十二

熱病至脉死日證第二十三

熱病損脉死日證第二十四

病不可發汗證第一

少陰病脉細沈數病爲在裏不可發其汗
脉浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脉遲者不可
發其汗何以知然此爲榮氣不足血微少故也
少陰病脉微一作濡而微弱不可發其汗無陽故也
脉濡而弱反在關濡反在顛微反在止澁反在下微則陽
氣不足澁則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩澁則無血
厥而且寒陽微發汗躁不得眠
動氣在右不可發汗發汗則劇而渴心苦煩飲即吐水

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤
動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端
動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運
惡寒食即反吐穀不得前一云穀不消化
咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絶手足逆冷欲得蹉
臥不能自温
諸脉數動微弱並不可發汗發汗則大便難腹中乾一云小便難胞
中乾胃燥而煩其形相象根本異源
脉濡而弱弱反在關濡反在顛弦反在上微反在下弦為陽
運微為陰寒上實下虚意欲得温微弦為虚不可發汗發汗
則寒慄不能自還欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利
心中飢煩睡時而發其形似瘧有寒無熱虚而寒慄欬而發

汗踡而苦滿滿一傍心痛腹中復堅
厥不可發汗發汗則譫亂因噦舌萎穀不得前
諸逆發汗微者難愈劇者言亂睛眩者死命將難全太陽病
得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多寒少其人不嘔清便
續自可一日再三發其脉微而惡寒此為陰陽俱虛不可復
發汗也
太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱則無陽也不可復發其
汗咽乾燥者不可發汗
亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振
躭家不可攻其表汗出必額上脉上促急而緊直視而不能
眴不得眠
汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼可與禹餘粮圓

淋家不可發汗發其汗必便血

瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出則痙一作痓下同

冬時發其汗必吐利口中爛生瘡

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

欬而小便利若失小便不可攻其表汗出則厥逆冷汗出多極發其汗亦堅

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發其汗必口傷爛赤

病人脉數數為有熱當消穀引食反吐者醫發其汗陽微膚氣虛脉則為數數為客陽不能消穀胃中虛冷故令吐也

傷寒四五日其脉沈煩而喘滿脉沈者病為在裏反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語

傷寒頭痛鼻鳴發熱形象中風常微汗出又自嘔者下之益煩心懊憹如飢發汗則致痙身強難以屈伸熏之則發黃不得小便必發欬唾

太陽病發其汗因致痙

傷寒脉弦細頭痛而反發熱此屬少陽少陽不可發其汗

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞堅者不可發其汗

少陰病欬而下利譫語者此被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

少陰病但厥無汗而強發必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出一作耳目者是為下厥上竭為難治

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脉異經病雖俱傷於

風其人自有痼疾則不得同法其人素傷於風因復傷於熱風熱相薄則發風温四肢不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出譫言獨語內煩躁擾不得卧喜驚目亂無精治之復發其汗如此者醫殺之也

傷寒濕温其人常傷於濕因而中暍濕熱相薄則發濕温病若兩脛逆冷腹滿又皆頭目痛苦妄言治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此者死醫殺之也 右二節出醫律

病可發汗證第二

大法春夏宜發汗

凡發汗欲令手足皆周至漐漐一時間益佳但不欲如水流離若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗也

九服湯藥發汗中病便止不必盡劑也
凡云可發汗而無湯者酒散亦可用要以汗出爲解然不如
湯隨證良
太陽病外證未解其脉浮弱當以汗解宜桂枝湯
太陽病脉浮而數者可發其汗屬桂枝湯證
陽明病脉遲汗出多微惡寒表爲未解可發其汗屬桂枝湯
夫病脉浮大問病者言但堅耳設利者爲虛大逆堅未爲實汗
出而解何以故脉浮當以汗解
傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脉
浮解之當汗出愈
病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發熱此屬陽明脉浮
虛者當發其汗屬桂枝湯證

病常自汗出此爲榮氣和榮氣和而外不解此衛不和也榮行脉中爲陰主內衛行脉外爲陽主外復發其汗衛和則愈屬桂枝湯證

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也先其時發汗即愈屬桂枝湯證

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病不解熱結膀胱脫其人如狂血必自下下者即愈其外未解者尚未可攻當先解其外屬桂枝湯證

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚朴杏子湯證

傷寒脉浮緊不發其汗因而衄屬麻黃湯證

陽明病脉浮無汗其人必喘發其汗則愈屬麻黃湯證

太陰病脉浮者可發其汗屬桂枝湯證

太陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解表候續在此當發其汗服湯藥微除發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也屬脉者湯證

脉浮者病在表可發其汗屬桂枝湯證

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反青一作小便清此為不在裏故在表也當發其汗頭痛者必衄屬桂枝湯證

下利後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱汗出惡風者惡寒屬桂枝湯證

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔屬桂枝湯證

太陽病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風屬桂

枝湯證

太陽病下之氣上衝可與桂枝湯不衝不可與之

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者法當先刺風池風府却與桂枝湯則愈

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發賁豚氣從少腹上衝心者灸其核上一壯與桂枝加桂湯

太陽病項背強几几反汗出惡風屬桂枝加葛根湯

太陽病項背強几几無汗惡風屬葛根湯

太陽與陽明合病而自利不呕者屬葛根湯證

太陽與陽明合病不下利但呕屬葛根加半夏湯

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脉促者表未解喘而汗出屬葛根黄芩黄連湯

太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者
麻黃湯證

太陽與陽明合病喘而胸滿不可下也屬麻黃湯證

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁頭痛
屬大青龍湯脉微弱汗出惡風不可服之服之則厥筋惕肉
瞤此為逆也

傷寒脉浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍
湯發之

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或
小便不利小腹滿或微喘屬小青龍湯

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴者此寒
去欲為解屬小青龍湯證

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通一作按之不痛鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不瘥腹滿加噦不治

太陽病十日以去脉浮細嗜卧此為外解設胃滿脇痛與小柴胡湯脉浮者屬麻黃湯證

中風往來寒熱傷寒五六日以後胷脇苦滿嘿嘿不欲飲食煩心喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞堅或心中悸小便不利或不渴外有微熱或欬者屬小柴胡湯

傷寒四五日身體熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴屬小柴胡湯證

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未

表者屬柴胡桂枝湯

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗也

脉浮小便不利微熱消渴與五苓散利小便發汗

病發汗以後證第二

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下下之為逆如此者可小發其汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗而不汗其人躁煩不知痛處乃在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐汗出而不徹故也更發其汗即愈何以知其汗不徹脉濇故以知之

未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而不即欬者此必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口為逆若更發其汗必吐下不止

陽明病本自汗出醫復重發其汗病已差其人微煩不了了此大便堅也以亡津液胃中乾燥故令其堅當問小便日幾行若本日三四行今日再行者必知大便不久出今為小便數少津液當還入胃中故知必當大便也

發汗多又復發其汗此為亡陽若譫語脉短者死脉自和者不死

傷寒發其汗身目為黃所以然者寒濕相搏在裏不解故也

病人有寒復發其汗胃中冷必吐蚘

太陽病發其汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難
以屈伸屬桂枝加附子湯
服桂枝湯大汗出若脉但洪大與桂枝湯若其形如瘧一日
再三發汗出便解屬桂枝二麻黃一湯
服桂枝湯大汗出大煩渴不解若脉洪大屬白虎湯
傷寒脉浮自汗出小便數煩復（仲景煩復字脉八煩）微惡寒而脚攣急
反與桂枝欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾
薑湯以復其陽厥愈足温更作芍藥甘草湯與之其脚即伸
而胃氣不和譫語可與承氣湯重發其汗復加燒針者屬四
逆湯
傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可復發其汗屬桂枝
湯證