需要全本请访问 www.ertongbo

醫藥顧問

第一編　小兒病自療法

【初生不啼】（病狀）小兒生下四肢能動但氣閉不通並不啼哭俗謂草迷亦名夢生。

（病因）難產疲擱勞傷胎氣或天氣嚴寒冷氣所逼口鼻之氣一時不能外達。

（治法）急用棉衣裹兒切不可剪斷臍帶在離胞衣寸許用線紮緊臍帶捲紙條蘸香油燃燒於臍帶上緩緩熏灼使煖氣透入臍中則自然氣回啼哭方可剪斷臍帶近世新學接生者其法極簡執兒兩足倒提懸空拍屁股三五下即啼蓋小兒受驚而醒也。

【兒生瞓死】（病狀）小兒生下身體雖溫但無聲息如死一般非真死也。

（病因）急啓兒口視上腭腫起或如盪漾盛水之狀或如紫李墜下抵舌名曰懸癰胎中熱毒也須刺破拭去毒水惡血切勿令小兒嚥下致毒死用淡鹽湯洗淨再用一字散蜜調搽口內。

（治法）一字散飛辰砂五分明礬砂五分龍腦朴硝各一分共研細末蜜調和搽上腭。

【胎寒腹啼】（病狀）兒生下遍體青白無血色日夜啼哭不止體仰而腹脹滿不乳大便青白。

（病因）是在胎中爲冷風所傷時時吐哯或腹中如雞子黃按之如小雞聲而後出若不急治則成癇症難治宜用隨氏小黑丸及養臟湯。

（治法）陳氏小黑丸木香一兩五錢五分丁香七錢五分煨肉蔻十個杏仁去皮尖百廿粒百草霜一兩共研末每藥末一兩加巴霜一錢糯米糊丸如芥菜子大每服三丸或五丸燈心湯送下。

（又養臟湯）白朮八分白芍六分茯神七分川芎五分甘草四分木香三分鉤藤三分澤瀉肉豆蔻各七分水一鍾薑三片煎服。

【初生無皮】（病狀）小兒初生遍身浸漬紅嫩而光亦有面白皮冷不赤者或上半身赤爛甚至紫黑者。

（病因）其病有三種原因一月份未足小兒肌膚尚未充實堅厚故紅嫩而光宜用米粉撲之二母處高樓不出

土氣其症與不足月大同小異宜用車轍上土研細撲之

三父母有梅毒遺傳胎中蘊熱所致宜用鵝黃散撲之

（治法）鵝黃散生川柏末熟石膏二味等分研細末加珍珠粉少許尤妙濕則乾撲乾則用豬胆汁調敷

（又方）早稻米研極細粉用粉撲時時撲之治月分不足無皮

（又方）車轍上黃土和生川柏末研和撲治母處高樓不沾土氣之無皮兒身再掘土坑臥宿即生皮夏天宜臥兒於芭蕉葉上

（又生肌散）人參黃蓍珍珠粉三味各等分研細末時時撲之

（又方）伏龍肝散伏龍肝即灶心對釜臍之土研細末雞子清調搽以上兩方統治三種無皮

【目閉不開】（病狀）小兒下地兩目緊閉不開

（病因）由產母飲食不節恣情辛辣厚味熱物毒物熱毒薰蒸以致熱蘊兒脾眼胞屬脾其絡脈緊束故不能開也

（治法）熊胆黃連各少許滾湯淬洗一日七八次無熊胆可將黑羊胆或青魚胆代之心鑑又方川芎薄荷撲硝各一錢爲細末以少許吹鼻中

（又生地黃湯）治初生目小兒不開乾地黃赤芍當歸瓜蔞根各二錢甘草各五分燈芯三寸薑棗小兒服之

（又四聖散）治小兒胎中熱毒生下兩目不開燈芯黃連秦皮木賊紅棗各半兩水一盞煎澄清時時頻洗即開

【血眼血淚】（病狀）血脈貫瞳兩眶紫黑或眼白珠紅赤如血瞳神不見上下弦爛名曰血眼小兒生下目濕不開雙目流血名曰血淚

（病因）血眼因初生艱難血浸眸眶遂漫滲其睛以致瞳神不見血淚因母食辛辣油煎熱物胎中蘊熱所致

（治法）杏仁兩粒去皮尖嚼乳汁三五匙入麪粉少許蒸熟絹包頻熨重者黃連朴硝治初生血眼

（又方）治小兒百日內乳漿不愈以致血脈貫瞳兩眶紫黑或眼白珠紅赤如血生地黑豆等分共研成膏掩於眼上則眶黑自消血隨淚出而癒

（又涼肝導赤湯治胎熱血眼方）生地黃三錢丹皮三錢澤瀉赤芩山梔人中黃赤芍木通各一錢燈芯甘草各一寸爲引水煎服

【爛赤眼】（病狀）初生兒兩眼胞邊赤爛名曰胎爛眼如兩目紅腫流淚名曰胎赤眼皆痛痒難睜之症小兒無知不能說耳

（病因）爛眼皆因胎中蘊熱生後毒熱上攻目竅所致

赤眼初生時眼瞼腫硬不開或開後又閉此神堅
長不整最爲惡疾
（治法）治胎毒烟眼杏仁三粒去皮尖搗爛如銅綠黃
豆大一塊爲末和勻用新青絹包好井水一酒盃浸片時
待水色成綠不時洗之二三日後自癒須先用皮硝煎水
洗過再用此方洗之
（又方）用豬胆汁和鹽點之極佳
（又方）治胎赤眼能斷根銅綠一分白蜜半兩於蚌殼內
相和研爛臥時用水洗眼炙熱點之
【氣閉欲絕】（病狀）兒生一二日大小便不通腹脹滿而
欲絕
（病因）係胎毒之氣鬱閉所致
（治法）急令婦人溫水漱口吸兒前後心臍下及手足
心共七處各吸五七口紅赤頭爲度氣散而自通不然救
亦無效先服小黑丸三粒方見前
（又葱白散）葱白四寸入人乳內同搗如泥敷入兒口與
乳使吐
（又當歸散）當歸八分木通六分連翹五分滑石六分甘
草梢三分水一盅煎不時服
【肛門結合】（病狀）其症有二肛結者穀道雖有孔但窄
小不能通糞肛合者肛門有脂膜遮蔽無隙可通即俗謂

沒竅穿腸

（病因）肛結因熱毒太盛結肛門肛合則係胎毒
兒時之生理作用外面雖有脂膜裏面穀道孔竅仍虛切
開外障肛門可見
（治法）肛結先服黑白散清除毒氣開通直腸再用甘
油錠蕩腸香少許納入孔中取其香能開竅滋潤燥結也至
肛合則必用手術將突而不剝竪硬物刺穿脂膜擴大竅
其孔亦用小號甘油錠插入若不急治開乳後有入無出
便即脹死也
（黑白散）黑丑半生半炒五錢白丑半生半炒五錢木賁與
五錢檳榔五錢陳皮五錢甘草三錢兌明粉二錢研末每服
五分或六七分溫蜜湯送下
【鄭重斷臍】兒在胞中臍臍帶濕熱裹之滋料養育命門
祖氣胎中呼吸亦由此出矣如瓜藤瓜蒂息息相通故臍自
爲先天命蒂今既離母腹剪斷臍帶祖氣不與母通呼吸口
別與天合從斯有色有相有生有滅故斷臍一事最大觀者
爲尋常道家則視爲人生一大因緣墓道家玄理微妙甚矣
深不能盡述即對兒身疾苦亦有出入一或不慎口噤撮
口臍風三般惡疾相繼而起今擇其最簡易之法分述如
下
（治法）產家要訣云兒出胎洗畢斷臍帶須相離手寸

臍帶從臍門起向外捋出務將水汁捋盡否則寒濕入腹必有腹痛口噤盤腸臍風撮口諸惡症傷命又須於近臍六七寸處用線紮緊再用新帛包裹剪刀頂先洗淨溫熱然後方可剪斷紮緊則臍中之血不流若天氣嚴寒可照前不啼法熏臍

（裹臍法）將臍帶圍如蟹香掺以枯礬草紙灰艾絨灰等細末帶雖長多掺藥末暑月亦不爲害外襯藥水紗布五六層再用長條紗布紮好日日隨於無風和暖處檢查勿令兒尿浸濕倘兒怒啼必有褥處刺痛隨用紗布隔墊元氣足者七天脫落後臍中猶宜乾燥潔淨切勿令冷風冰濕浸入稍有不愼上述諸惡疾作也

【檢乳哺乳】小兒吮乳爲有生飲食之先導檢乳不可不嚴審雖生母其乳不可食者亦棄之另覓他人之乳育嬰家敕云兒初誕用拭口解毒法腹鄉胎糞必下落地一週時方可與乳若產母乳汁未行必擇壯年體强乳汁濃厚潔白之婦人代爲開乳徐徐乳之產母乳汁既行必先揉去宿乳因有積滯之氣恐損胎兒故不可與兒飲之產母乳汁既行必漸漸增多久則如泉湧急而且多急取去乳頭少停恐胎兒氣弱吞嚥不及錯入喉管必起咳嗆致傷胃氣或用兩指捺在乳頭使兩邊乳出稍緩

千金云凡乳兒不可過飽飽則溢而成嘔吐每次哺乳皆須先揑去宿乳然後乳之如乳母欲寐當以臂乳與兒頭平母欲睡着須將乳頭取出兒口一防兒不得飽足致成嘔吐二防熱睡悶死小孩巢氏云小孩啼未定氣不調不可與以乳飲恐不得下停滯胃腸爲嘔吐大生要旨月內小兒不可聞啼即抱一啼便乳不知小兒啼哭乃自然運動工作有益衛生蓋啼哭則胎中所受熱鬱得此而散胎中驚風從此而解則頭月之間無重舌禾舌口噤胎熱之疾保生要法云小兒初生若多睡勿强與乳自然長而少病顱顖經云夜間乳兒每須坐起抱而哺之勿側臥乳兒乳後抱兒使兒身直恐軟弱傾側致乳溢出也不爾皆令兒病又云夏不去熱乳令兒嘔吐多不去煩乳令兒寫痢巢氏云夏中熱盛乳母浴後或惟兒啼不肯與乳使兒成胃毒秋成赤白痢浴後必須定息良久捋去熱乳然後乳之

朱丹溪云乳子之母尤宜節慾飲食下咽乳汁便通增添中動乳脈必應病氣到乳汁必變濃兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘡則熱或爲口糜或爲驚搐或爲夜啼或爲腹痛病之初來其溺必少便須詢問隨證治療母安亦安可消息於無形也

保嬰家敕云乳兒之母當淡滋味一切酸鹹肥甘熱物生冷瓜菓寒物皆當禁之又須愼七情調六氣以養太和養

母熱則子啼乳熱則子病總要乳母無熱乳子無熱故保嬰者必先保身史記華佗傳云乳氣虛寒冷故令兒便青而嗽千金翼云令兒咳嗽一二千金翼云熱乳令兒面黃不食嘔吐張氏云熱乳傷損肺氣令兒龜背孫兆曰母太喜乳兒則令兒上氣癲狂亦令兒生疾喘急或生驚千金寶鑑云母大怒乳兒則令兒疝氣扁鵲云女子腹脹寶鑑云氣乳令兒面黃白乳哺減少夜啼兒又云病乳令兒黃瘦骨蒸盜汗嗽哭夜啼及生諸疾雖祕云壅乳令兒成痰涎涎壅生病寶鑑云壅乳令兒成乳癖又吐逆生痰千金翼云醉乳令兒肚腹急痛扁鵲云醉淫隨乳兒恍惚多驚寶鑑云乳母淫佚情亂令兒吐瀉身熱啼叫如鴉不治千金論云父母交合之間兒臥於側或驚起不可乳兒蓋氣亂未定必能殺兒也心鑑云夜歸下飲乳佚氣入咽不散多成嘔逆眞訣云大勞大饑之後不佚氣息稍和即以乳兒令兒成疳朱丹溪云乳母致病事起於感人多玩忽醫所不知故乳母稟受之厚薄性情之緩急骨肉之區別得之者貴賤貌之妍醜令兒相肖大有關係不可不愼也倉公云當風乳兒風冷入肺則令兒咳嗽醫藥源流云調攝小兒之法病家能知之者千不得一蓋小兒純陽之體最宜清冷今人非太煖即太飽而其尤害者則在於有病之後而數與之乳乳之爲物得熱則韌如棉絮兒有病則食乳甚穩乳久不食則愈充滿吮則迅疾湧出較平日之下咽更多前乳未消新乳復加壞積胃口化爲頑痰相結諸臟皆散而死矣譬如常人平日食飯幾何當病危之時其食與平時不減安有不死者哉然嚥病家云乳不可食則莫相詔曰乳猶水也食之何害況兒虛如此全賴乳養若復禁乳則餓死矣不惟不肯信反將醫者詬罵其餘之不當食而食與當食而反不與食種種失宜不可枚舉此小兒之所難治也蘭臺軌範云兒病即宜少與乳食若似驚風即宜斷乳如欲食與米飲一勺必欲食乳須先將乳擠空然後以空乳令吮否則乳下咽中即成頑痰雖神丹無效俟少安漸與乳可也蘭園口譜云乳之性見酒則凝試將牛乳一碗加陳酒一小盃攪和蒸一沸乳凝如腐物性然也飲乳之兒父母愛之戲以酒滴兒口中往往漸成乳癖黃腫痞積等症可不

慎說育兒家祕云養子之道當擇乳母必取婦人無病強壯肌肉豐肥面貌端正性情和平者其乳汁濃厚甘美瑩白溫和於兒有益俗謂喫乳像主分也若病寒乳寒病熱乳熱病瘡者乳毒食口腹者味不純喜淫慾者氣不清何益於子故宜遠之近世梅毒盛行乳婦之夫患過花柳梅毒者必傳染於妻乳汁中梅毒遺傳小兒其害尤甚脅患過瘡瘍乳母之乳亦不可喫其毒亦能遺傳使兒虛羸

（附哺兒法）千金論云兒哺早不勝穀氣令頭面體生瘡癤而復發又厄弱難養三十日後雖哺不多若不嗜食強與之不消復生病哺乳不進復有疾癖節哺數日自癒保生碎事云乳者嫋也哺者食也乳後不得與食食後不得與乳乳食相併雜以刻化大則成癖小則成積病氣自此始矣

慈幼外編云或曰小兒無傷乳法即乳滿而溢亦無大害惟與食併則乳裹食不化遂成痰癖是傷食非傷乳也故小兒以乳爲主三歲後方可食糕粥五歲後方可食葷腥則一生永無脾胃之疾

大生要旨云小兒半歲以前只與乳喫六個月後方與稀粥週歲以前更不可喫葷併忌生冷之物待一二歲腸胃稍厚時與葷喫

養子秘訣云凡乳熱更與冷乳冷更與熱乳飢少與乳多與乳自然永無患故凡粘膩乾硬酸鹹辛辣一切魚肉東洋麵炒炙煿炒煎婦俱是發熱難化之物皆宜禁絕小兒無知見愛物即愛豈能知節節之者父母也父母不知禁忌長其啼哭無所不與積成痼疾追悔莫及雖曰愛之其實害之語云惜兒須惜食又云若要小兒安常帶三分饑與寒皆至真言也

保產輯要云生兒鮮乳不得不喂以穀食母細嚼以手喂哺之不可以口對口喂之致生疳疾腹脹景岳全書云小兒飲食有任意偏要者無不致病所謂爽口味多終作疾也食極宜愼之嘗見王隱君曰予幼時酷嗜甘餡忽一日見餡中有蚯蚓伸頭而出自此不敢食餡至長始知長者爲之害此可爲餡戒之妙法

錢乙小兒直訣云小兒病多因愛惜太過三三歲猶未飲食致脾胃虛弱十生多病半年後煮陳米稀粥弱湯時時與之十月以後漸與稀弱爛飯以助中氣但不與併乳庶然無病易養

馮氏錦囊云凡見切忌食肉否則脾胃乃傷若再甘酣麵食不禁則令疳蟲積積若食腥予心血腦髓之類則令走盡馬疳候若食葱韭蒜則令心氣鬱結水穀不通三焦虛熱神情昏昧若食飛禽鳥雀則生瘡疥癩癬濕熱煩悶若食蝴蝶蜻蜓螢火蟲蜘蛛蜈蚣蛇蟮蚯蚓併腸胃不實泄瀉無節

於臍帶過食則生蛔蟲尤宜切忌

【不能喫乳】（病狀）心腹痞滿短氣不能喫乳

（病因）初生小兒不乳其症不一有胎中口含惡血未及拭去嗍入腹內令兒腹滿短氣不乳有產母過食寒冷胎受寒氣令兒腹痛多啼面色青白不乳有胎糞未下腹滿氣促嘔吐不乳有牙關不開不能吮乳者有胃系未寬吮乳而不能嚥下者有胎熱內閉數日不乳者

（治法）外憲治穢惡入腹腹滿短氣不乳方乳兩合葱白二寸煎二三沸去葱喂兒即乳又方木瓜丁香木香乾薑茯苓甘草六味等分爲粗末一捻水煎棉蘸滴兒口

（又陳文仲方）治胎塞不乳丁香十枚陳皮去白一錢乳汁二盞石器內煎一二十沸細細與服

（又）陳氏小黑丸三五粒青蒿煎湯送下可治胎糞未下嘔吐不乳（方見前不啼門）

（又慎齋方）治牙關不開不能吮乳者其嚙在牙根也當用南星炙研龍腦少許二味和勻揩染薑汁柏葉汁和藥末擦牙根即開如不效用開關散吹鼻

（又聖惠方）治能吮乳而不能下咽者其嚙在咽中也當用水銀米大二粒與之咽下即愈但此方只可一次不可多用

（又方）鴉糞醫灰二字和乳點之即蘇

【初生吐乳】（病狀）其症不一有胎中口含惡血未及拭去嗍入腹內令兒腹滿短氣不乳者有面青白四肢冷口吐清稀白沫者有面黃赤手足溫口吐黃涎酸粘者有腹滿吐不止者

（病因）兒自胞胎既脫以後有因便閉胎中穢惡不能去盡令兒腹滿吐乳不止生育時觸冒風寒邪犯肺胃令兒鼻塞多啼腰曲吐沫不止胎前受寒熱令兒面黃赤手足溫吐黃涎酸粘胎前受寒令兒面青白四肢冷吐清稀

白涎

（治法）一捻金治初生兒更閉腹滿穢惡不淨吐乳不止生大黃黑丑白丑人參檳榔五味等分爲細末每用少許密水調下便通即止

（又香蘇飲）治觸冒風寒邪犯肺胃鼻塞多啼腰曲吐瀉不止藿香蘇葉各八分厚朴薑汁炒四分陳皮枳殼茯苓各六分木香炙甘草各三分生薑二片水煎服

（又二陳加黃連湯）治胎熱面黃赤手足溫吐黃涎酸糟薑半夏陳皮茯苓各六分黃連甘草各三分生薑三片水煎服

（又理中湯）治胎寒面青白手足冷嘔清稀白沫人參白朮炒白北乾薑炙甘草各五分紅棗三個煎服

（又方）治小兒乳積嘔吐大麥芽炒焦為末每服生薑二片水煎乳煎沸飲之

（又保針丸）治痰壅吐乳。黃丹研末。小棗肉和丸。如芡實大。以針簽於油燈上燒過。研細末。乳汁調下。

【四種呪乳】（病狀）呪者。無聲嘔吐也。前論是初生小兒吐乳。此論初生以後呪乳。其吐狀則一。病因有四。即宿乳。停痰。胃寒。胃熱也。

（病因）金鑑云。小兒呪乳。證非一端。不可一例而治。如面色多赤。二便微祕。手足指熱。此爲熱呪也。宜和中清熱飲主之。如面色青白。糞青多沫。手足指冷。此爲寒乳也。宜溫中止吐湯主之。如口熱唇乾。夜臥不甯。手足心熱。此爲傷乳停滯而呪也。宜平胃散主之。如胸膈膨滿。嘔吐痰涎。此爲停痰而呪也。宜枳桔二陳湯主之。

（治法）和中清熱飲。治胃熱而呪。黃連薑炒三分。薑半夏五分。砂仁四分。陳皮茯苓。藿香等分。生薑二片。水煎服。

（溫中止吐湯）治胃寒呪乳。白豆蔻三分。研沖。薑半夏五分。茯苓八分。生薑三片。水煎。加磨沉香沖服。

（又平胃散）治傷風停滯而呪。焦茅朮五分。薑炒川朴三分。陳皮六分。焦麥芽三錢。炙甘草三分。砂仁研末沖。生薑三片。水煎服。

（又枳桔二陳湯）治停痰呪乳。炒枳殼五分。桔梗五分。陳皮五分。薑半夏七分。茯苓二錢。炙甘草四分。生薑三片。水煎服。

【口中有蟲】（病狀）亦名牙關緊。小兒喫乳不穩。七日以來。壯熱。顏色赤。鼻孔黃。急看牙關。如有蟲似蝸牛。又似黃頭白蚌螺。

（病因）胎中熱毒。壅結心肺脾胃所致。若不速治。恐作搐。

（治法）外臺。用竹瀝半合。眞牛黃少許。和服。即差。但近世牛黃無眞。市售者。大都僞造。尤以日本國來者居多。

（又方）用豬肉拭口。其蟲即去。

【雪口板牙】（病狀）雪口者。亦名鵝口。初生小兒口內白屑滿舌。拭去復生。重者滿口白斑。時吐白沫。咽間壹壹腫起。難乳。板牙者。亦名重齦。又名馬牙。初生兒牙齦板白堅硬腫起者是也。

（病因）雪口由胎中熱毒上攻心脾二經所致。板牙由脾胃二經胎熱蘊結而生。

（治法）用毛青布。蘸薄荷汁。拭淨白屑。或用黃連甘草各一錢。煎汁。以青布蘸透。拭口內。集效方。治鵝口白屑。用生天南星研末。醋調敷足心。乾則以醋潤之。兼治重腭板牙。又用吳茱萸末。米醋調塗足心。

（又青液散治鵝口方）飛雄黃三錢。硼砂末。甘草末。各一錢。冰片三分。研和。摻舌上。或蜜調敷口內。

偏最爲惡症。都主不治。如爲風邪所束者。可發渗胎驚當以硃風利驚化疾調氣主之。若百日內搐抽不止者。謂眞搐不治。

（治法）噫驚散。治胎驚不醒。生半夏一錢。牙皂末五分。研和。吹入鼻中。少許即醒。一方加細辛薄荷等分。名通關散。吹鼻即醒。不醒不治。

（又經驗方全蝎）一箇。以薄荷葉裹定。火上炙焦。同研爲末。入硃砂麝香少許。分作四服。麥冬湯調下。

（又太乙散）天漿子去壳。微炒。陳胆星。泡白附子。天麻。防風。茯苓各二錢。全蝎。硃砂各一錢。麝香少許。共爲末。每服半錢。煎汁化服。備急方治胎搐。因外感風冷所成者。葱白頭十莖。生薑一片。搗細。攤紙上。合置撐中。令熱。急貼顖門。以熱手熨之。鼻利搐止。

（又大青膏治胎驚因傷風得之。口中氣熱。呵欠煩悶。手足動搖者。）天麻末一分。生白附子末一錢。半蝎尾去毒研末。烏稍蛇肉。醉浸焙乾。研末各五分。青黛一錢。硃砂天竺黃末各三分。蜜和成膏。月中兒服菉豆大。薄荷湯下。

（治驚治法）仁齋法。驚症方萌。耳後高骨間。必有青紋。紛紛如線。見之則以指甲爪破。須令血出。啼叫。先得氣通爲妙。羌活。獨活各五錢。天麻。白蝎。殭蠶各二錢五

宜用爲細末。煉蜜和膏。每服龍腦薄荷湯調下。

【又天南星煎】天南星微泡。白附子。白花蛇酒浸。去骨。各一兩。爲細末。用好酒兩大盞。慢火煮。不住手攪。煎至盞半。盡爲度。次加飛辰砂五錢。風粉二錢五分。牛黃。麝香。龍腦。各半錢。研入膏內。和龍眠核大。每服一粒。薄荷湯化下。

（又聖濟錄）大石榴一枚。去頂。挖空。入全蝎五枚。黃泥裹固。好。煨存性。取中焦者爲末。每服半錢。防風湯下。

【天釣內釣】（病狀）天釣發時。驚悸壯熱。眠目上翻。淚出不流。手足搐搦。爪甲青黑。按經氣急。症似驚風。但頁參卻。來視。較驚風稍異。內釣發時。胸膈反張。黃青潮搐。腹痛。口吐痰涎。多痛。作止有時。咬乳目瞪。症似驚風。但目有紅絲血點爲異耳。

（病因）天釣由邪熱痰涎。壅塞胸膈。不得宣通而成。痰壅者。多熱者。鉤藤飲主之。爪甲青黑者。蠲合香丸主之。內釣由肝臟有病。外受寒冷而成。痰癖搐搦。塞鉤藤飲主之。急啼腹痛者。木香丸主之。唇口黑者。養臟湯主之。然內釣至此。乃中寒陰盛。不治之症。用此救治。甚或保全。

（治法）九龍控涎散。蜈蚣一條。酒塗炙乾。滴乳香天竺黃

參湯調下。
（又牛黃散）牛黃一分、飛辰砂一分、麝香五厘、天竺黃二分、蝎稍一分、鉤藤二分、右研勻、每服一字、新汲水調下、新汲水、即臨時汲起之井水也。
（又鉤藤飲）大參二錢、鉤藤鉤三錢、全蝎五分、天麻五分、生甘草二分、羚羊角五分、先煎一復時後下、諸藥煎服。
（又蘇合香丸）蘇合香油五錢、安息香一兩、易爲末用無灰酒半斤、熬膏、將蘇合香加入、丁香、青木香、白檀香、沉香、薰陸香、附子、煨訶子肉、川烏犀角、飛辰砂各一兩、滴乳香、片腦各五錢、麝香七錢半、右爲細末、入安息香膏內、煉蜜和丸、芡實大、每服一粒、空心開水化服、此方價格在千金以上、但安息香久無眞者、市上仍有此丸出售、病家須向有名望之中國藥店購之可也、木香丸木香煨、沒藥、乳香、青皮炒、鉤藤鉤全蝎各等分、先將沒藥、乳香研勻、加入各藥研和、取大蒜少許、研細和丸、如梧子大、晒乾、每次二粒、鉤藤湯下。
（又養臟散）當歸、沉香、木香、煨肉桂、川芎各半兩、下香二兩、右爲末、每服一錢、淡薑湯調服。

【重舌木舌】（病狀）重舌者、因舌下近舌根處、其腫起形狀又如一舌、象兩舌重疊、故名重舌、木舌者、舌腫脹滿口舌（舌因）二證、皆由心脾蘊熱、熏蒸血氣、搏於舌下、或絡在舌中、積熱生瘡、期舌受病、或非而病、（治法）宜熬飲治重舌心脾、必熱、黃連一錢、生地三錢、木通連翹、竹葉各二錢、甘草一錢、蓮子二十粒、淡竹葉二錢、爲引、水煎、待溫時、時灌入口中、外用涼心散吹舌上。
（又涼心散）黃連、人乳拌炒、大甘草各五錢、青黛、過硼砂、黃柏末各二錢、風化硝、石半錢、冰片五分、共研細末、吹之甚效。
（又瀉心導赤散治木舌方）木通一錢、生地三錢、黃連、甘草各一錢、燈芯三十寸、水煎服、外敷胡黃連散、朴硝各五錢、眞蒜汁調、舌上出水即愈。

【鬭螳螂子】（病狀）初生或月內小兒、舌上忽然腫出兩腮腫硬、俗名螳螂子、此爲妖婦總娶、感人惡言也、萬不可信。
（治法）徐靈胎曰、自古無螳螂子之病、凡舌上瘡腫、皆由內傷惡乳之時、名曰胎乳、不治自愈、或不能坐視、以藥塗口、亦易癒、萬不可輕信妖婦之言、用刀割兩腮上肉、以騙人取利、強者幸癒、弱者多死、受其害者、皆多逃避小兒、【兩頰頤內有肉外發、兩唇中空處、有指膜、名曰螳螂、然】

疑死而不悔深爲憐憫蓋人皮下第二層脂膜人人皆黃
酬出之物實是第二層脂膜並非螳螂子也
（治法）揉口方治兩腮腫硬不能吮乳飛青黛一錢元
明粉三錢硼砂一錢薄荷五分冰片一分共研細末和勻
擦兩頰內日用四五次立愈
（又叄生集）用生地黃五錢大黃一錢陳酒浸透取出共
打爛塗兒足心男左女右用絹縛好兒則換之愈乃止再
用日胡椒末一撮安兒臍門上以膏藥蓋之神效
【噤口撮口】（病狀）噤口者其候舌上生瘡如黍米狀啼
聲漸小口吐白沫牙關緊急吮乳不得見於七日及一月
之內曰噤口見於百日之內百二十日之後者曰風噤其
實一也撮口者口撮如囊也不乳啼低舌張唇青面黃色
赤氣高痰盛若二便祕結手起搐抽厥冷者不治
（病因）小氣噤口皆由胎熱所致失治者多至不救法
當清熱疏利以龍膽湯主之若肚腹脹硬二便不通者紫
霜丸主之又有一種口吐白沫牙關緊急者此爲胎熱內
結復爲風邪外襲當以祕方擦牙散先擦其牙關次服辰
砂金蠍散病即止不可過服然後服勻氣散調和脾胃撮
口乃心脾之熱受自胎中也其症最險急當延醫治之如
氣高痰盛者辰砂礬霜散主之二便閉結者紫霜丸主之
口吐白沫四肢厥冷雖有神丹終屬無濟
（治法）龍膽湯柴胡五分黃芩赤芍桔梗各一錢龍膽
草鉤藤鉤赤茯苓各三錢熱大黃生甘草各一錢蜣螂去
翅足一個猪肉爲引水煎服
（又蒸霜丸）代赭石一兩火煅醋淬三五次研赤石脂一
兩杏仁六十粒炒去皮尖巴豆三十粒去油膜右爲末飯
糊如麻子大日服三粒白湯下
（又祕方擦牙散）生南星二錢去皮臍龍腦少許研細末
用指蘸生薑汁拭蘸藥末擦大牙根上牙緊立開如不開
則將薑汁調藥末成稀糊含在大人口中用空筆管插小
兒鼻孔然後將藥糊極力吹入其關立時即開此法有通
仙之妙不可不知
（又辰砂金蠍散）飛辰砂五分全蠍三只去毒硼砂冰片
麝香各一分研極細末用乳母口津調抹兒口內及齒上
（又勻氣散）陳皮桔梗各一錢砲薑砂仁炙甘草各五分
木香三分右研共細每服五分紅棗三枚水煎湯調服
（又辰砂礬霜散）飛辰砂五分礬霜一錢炒去臍蛇蛻一
錢炒麝香五分右爲末密調敷辰口
（又撮風散）金頭蜈蚣半條炙礬霜炙去嘴全蠍洗去毒
各一錢鉤藤一錢五分飛辰砂一錢麝香少許研細末每

陸有三病源則一治不得法固刻寒命即治得其道亦
十救二三耳其致病之由皆因斷臍時不知謹愼須防患
未然預杜此三種惡病也即爲將發之候即宜抱兒向和
暖明亮處視其口中或上顎有泡或白點或牙根有白點
或有黃筋或舌上白屑堆聚或舌下膜如榴子急用指甲
或尖利銀鉞挑破以新棉拭去惡血穢水勿令小兒嚥
下再揉以辰砂豬蠶散再視臍下其下之筋必生兩條須
於此行盡頭處安生薑一片各灸艾三壯以截住其上攻
之路更灸中脘三壯再灸然谷三壯再灸承漿穴頰車穴
各三壯以洩其毒發之標此皆古人預防急治之良法宜
遵而行之爲兒父母者幸勿河漢斯言庶幾幸甚

【臍風臍突】（病狀）臍風者其症腹脹臍腫大通不通啼
哭不乳四肢柔直痰氣壅塞重者面青吐沫噤口撮口抽
搐不止繞臍青黑臍突者其症臍輪腫高突起色紅赤
（病因）金鑑云臍者小兒之根蒂也名曰神闕穴近三
陰喜溫惡涼喜燥惡溼如斷臍不知愼重爲水溼冷風之
氣所傷一臘之內（即兒生七日）兒必腹脹臍腫日夜
啼哭此臍風將作之徵也此病兼症甚多當分別治之如
肚腹脹硬大便不通者風兼實也黑白散主之面青肢冷
二便不通者風兼虛也理中湯主之接涎墜盛氣高喘急
急救也龍胆湯主之痢青氣白屑堆舌下膜如榴子急用指甲
脾散主之撮口唇青抽搐不止者風兼脾也撮風散主之
若臍邊青黑口噤不開者是爲內抽最爲險惡神丹萬病
也總之臍風見於一臘者多主不治因兒七日血脈未通
病已中藏醫之無益臍突一症謂斷臍不如法裹臍不謹
愼而使之然者非也此由其母未產時驚怖鬱結或恣食
辛熱之物兒受其氣腹中蘊熱無所發洩頻頻伸引呃呃
作聲穹氣衝臍以致臍突腫赤虛火可畏此症忌數寒藥
恐整凝熱毒反爲害也若由啼哭太過中氣穹出者十居
七八不必治使兒不哭漸自收進
（治法）黑白散方見前肛門結合門理中湯方見前初
生壯乳門辰砂豬蠶散方見前撮口門
（又龍胆湯方）見前噤口門
（又益脾散）白茯苓人參煨草果煨木香炙甘草陳皮薑
炒厚朴炒蒼朮各等分右爲末每服一錢用生薑三片紅
棗三枚煎湯調服
（又撮風散方）見前噤口撮口門
（又二豆散）治臍突赤小豆不去皮淡豆豉天南星去皮
臍白歛各一錢共爲末用五分水芭蕉根汁調敷臍四邊
日二次

（又葱貼法）先以荊芥湯洗之再用葱葉火上微炙放地下出汗以指甲刮薄搭放臍突處即消雷公方白茯苓車前子各一錢辣皮通草各二錢生甘草梢二分水煎服兼治小便不通

【臍溼臍爛】（病狀）臍帶浸濱不乾臍穢不堪名曰臍溼久而不愈溼毒蘊蒸瘀腫潰爛成瘡名爲臍瘡

（病因）皆因生下時沐浴不慎以致浴水入臍或因尿溼浸臍所致然臍症中最輕之候也

（治法）掺臍散治臍中溼爛枯礬煆龍骨各二錢麝香少許共研細末乾掺臍中千金方治臍溼豬脊髓十條杏仁半兩搗和敷

（又聖濟總錄）蝟貼甘草等分炙研爲末敷之聖惠方治臍中膿血海螵蛸胭脂炙灰共爲末香油調敷之

（又準繩治臍瘡方）枯礬龍骨煆各半錢研末敷之臍瘡不合方黃柏末敷之

（又方）蝦蟆一隻燒灰加煆牡蠣等分研末日敷三次

（又臍爛成瘺方）以杏仁去皮研爛塗之

（又兒臍不合方）取車轄油脂燒灰敷之

（又臍中出血方）兒初生多啼叫致臍出血者用白石脂炒研細末乾掺之不可剝揭候其自落

腹通脹臍四旁有青黑色及撮口者不治有兒生三四日不大便其兒必面赤腹脹不乳多睡有小兒初生大小便俱不通者最爲急候

（病因）小便不通乃胎受熱毒之氣流於下焦膀胱之氣不化開合之機不利也只須內服外敷小便自通若繞臍青黑腹脹撮口者乃不治之症

（小便不通法）導赤散生地黃三錢木通二錢生甘草一錢淡竹葉二錢燈芯三十寸爲引水煎服熱甚者加黃連一錢滑石五錢赤茯苓三錢更妙

（又八正散）扁豆瞿麥木通赤苓車前生大黃生梔子各二錢飛滑石四錢燈芯三十寸水煎服外貼豆豉膏淡豆豉一勺田螺十九個去殼葱一大束同打爛用芭蕉汁調貼臍上小便自通

（又大便不通治法）珠磨法飛辰砂半錢白蜜調勻乳汁化服若稟質太弱者不宜用可改用一粒金治之

（又一粒金）生大黃黑丑白丑人參青橘皮五味各等分爲細末每用少許磨水調服

（又大小二便不通治法）木通散車前子扁豆瞿麥木通赤苓生梔子黃芩生大黃各二錢飛滑石四錢生甘草一錢燈芯三十寸爲引水煎服或加麝香一錢

光則少停此等原不是病若面色青白手足俱冷腰曲不伸不欲吮乳者病也

（病因）啼由邪熱乘心也因初生兒五氣未足心虛胆怯一有邪熱衝心動胆則必驚而啼也治宜清心降火柔肝和胆鎮驚清神瀉心導赤湯主之夜啼其症有二如面色青白手足俱冷腹曲不伸不欲吮乳者脾寒也鉤藤飲主之如面赤唇紅身腹俱熱小便不利煩熱多啼者心熱也導赤散主之

（治法）瀉心導赤湯方見前重舌木舌門鉤藤飲川芎白芍炒各一錢當歸茯神茯苓各二錢木香甘草各七分鉤藤三錢紅棗三枚爲引水煎服

（又導赤散方）見前二便不通門

（又本草綱目治夜啼方）用燈花三個研細燈芯湯調抹乳上令兒吮之

（又簡易方）治夜啼用燈草灰飛辰砂二味水調塗乳頭令兒吮之

（又全幼心鑑蝲花散治小兒無病夜啼方）蝲蛄十九個去土炙用下半截研末分四服鉤藤湯下

【含腮痧腮】（病狀）小兒初生時腮內有小瘡如豆大一必化膿潰破成腮癤

（病因）二症皆因娠母恣食辛熱厚味或鬱怒不解以致鬱熱在內胎兒受之成此二症

（治法）二金散治含腮鵝口內金鬱金二味等分研細末先用鹽湯洗淨後吹之

（又痧腮敷法）桑梨灰少許入雄鷄冠血滴四點加鹽一點和勻搽患處

（又方）皂角二兩去核天南星二錢生用糯米粉一合爲末薑汁調敷

【鼻中諸病】（病狀）鼻塞者鼻孔塞而不通只可開口呼吸含乳則鼻息不通不能吮也或鼻流清涕或鼻孔乾熱或鼻窒不利而齁

（病因）或因乳母夜睡鼻息吹入小兒顖門或因風寒外入阻遏肺竅皆成鼻塞之症或熱鬱火升則鼻乾或津液不收則多涕或邪阻孔竅或穢涕結聚阻塞鼻孔皆能令齁

（治法）葱薑貼法葱頭七個生薑一片共搗爛攤紙上置掌中兩手合令溫貼顖門上其邪即解揭去後仍用絹縐寸餘方盡以通糊乃貼顖上永不傷風

（又通關散）香附川芎荊芥細辛藁猪牙皂礬麝各等分研末用葱白打成膏用紅絹攤貼顧門上（又方治鼻流臘涕兼治鼻乾）枯礬血餘灰等分爲末青魚胆汁拌爲餅陰乾研細吹鼻中（又大全方）通草北細辛各等分研末綿裹藥如棗核大納入鼻中一日二次以上治塞簡易備驗方法鼻鼽瓜蒂製蘆各一分皂角半分麝香少許爲細末吹鼻

【大小便血】（病狀）兒生七日有大便出血者有小便出血者有大小便同時出血者或小便黃赤少停變成血者極險惡

（病因）症雖分四原因則一皆由母妊時過食辛辣煿炙釀厚所致法宜清火解毒

（治法）簡易備驗方法胎兒大小便血生蒲黃血餘灰各一錢爲末生地黃打汁調下或藕汁調下

（又方）治大便血緊頭一個炭火炙令黃黑爲末鮮茅根打汁調下

（又四物加牛膝湯治小便少停變血方）生地一兩川芎赤芍當歸生梔子牛膝各五錢六味俱用陳酒炒黑水煎服

（又奚氏脉方治小兒大人大小便血神效）炒蒲黃三錢包鮮生地一兩炒柏炭二錢丹皮赤芍小薊大薊各二錢炒山梔三錢俟芩皮二錢藕節五個水煎鮮白茅根去心打爛絞汁一兩沖入藥內服

【膜舌胞口】（病狀）初生兒舌有白膜包裹或包舌根底上尖急以指甲刺破出血或用竹刀輕輕刮破白膜若則必嘔但不可用手按之恐損及舌根長成後言語不正

（病因）皆因在胎中受熱毒太盛生下後心脾火毒上攻致成此症最惡之候

（治法）姚和仲方先刮破舌膜令出惡血以泄其熱再以燒枯白礬少許敷之如血出不止用血餘末摻舌上或蒲黃炭末摻上

【膚裂出血】（病狀）初生數朝兒遍身皮膚裂開滲出血液啼哭不乳

（病因）或受胎熱或房幃太暖蘊熱無從發洩攻裂皮膚而出耳

（治法）尋生書以口津磨鐵銹敷之即止奚氏家祕蒲黃炒黑存性芭蕉根打汁調塗立止

【手足拳縮】（病狀）兩手指兩足指俱無力不能展伸

（病因）手指拳者小兒先天稟受肝氣未足故筋脈攣縮手指無力伸展又足指拳者兒在胞中母有臟府積冷或爲風邪所乘生後氣血未榮故足指拳縮不展或因娠母有病不能行步終日坐子母一氣相感形隨氣化是