考试掌中宝

高级卫生专业技术资格考试

新媒体复合版

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会　组编

普通内科

副主任、主任医师资格考试

冲刺模拟卷



10套模拟试卷/1000道试题
紧扣考试大纲/题型全面丰富
两种版本互动/随时随地复习
自动批阅判分/汇总错题重做

上海科学技术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

考试掌中宝
高级卫生专业技术资格考试

普通内科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会　组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

普通内科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷 / 高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编. —上海：上海科学技术出版社，2020.5
考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试
ISBN 978-7-5478-4842-5

Ⅰ. ①普… Ⅱ. ①高… Ⅲ. ①内科学—资格考试—习题集 Ⅳ. ①R5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 043583 号

考试掌中宝 免费赠送本书互动电子版 阿虎医考 ahuyikao.com

· 错题重做、自动收藏，好题时时温故
· 习题评论、纵情吐槽，考友共同进步
· 紧扣考纲、题型全面，题量充足丰富

使用方法：扫描二维码→手机号注册账号并输入授权码→根据页面提示下载APP并在相应模块中使用

微信扫码加好友
一对一专属备考客服

授权码粘贴处

普通内科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会　组编

上海世纪出版(集团)有限公司
上海科学技术出版社　出版、发行
(上海钦州南路 71 号　邮政编码 200235　www.sstp.cn)
印刷
开本 850×1168　1/8　印张 13.25
字数 260 千字
2020 年 5 月第 1 版　2020 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5478-4842-5/R·2050
定价：58.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，请向工厂联系调换

前　言

为了进一步深化卫生专业职称改革，2000 年人事部、卫生部下发了《关于加强卫生专业技术职务聘请工作的通知》。通知要求，卫生专业的副高级技术资格通过考试与评审相结合的方式获得；正高级技术资格通过评审委员会答辩后获得。根据通知精神和考试工作需要，副高级技术资格考试在全国各省、自治区、直辖市职称改革领导小组的领导下设立了多个考区。目前，很多地区正高级技术资格的评审工作也逐渐采用考评综合的方法。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，作为单位聘请相应技术职称的必要依据。

考试是为了加强临床医务人员对学科知识的系统了解和掌握，是提高医疗质量的一种手段。我国每年有 20 万以上需要晋升副高级和正高级职称的卫生专业人员，这些高级技术人员是我国医学发展的中坚力量，身兼承上启下的重任。本书不仅可以帮助广大考生通过考试，还可以使考生的专业知识更加扎实与牢固，以面对更加艰巨的任务。

为了帮助考生做好考前复习，我们仔细分析考试的命题规律和考试特点，严格按照考试大纲的要求，编写了本套“考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试”系列。每套冲刺模拟试卷包含 10 套习题，包括单选题、多选题、共用题干题和案例分析题 4 种题型。内容紧扣考试大纲，题型全面，题量丰富，具有很高的考试指导价值。

大纲将专业知识的要求分为 3 个层次，分别是“了解”“熟悉”“掌握”。安排题型难易程度，好比一棵树，掌握内容是主干部分，熟悉内容是分枝，而了解内容则是树叶。本套书以主干为主，分枝为其次，树叶为辅的要求编排，针对性强，突出重点。可以检验过往的复习成果，起到查漏补缺的作用。

为了方便考生复习迎考，本套冲刺模拟试卷包括纸质版和配套的手机 APP 应用版，做到随时随地地互动复习，反复演练。配有同步练习题，自动批阅评分，并汇总错题强化训练，掌握做题技巧及命题规律，使广大考生轻松通过考试。

由于编写时间及水平有限，书中难免有疏漏与不足之处，希望广大考生与学者批评与指正。

考试命题研究委员会

2020 年 3 月

目　录

冲刺模拟卷一 …… (1)

冲刺模拟卷二 …… (11)

冲刺模拟卷三 …… (21)

冲刺模拟卷四 …… (31)

冲刺模拟卷五 …… (41)

冲刺模拟卷六 …… (51)

冲刺模拟卷七 …… (61)

冲刺模拟卷八 …… (71)

冲刺模拟卷九 …… (81)

冲刺模拟卷十 …… (91)


参考答案 …… (101)

姓名_____ 准考证号_____ 单位_____

冲刺模拟卷一

一、单选题：以下每道考题有 **5** 个备选答案，请选择 **1** 个最佳答案。

1. 关于急性上呼吸道感染的流行病学，下列哪项最不可能
   A. 人体对各种病毒感染后产生的免疫力较弱且短暂
   B. 可通过含有病毒的飞沫传播
   C. 本病全年皆可发病，以夏秋季较多
   D. 健康人群中有病毒携带者
   E. 一个人一年内可多次感染
2. 早期胃癌较可靠的诊断方法是
   A. X线钡餐
   B. 反复检测血中糖类抗原
   C. 血胃蛋白酶原
   D. 影像学检查
   E. 针对高危人群反复进行胃镜和病理检查
3. 应首选糖皮质激素治疗的贫血是
   A. 珠蛋白生成障碍性贫血(海洋性贫血)
   B. 遗传性球形红细胞增多症
   C. 慢性病性贫血
   D. 自身免疫性溶血性贫血
   E. 再生障碍性贫血
4. 下列哪种药物可以降低慢性心力衰竭死亡率
   A. 地高辛
   B. 呋塞米(速尿)
   C. 螺内酯(安体舒通)
   D. 硝酸盐
   E. 胺碘酮
5. 用于鉴别原发性和继发性甲状腺功能减退症的指标是
   A. TSH
   B. TT_3
   C. TT_4
   D. FT_3
   E. FT_4
6. 男性，35岁，干部。因洪水暴发下乡救灾，1周后回市，第5天发热、头痛、全身酸痛，随后尿少，尿黄，鼻出血住院。体检：体温39.6℃，巩膜明显黄染.肝肋下2指，有压痛，脾未及，腹股沟淋巴结肿大。实验室检查：总胆红素214 μmol/L，ALT 200 U，HBsAg(+)，尿蛋白(+++)，尿RBC满视野，肥达反应“O”1∶40，“H”1∶320，血清凝溶试验1∶400，患者的诊断是
   A. 急性重症肝炎
   B. 亚急性重症肝炎
   C. 伤寒合并溶血尿毒综合征
   D. 肾综合征出血热
   E. 钩体病黄疸出血型
7. 女性，51岁。口干、眼干1年伴间断双侧腮腺肿大，1个月来双下肢散在红色皮疹，同时伴有全身关节痛，无明显关节肿大。查体发现双下肢散在米粒大小的红色皮疹，压之不褪色。实验室检查：血尿常规正常，血沉120 mm/h，RF阳性1∶640，ANA阳性1∶320，α球蛋白、IgG、IgM、IgA均升高。为明确诊断，下列检查中最有意义的是
   A. 骨髓细胞形态学检查
   B. 唇腺病理检查
   C. 狼疮带试验
   D. 双手关节X线检查
   E. 淋巴结活检
8. 肝硬化患者出现血性腹水，应首先考虑可能合并
   A. 结核性腹膜炎
   B. 原发性腹膜炎
   C. 肝肾综合征
   D. 门静脉血栓形成
   E. 肝硬化癌变
9. 男性，20岁。鼻出血1周，发热、血尿3日。全身广泛点片状出血。血红蛋白50 g/L，白细胞1.0×10^9/L，血小板60×10^9/L，外周血原幼稚细胞20%，应考虑
   A. 重型再生障碍性贫血
   B. 急性白血病
   C. 特发性血小板减少性紫癜
   D. 粒细胞缺乏症
   E. 营养性巨核幼红细胞性贫血
10. 急进型高血压患者大多以下列哪种器官的功能损害最为严重
    A. 肾脏
    B. 心脏
    C. 脑
    D. 肝脏
    E. 视网膜
11. 肺脓肿的主要临床表现，下列哪项是不典型的
    A. 发病急、畏寒、高热
    B. 咳嗽、大量脓痰、咯血
    C. 血白细胞增高伴核左移
    D. 肺部X线片示大片浓密影
    E. 血源性肺脓肿容易出现咳痰，咯血
12. 患者，38岁。进食后常有上腹不适多年，1个月前发作一次右上腹剧痛，无腹膜炎体征，超声内镜如图所示，胆囊病变可能的诊断是
    A. 胆囊积脓



B. 胆囊腺肌病
C. 胆囊癌
D. 胆囊多发息肉
E. 胆囊多发结石

13. 大面积烧伤患者，近日常寒战、高热，呈间歇热，肢冷，发绀，尿量明显减少，很快发生血压下降，休克。其原因可能是
A. 革兰阳性菌败血症
B. 革兰阴性菌败血症
C. 真菌性败血症
D. 厌氧菌性败血症
E. 二重感染

14. 下列哪一项对诊断尿路感染最有意义
A. 清洁中段尿培养细菌计数≥10^5/ml
B. 尿频、尿急、尿痛
C. 畏寒、发热、头痛
D. 清洁中段尿白细胞>5 个/HP
E. 血白细胞计数升高

15. 男性，56 岁。患糖尿病，用胰岛素治疗。晚 10 时突发心悸，多汗，软弱，继而意识不清。P 120 次/分。尿糖(－)，尿酮体(－)；BUN 10.0 mmol/L。最可能的诊断为
A. 低血糖昏迷
B. 高渗性昏迷
C. 酮症酸中毒昏迷
D. 脑血管意外
E. 尿毒症昏迷

16. 目前细菌检查最重要的确诊手段是
A. 抗原检测
B. 细菌培养
C. 细菌遗传物质检测
D. 抗体检测
E. 直接涂片镜检

17. 关于各种影像学检查的临床应用，错误的是
A. 透视检查最主要的缺点是缺乏永久性图像记录
B. 胸部 X 线平片的空间分辨率比 CT 低
C. CT 的密度分辨率比胸部 X 线平片高
D. 床旁胸片的主要缺点是摄片效果差，防护条件差
E. 有心脏起搏器的患者是绝对禁忌证

18. 男性，50 岁。刺激性咳嗽 2 个月，伴胸痛和活动后气促，胸片示双肺中下野弥漫性圆形或类圆形阴影。从事煤矿开采 20 年。最可能的诊断是
A. 硅沉着病
B. 特发性肺间质纤维化
C. 职业性哮喘
D. 变应性肺炎
E. 肺癌

19. 妊娠合并重症肝炎患者，产后当日皮肤黏膜瘀斑，阴道出血不止。下列各项检查中符合该病合并 DIC 诊断的是
A. 血小板 40×10^9/L，纤维蛋白原 1.4 g/L，3P 试验阴性
B. 血小板 50×10^9/L，纤维蛋白原 2.0 g/L，FDP 30 mg/L
C. 血小板 150×10^9/L，3P 试验阴性 PT 20 秒(对照 12 秒)
D. 血小板 40×10^9/L，FDP 65 mg/L，纤维蛋白原 0.9 g/L，PT 20 秒(对照 13 秒)
E. 血小板 80×10^9/L，FDP 20 mg/L，纤维蛋白原 2.0 g/L

20. 风湿性心脏病严重二尖瓣狭窄突发大咯血是由于
A. 肺毛细血管破裂
B. 合并肺结核
C. 急性肺水肿
D. 支气管静脉破裂
E. 合并支气管扩张

21. 女性，29 岁。关节肿痛 5 个月，以双手近端指间关节(DIP)和掌指关节(PIP)为明显，晨僵约 60 分钟，有时伴腕关节疼痛，查体双手关节局部呈梭形肿，压痛(＋)，双腕活动轻度受限，化验 ESR 45 mm/h，RF(－)，X 线片示轻度骨质疏松。最可能的诊断是
A. 强直性脊柱炎
B. 骨质疏松症
C. 类风湿关节炎
D. 骨关节炎
E. 反应性关节炎

22. 急进性肾小球肾炎的病理特征为
A. 肾小球硬化
B. 毛细血管襻灶状坏死
C. 肾小球囊内大量新月体形成
D. 肾间质细胞浸润和纤维化
E. IgG、C3 呈线条状沉积

23. 男性，29 岁。糖尿病史 5 年。近 1 周发热、乏力，嗜睡 2 天，昏迷 5 小时入院。血糖 23.1 mmol/L，血酮(＋＋)，pH 7.2。下列哪项治疗方案是正确的
A. 皮下注射胰岛素加碳酸氢钠静脉注射
B. 补液加小剂量静脉滴注胰岛素
C. 静脉推注胰岛素
D. 小剂量静脉滴注胰岛素治疗加碳酸氢钠静脉滴注
E. 小剂量静脉注射胰岛素治疗加纠正电解质紊乱

24. 女性，79 岁。胃大部切除术后禁食 3 天，每日静脉输入 10%葡萄糖 2 000 ml，5%葡萄糖盐水 500 ml，易发生的水电解质紊乱是
A. 低钠血症
B. 高钠血症
C. 低钙血症
D. 低钾血症
E. 低镁血症

需要全本请访问 www.ertongbook.com

姓名_____ 准考证号_____ 单位_____

25. 肝肾综合征的主要发病机制是
A. 肾小管坏死
B. 肾小球坏死
C. 肾皮质血流量减少
D. 肾单位纤维化
E. 胆红素在肾脏中沉积

二、多选题：以下每道考题有 **5** 个备选答案，每题至少有 **2** 个正确答案。

26. 阻塞性睡眠呼吸暂停/低通气综合征可并发多种疾病，与其无关的是
A. 高血压
B. 神经性头痛
C. 霉菌性肺炎
D. 冠心病
E. 胃食管反流

27. 下列关于骨关节炎的描述，正确的有
A. 好发于中老年人
B. 血沉多增快
C. X 线检查多正常
D. 可累及单关节或多关节
E. 无晨僵表现

28. 缺铁性贫血所致外胚叶营养障碍，临床表现有
A. 毛发干枯脱落
B. 皮肤干燥发皱
C. 指甲扁平或反甲
D. 杵状指
E. 吞咽困难

29. 关于支气管激发试验安全性，描述错误的是
A. FEV_1低于预计值 50%时应该做支气管激发试验
B. 吸入药物浓度应从大剂量开始，逐步减少剂量
C. 试验前应先了解患者的过敏史
D. 现场应备有吸入型 β_2激动剂
E. 试验时需有经验的临床医师在场

30. 恶性疟疾的临床表现包括
A. 不规则持续性高热
B. 血红蛋白尿及肾功能障碍
C. 易复发
D. 红细胞增多
E. 意识障碍

31. 急性弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎的特点是
A. 肾小球内有链球菌菌栓
B. 多见于儿童
C. 肾小球毛细血管腔变窄，甚至闭塞
D. 蛋白尿
E. 上皮下有驼峰状沉积物

32. 男性，76 岁。原发性高血压史 5 年，心房扑动史 2 年，每月发作多次，发作时伴胸闷，未规律治疗，可以选择的一线治疗方案是
A. 导管消融
B. 胺碘酮
C. 阿司匹林
D. 华法林
E. 电复律

33. 关于腺垂体功能减退症的治疗，下列说法正确的有
A. 应针对病因治疗，对于肿瘤等颅内占位性病变必须通过手术、放疗和化疗等措施首先解除压迫及破坏作用，减轻和缓解颅内高压症状
B. 腺垂体功能减退症采用相应靶腺激素替代治疗达到满意疗效后宜缓慢阶梯减量直至停药
C. 腺垂体功能减退症患者在遇到手术、外伤、感染等应激情况时要适量增加糖皮质激素量
D. 腺垂体功能减退症患者进行替代治疗时，应先补给糖皮质激素，然后再补充甲状腺激素
E. 对于垂体性侏儒症患者必须先补给盐皮质激素，然后再补充生长激素，但应防止肿瘤生长

34. 肾动脉狭窄的临床表现有
A. 肾功能进行性减退
B. 轻度蛋白尿
C. 高血压，舒张压升高明显
D. 患侧肾缩小
E. 患侧剧烈腰痛

35. 自体瓣膜感染性心内膜炎的手术适应证包括
A. 主动脉或二尖瓣反流导致血流动力学改变
B. 房室传导阻滞、主动脉瓣脓肿需手术引流及其他严重病变
C. 超声心动图检查证实有赘生物(≥5 mm)
D. 真菌性或其他高度耐药菌性心内膜炎
E. 虽经充分抗生素治疗，仍存在赘生物并反复发作大、中动脉栓塞

36. Ph 染色体可见于
A. 毛细胞白血病
B. 慢性粒细胞白血病
C. 急性髓系白血病
D. 慢性淋巴细胞白血病
E. 急性淋巴细胞白血病

37. 类风湿关节炎的关节外表现有
A. 肺间质病
B. 大量蛋白尿
C. 肺动脉高压
D. 肺纤维化
E. 皮下结节

38. 关于原发性胆汁性肝硬化的描述，正确的是
A. 男性多发
B. 主要的病理学特征是慢性非化脓性破坏性胆管炎
C. 确诊后，首选糖皮质激素或联合硫唑嘌呤治疗
D. 黄疸进行性加重提示预后不良
E. 终末期原发性胆汁性肝硬化适合肝移植治疗

39. 慢性丙型病毒性肝炎抗病毒治疗的适应证包括
A. 血清 HCV－RNA(＋)
B. 抗 HCV(＋)
C. 血清 ALT 升高(除外其他原因)
D. 肝活检证实为慢性肝炎
E. 血清中胆红素升高

40. 心脏压塞时查体可有下列哪些体征
A. 血压下降并脉压变小
B. 奇脉
C. 心动过速
D. 心包摩擦音
E. 颈静脉怒张

41. 糖尿病心血管系统自主神经病变的常见症状包括
A. 快而固定的心率
B. 直立性低血压
C. 无痛性或“哑”型心肌梗死
D. 夜间心率减慢
E. 室上性心房扑动

42. 急性胰腺炎发生的主要病理生理环节有
A. 胰管内高压
B. 胰腺微循环障碍
C. 胆汁在胰管内激活胰酶
D. 细胞内的 Ca^{2+} 水平显著下降
E. NF－κB 不足

43. 需行支气管镜检查的患者有
A. 剧烈干咳，胸片无病变，抗感染治疗无效者
B. 经常出现局限性或一侧性哮鸣音
C. 反复在肺部同一部位发生炎症者
D. 肺不张者
E. 大咯血而无手术条件者

44. 关于糖尿病足的病因与发病机制，叙述正确的有
A. 周围神经病变导致肢体末梢的保护性感觉减退或丧失
B. 足部溃疡合并感染可发生足坏疽
C. 外周血管病变，下肢血供严重减少可导致坏疽
D. 机械性物理性损伤是最常见的发病原因
E. 足底压力分布异常，可导致难治性足溃疡

45. 肝硬化时，门静脉高压症形成的原因有
A. 小叶下静脉受压
B. 肝静脉阻塞
C. 肝内血管床减少
D. 中央静脉及肝静脉窦受压
E. 肝动脉与门静脉异常吻合支形成

三、共用题干题：以下每道考题有 **2～6** 个提问，每个提问有 **5** 个备选答案，请选择 **1** 个最佳答案。

（46～48 题共用题干）

女性，30 岁。患风湿性心脏病，气促、乏力 2 年，超声心动图显示二尖瓣重度狭窄。

46. 患者不需要进行的检查是
A. 食管超声心动图
B. 上、下肢动脉血气分析
C. 心电图
D. INR、PT、CT
E. 胸部 X 线片

47. 减轻瓣膜狭窄的最佳治疗是
A. 目前无介入或手术治疗指征
B. 药物治疗
C. 二尖瓣球囊扩张术
D. 二尖瓣置换术
E. 介入治疗

48. 如果患者心电图显示快速心房颤动，应该使用的药物是
A. 阿司匹林＋地高辛＋β 受体阻滞剂
B. ACEI＋阿司匹林＋地高辛＋β 受体阻滞剂
C. ARB＋阿司匹林＋地高辛＋β 受体阻滞剂
D. 地高辛＋β 受体阻滞剂＋华法林
E. 阿司匹林＋胺碘酮

（49～51 题共用题干）

男性，74 岁。饮酒多年，喝啤酒 150 ml/d。既往 1 年内左跖趾关节急性关节炎发作 2 次。目前无任何自觉症状，无痛风石形成，规律口服别嘌醇 700 mg/d。BMI 28 kg/m^2。实验室检查：血尿酸轻度增高，尿尿酸正常。

49. 目前诊断为
A. 无症状性高尿酸血症
B. 痛风间歇期
C. 慢性痛风性关节炎期
D. 急性痛风性关节炎
E. 痛风性肾病

50. 进一步处理中，不合适的是
A. 建议低嘌呤饮食
B. 多饮水，戒酒

C. 检查有无糖尿病、高血压及高血脂等疾病
D. 增加别嘌醇剂量或联合应用其他降尿酸药物
E. 适当锻炼，减轻体重

51. 若患者经过戒酒、减肥等非药物措施后，血尿酸水平仍未达标，下列处理最合适的是
A. 加用秋水仙碱
B. 停用别嘌醇，改用丙磺舒
C. 加用丙磺舒
D. 加用 NSAID 类药物
E. 加用泼尼松

（52～54 题共用题干）

男性，45 岁。间断头晕、头痛 6 年，症状晨起加重、夜间打鼾伴有胸前不适感和憋气感，日间打瞌睡。诊断高血压 5 年，应用 3 种抗高血压药物（其中包括 1 种利尿性药物）血压仍难以控制在正常范围。血压 190/120 mmHg、体胖、精神疲乏、心电图左室高电压、胸片心脏向左扩大。

52. 最可能的诊断是
A. 神经性头痛
B. 冠心病
C. 阻塞性睡眠呼吸暂停/低通气综合征
D. 心肌病
E. 原发性醛固酮增多症

53. 最需要做的实验室检查是
A. 血常规
B. 血脂
C. 血醛固酮水平
D. 多导睡眠图监测
E. 24 小时血压监测

54. 针对患者血压，可能有效的最佳治疗是
A. 加大降压药的强度
B. 减低体重
C. 调换降压药的品种
D. 治疗阻塞性睡眠呼吸暂停/低通气综合征
E. 改善患者的生活方式

（55～57 题共用题干）

男性，25 岁。间断右下腹痛伴腹泻 6 个月，粪便呈糊状，有时有水样便，发作时 3～6 次/日，无脓血便，粪常规有时可见白细胞，隐血试验阳性；发病以来体重下降 3 kg；2 年前有肛瘘病史，已愈合。结肠镜检查发现盲肠、升结肠黏膜呈铺路石样并有纵行溃疡，回盲瓣多发溃疡，所见回肠末端（约 20 cm）有散在阿弗他溃疡。

55. 该患者最可能的诊断是
A. 倒灌性回肠炎
B. 克罗恩病
C. 肠结核
D. 回盲部癌
E. 肠淋巴瘤

56. 要确诊克罗恩病，活检组织病理检查中最有意义的是
A. 隐窝脓肿
B. 肠腺腺体萎缩
C. 灶状淋巴细胞浸润
D. 非干酪样肉芽肿
E. 杯状细胞减少

57. 要了解该患者消化道病变的范围，还应做的检查是
A. 小肠钡剂造影
B. 腹部 CT 检查
C. 腹部超声检查
D. 血 C 反应蛋白检查
E. 肠系膜上动脉造影

（58～60 题共用题干）

男性，30 岁，农民。因“畏寒、发热、乏力、周身酸痛、轻咳、痰中带血丝 13 日”于 8 月 22 日来诊。查体：T 38℃；结膜充血；腹股沟淋巴结约蚕豆大，有触痛。血常规：Hb 124 g/L，WBC 12×10^9/L，N 0.85，L 0.15；尿常规：尿蛋白（+）。

58. 该患者发热最可能的原因是
A. 流感
B. 伤寒
C. 钩端螺旋体病
D. 白血病
E. 肺结核

59. 为协助诊断，还需要了解的情况是
A. 钩端螺旋体疫水接触史
B. 外伤史
C. 毒物接触史
D. 在外用餐情况
E. 烟酒嗜好

60. 为明确诊断还需要做的实验室检查是
A. 尿常规
B. 粪常规
C. 肾功能
D. 显微肥达凝集试验
E. 尿培养

四、案例分析题：每个案例至少有 **3** 个提问，每个提问有多个备选答案，其中正确答案有 **1** 个或几个。

（61～64 题共用题干）

女性，36 岁。因反复发热 1 个月伴咳嗽入院。病初有流涕、咽痛，继之发热 38℃，伴全身不适。咳嗽无痰，无咯血，呈不规则热型。血白细胞计数 9.1×10^9/L，中性 0.75。X 线检查显示两下肺段片状浸润。既往体健。曾应用过 β-内酰胺类、大环内酯、喹诺酮类、氨基糖苷类，病情无改善。入院体检无阳性发现。

姓名_____ 准考证号_____ 单位_____

61. 进一步完善检查项目应包括
A. hsCRP
B. 血沉
C. 抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)
D. 抗核抗体
E. 结核菌素皮肤试验
F. 胸部 CT
G. 骨髓穿刺
H. 妇科检查

62. 进一步检查重点是(提示：CT 显示两肺后基底段斑片状浸润并见支气管充气征。)
A. 胸部磁共振显影(MRI)
B. 痰找病理细胞
C. 血嗜酸性粒细胞绝对计数
D. 经支气管肺活检
E. 腹部 CT 了解有无腹腔淋巴结肿大
F. PET 扫描
G. 血清肿瘤标志物
H. 血管超声检查

63. 重复 CT 检查，左下叶后基底段病灶有明显吸收，而左上叶出现新的浸润灶。其诊断考虑(提示：纤维支气管镜检查支气管通畅。血管超声检查肺活检病理显示：肺泡腔内炎性细胞浸润，单核细胞为主部分成簇团样分布，肺间质增厚伴少量纤维化。诊断肉芽肿性炎症可能，因组织太少，难以肯定。)
A. 变应性肺炎
B. 隐原性机化性肺炎
C. 肺泡细胞癌
D. 肺淋巴瘤
E. 肺结核病
F. 支气管肺炎
G. 军团菌肺炎
H. 变应性支气管肺曲霉病

64. 下一步检查应是(提示：此时患者体温自行下降已平稳 3 日，痰病理细胞检查，其中一次见可疑癌细胞。)
A. 试验性抗肿瘤化疗
B. 非小细胞肺癌靶向治疗
C. CT 引导下经皮肺活检
D. 超声引导下肺活检
E. 重复纤维支气管镜经支气管肺活检
F. 胸腔镜肺活检
G. 剖胸肺活检
H. 医学观察

(65～67 题共用题干)

男性，52 岁。因“反复腰痛伴肉眼血尿 20 年”来诊。患者 20 年来反复腰痛伴肉眼血尿，腹部 X 线片及 B 超提示双肾结石，经过多次碎石治疗。近 1 年口干，多饮，尿量增多，食欲可，排粪正常。无骨痛、骨折，无发热、乏力、盗汗。查体：肾区叩痛(＋)。

65. 目前应考虑的疾病为
A. 单纯泌尿系结石
B. 痛风
C. 肾小管性酸中毒
D. 原发性甲状旁腺功能亢进症
E. 泌尿系结核
F. 特发性高尿钙症

66. 为明确诊断应检查
A. 尿常规
B. 血电解质，肝、肾功能
C. 血尿酸
D. 血甲状旁腺素
E. 24 小时尿钙、磷
F. 动脉血气分析

67. 以下叙述正确的是[提示：尿常规：RBC 200/μl；血钙 3.00 mmol/L，磷 0.50 mmol/L，ALP 88 U/L，Scr 140 μmol/L，PTH 347 pg/ml(正常值 12～65 pg/ml)；24 小时尿钙 12.35 mmol，磷 13.33 mmol/L；血尿酸、血气分析正常。]
A. 该患者的诊断为原发性甲状旁腺功能亢进症
B. 病变甲状旁腺定位明确后首选甲状旁腺手术
C. 应尽快再次碎石治疗
D. 应用氢氯噻嗪减少尿钙排泄
E. 甲状旁腺手术后泌尿系结石可消失
F. 甲状旁腺术后肾功能可恢复正常

(68～71 题共用题干)

男性，53 岁，陕西农民。因“发热 5 天”来诊。体温最高 39.3℃，无头痛、咽痛；病后按“感冒”予以消炎退热治疗。查体：T 39.0℃，P120 次/分，BP 120/90 mmHg；双侧腋下及肩背部皮肤可见少许出血点，球结膜轻度充血、水肿；双肾区轻度叩痛。实验室检查：血 WBC 13.12×10^9/L，PLT 53×10^9/L；尿蛋白(＋＋)。

68. 最可能的诊断是
A. 肺炎
B. 伤寒
C. 肾综合征出血热(流行性出血热)
D. 败血症
E. 斑疹伤寒
F. 登革热
G. 克里木-刚果出血热(新疆出血热)
H. 恙虫病

69. 对确定诊断有价值的有(提示：入院后高热不退，当晚急查血常规：Hb 162 g/L，WBC 22.49×10^9/L，N 0.89，PLT 46×10^9/L；PTA 0.81，D-二聚体和纤维蛋白原降解产物轻度升高。)

A. 性别
B. 年龄
C. 发病季节
D. 白细胞计数明显增高
E. 发热 6 日
F. 血小板计数明显减低
G. 尿蛋白(＋＋)
H. D-二聚体增多

70. 为了尽快确定诊断,进一步检查是
A. 血培养
B. 从血及其他标本中分离致病病毒
C. 动态检测血、尿常规
D. 肾功能
E. 胸、腹部 CT
F. 出血热抗体检测
G. 应用 RTPCR 检测血清中的出血热病毒 RNA
H. 骨髓穿刺

71. 进一步救治措施是[提示:入院第 3 天查体:T 39.3℃,BP 100/80 mmHg;HR 112 次/分。即报病危,快速静脉滴注平衡盐溶液、清蛋白、血浆和羟乙基淀粉 40 氯化钠(706 代血浆),同时加滴多巴胺。动态复查血常规,白细胞渐升至 37.88×10^9/L,血小板降至 8×10^9/L;尿蛋白(＋＋＋),尿隐血(＋＋＋)。入院不足 48 小时已静脉补入各类液体近 10 000 ml,但血红蛋白仍无下降。]
A. 给予较大剂量退热药
B. 强化生命体征监护
C. 继续液体复苏(即扩充血容量)治疗
D. 凝血功能检测,酌情给予各类止血药及抗纤溶药
E. 应用阿托品或山莨菪碱(654-2)扩张血管,疏通微循环
F. 静脉推注或静脉滴注氢化可的松或地塞米松
G. 根据血气分析结果或经验及时纠正代谢性酸中毒
H. 酌情给予血管收缩类升压药如多巴胺/去甲肾上腺素

(72～74 题共用题干)

女性,46 岁。活动后心悸、气短 20 余年,腹胀、下肢水肿 10 余天。临床诊断:风湿性心脏病、二尖瓣狭窄合并关闭不全,右心衰竭。心电图表现为 P 波消失,代之以不规则的频率 510 次/分的小 f 波,R-R 间期不规则,心室率 146 次/分。

72. 心电图诊断为
A. 心房扑动
B. 心房颤动
C. 窦性心律不齐
D. 房性心动过速
E. 交界性心动过速
F. 持续性室性心动过速

73. 心电图改变符合(提示:患者给予地高辛治疗 2 周,复查心电图,f 波频率 530 次/分,R-R 间期不规则,心室率 86 次/分,以 R 波为主的Ⅰ、Ⅱ、aVF、V_3～V_4 导联 ST 段下斜 0.05～0.10 mV,ST-T 改变呈鱼钩状,Q-T 间期 0.30 秒。)
A. 洋地黄影响
B. 洋地黄毒性反应
C. 低钾血症心电图改变
D. 低钙血症心电图改变
E. 心肌缺血

74. 心电图诊断(提示:患者继续应用洋地黄至第 28 天,腹胀减轻,下肢水肿消失,f 波更为明显,R-R 间期匀齐,QRS 形态呈室上型,心室率 46 次/分。)
A. 心房扑动、交界性逸搏心律
B. 心房颤动、二度房室传导阻滞、交界性逸搏心律
C. 心房颤动、高度房室传导阻滞、交界性逸搏心律
D. 心房颤动、几乎完全性房室传导阻滞、交界性逸搏心律
E. 心房颤动、三度房室传导阻滞、交界性逸搏心律
F. 心房扑动、二度房室传导阻滞、交界性逸搏心律
G. 心房扑动、几乎完全性房室传导阻滞、交界性逸搏心律

(75～77 题共用题干)

女性,60 岁。因“消瘦半年余”来诊。半年来逐渐消瘦、食欲减退,并时有腹泻,无明显腹痛、发热,抗感染治疗无效。近 1 个月乏力明显,懒言、嗜睡。查体:呈恶病质,表情淡漠,皮肤略潮湿,无突眼;甲状腺Ⅰ度肿大,杂音(－);HR 124 次/分;双手细震颤(＋),全身肌肉萎缩明显,肌力 2～3 级。

75. 为明确诊断,应首选的检查是
A. 急诊胃镜
B. 粪培养及血培养
C. 胸部 X 线片,腹部 B 超
D. 颅脑 CT
E. 肌电图
F. 骨髓穿刺
G. TT_3、TT_4、FT_3、FT_4、TSH

76. 你认为可能的诊断是(提示:实验室检查:TT_3、TT_4 正常,FT_3、FT_4 升高,TSH 降低。)
A. 亚急性甲状腺炎
B. 淡漠型甲状腺功能亢进
C. 慢性结肠炎
D. 多发性肌炎
E. 神经症
F. 吉兰-巴雷综合征

77. 该患者的治疗应
A. 使用抗生素消除肠道炎症
B. 抗甲状腺药物控制甲状腺功能亢进
C. 高热量、高蛋白质、高维生素饮食
D. 胺碘酮控制心率
E. 糖皮质激素治疗肌肉病变

姓名_____ 准考证号_____ 单位_____

F. T_3、T_4正常，故首选直接手术切除大部分甲状腺组织

（78～80 题共用题干）

男性，57 岁。反复腹胀，双下肢水肿 3 年，加重 3 日入院。10 年前因风湿性心脏病、二尖瓣狭窄行二尖瓣换瓣术（机械瓣），术后 7 年无明显不适。原发性高血压史 8 年，未规律服药。有长期吸烟史。查体：BP 150/94 mmHg，颈静脉怒张，双肺呼吸音粗，无啰音。心界扩大，心率 110 次/分，心律绝对不齐，二尖瓣区可闻及金属音，P_2略亢进，胸骨左下缘可闻及 4/6 级全收缩期杂音，吸气时增强，余瓣膜区未闻及杂音。肝肿大，双下肢静脉曲张，双踝部水肿。

78. 患者目前的诊断应考虑

A. 肺血栓栓塞

B. 慢性肺源性心脏病

C. 二尖瓣换瓣术后，三尖瓣关闭不全，右心衰竭

D. 高血压性心脏病

E. 心律失常性心肌病

79. 下列检查有助于诊断的是

A. 胸部 X 线片

B. 凝血

C. 下肢血管彩色超声

D. 肺部螺旋 CT

E. 超声心动图

80. 患者应选择的治疗措施包括（提示：肺部螺旋 CT 未发现肺动脉栓塞症；UCG：右心室扩大，金属二尖瓣有轻度反流，肺动脉收缩压 48 mmHg，三尖瓣重度反流。）

A. 利尿，纠正右心衰竭

B. 外科三尖瓣置换

C. 外科三尖瓣成形术

D. 控制高血压

E. 控制心房颤动心室率，华法林抗凝

（81～83 题共用题干）

男性，50 岁。腹泻、腹痛 3 年，加重 20 日。25 年前因左侧睾丸精原细胞瘤行手术切除并放射治疗 7 周。术后粪便一直不成形，1～2 次/日，无黏液、脓血便，无明显腹痛。3 年前无诱因出现腹痛、腹泻，腹痛主要位于左下腹和中下腹，呈绞痛，排粪后无缓解，疼痛尚可忍受，不影响正常工作；排粪次数 3～4 次/日，溏便，有时带黏液。20 日前腹痛加剧，呈持续性疼痛，阵发性加剧，难以忍受，影响夜间休息以及日常工作，并感腹胀。

81. 为明确诊断，首先应检查的项目包括（提示：查体：T 36.5℃，P 80 次/分，R 20 次/分，BP 120/60 mmHg。体型消瘦，巩膜无黄染，腹部平坦，左下腹可见皮肤色素沉着，局部皮肤稍硬，左下腹感压痛，肠鸣音亢进，左侧睾丸缺如。）

A. 血常规

B. 粪常规、寄生虫卵及隐血

C. 腹部立位 X 线平片

D. 腹部 CT

E. 心电图

F. 结肠镜

82. 为明确诊断，下一步可考虑的诊断措施包括[提示：血红蛋白 10.5 g/L，白细胞和血小板计数均正常。肝、肾功能正常。粪检可见大量红、白细胞，无寄生虫及虫卵，隐血（＋）。腹部立位 X 线平片未见异常。]

A. 腹部增强 CT

B. 结肠镜

C. 钡剂灌肠

D. 粪培养

E. D-木糖吸收试验

83. 最可能的诊断是（提示：下消化道造影：乙状结肠见 15 cm 狭窄段，管壁边缘不规则。结肠镜检查：距肛门 40 cm 处肠腔狭窄，黏膜粗糙，有黏膜糜烂、多发斑片状溃疡，触之易出血，活检为黏膜慢性炎。）

A. 溃疡性结肠炎

B. 克罗恩病

C. 放射性肠炎

D. 慢性痢疾

E. 淋巴瘤

（84～89 题共用题干）

女性，25 岁。因“食欲减退，多饮，烦渴，多尿 15 日”来诊。1 型糖尿病病史。查体：身高 160 cm，体重 41 kg；皮肤弹性差，呼吸深大，面色潮红，意识模糊。实验室检查：空腹血糖 22.2 mmol/L；尿糖（＋＋＋），尿酮体（＋＋＋＋）。

84. 为明确诊断，应立即进行的检查项目包括

A. 心电图

B. 血离子测定

C. 血分析

D. 胸部 X 线片

E. 肾功能测定

F. 血脂分析

G. 肝功能测定

85. 最可能的诊断是

A. 乳酸性酸中毒

B. 尿毒症性酸中毒

C. 呼吸性酸中毒

D. 糖尿病酮症酸中毒

E. 糖尿病高渗性昏迷

F. 脑血管意外

G. 感染性休克

86. 该患者的病理生理特点是

A. 酸中毒

B. 严重失水

C. 血酮升高

D. 携氧系统功能正常

E. 电解质紊乱

F. 代谢紊乱

需要全本请访问 www.ertongbook.com

87. 该患者可能出现的电解质紊乱有
A. 因渗透性利尿丧失钾离子
B. 治疗前血钾可正常或偏高
C. 治疗后可出现低血钾
D. 治疗后偶可出现低钙性抽搐
E. 磷酸根离子丢失
F. 低钠血症
G. 低氯血症

88. 对该患者应该首先采取的治疗措施是
A. 饮食控制
B. 大量补充等渗氯化钠溶液
C. 大剂量胰岛素
D. 纠正离子紊乱
E. 大量补充碳酸氢钠溶液
F. 积极控制诱因

89. 低钾血症时，错误的补钾方式是
A. 紧急时缓慢静脉注射 10%氯化钾溶液 20 ml，时间≥10 分钟
B. 每日给 10%氯化钾溶液 30～60 ml，分次口服
C. 10%氯化钾溶液 15～30 ml 加入 5%～10%葡萄糖溶液 100 ml，静脉滴注
D. 10%氯化钾溶液 20 ml 加入 5%葡萄糖溶液 500 ml，静脉滴注
E. 血钾正常后，应立即停止补钾
F. 补钾速度一般不宜超过 30 ml/h
G. 补钾速度一般不宜超过 20 ml/h

姓名_____ 准考证号_____ 单位_____

姓名_____ 准考证号_____ 单位_____

冲刺模拟卷二

一、单选题：以下每道考题有 **5** 个备选答案，请选择 **1** 个最佳答案。

1. 女性，44 岁。支气管哮喘发作 2 天，大汗，发绀，端坐呼吸，有奇脉。应用糖皮质激素应选用
   A. 大剂量口服
   B. 大剂量吸入
   C. 小剂量逐渐递增
   D. 小剂量长疗程
   E. 大剂量静脉注射或滴注
2. 食管癌最典型的临床表现是
   A. 进行性吞咽困难
   B. 咽下疼痛
   C. 咽部异物感
   D. 食物反流
   E. 左锁骨上淋巴结肿大
3. 实验室检查结果为：红细胞平均体积(MCV)78 fl，红细胞平均血红蛋白(MCH)26 pg，红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)28%，可见于下列哪一种贫血
   A. 巨幼细胞贫血
   B. 缺铁性贫血
   C. 再生障碍性贫血
   D. 溶血性贫血
   E. 消化道急性失血后引起的失血性贫血
4. 心力衰竭代偿期，交感神经系统兴奋性增高，但不引起下述哪一种病理生理改变
   A. 心排血量不明显减少
   B. 心肌收缩力增强，心率增快
   C. 外周血管阻力升高
   D. 血液重新分布，使皮肤、肾脏的血流量增多
   E. 心肌耗氧量增加
5. 男性，38 岁。2 个月来智力下降，记忆力减退，体重增加 10 kg，毛发脱落。可能的诊断为
   A. 甲状腺功能亢进症
   B. 脑梗死
   C. 甲状腺功能减退症
   D. 神经衰弱
   E. 单纯性肥胖
6. 男性，21 岁。3 天前受凉后突然出现畏寒、发热，伴左侧耳垂周围肿胀，1 天前出现腹胀、腹痛，伴恶心、呕吐等不适，当地医院急查血淀粉酶为 500 U/L。该患者最可能的诊断为
   A. 急性胃肠炎
   B. 淋巴结炎
   C. 上呼吸道感染
   D. 急性胰腺炎
   E. 流行性腮腺炎并发胰腺炎
7. 女性，65 岁。双下肢皮肤紫癜 1 个月入院。伴有低热，双手小关节、膝关节、踝关节疼痛，无关节肿大，晨僵约 10 分钟。查体见口腔多个龋齿，无关节畸形、肿胀及压痛。化验血常规正常，ANA 1∶160 阳性，RF 1∶320 阳性，抗 SSA 抗体阳性，余自身抗体均阴性。蛋白电泳：γ 球蛋白 30%。该患者最可能诊断是
   A. 类风湿关节炎
   B. 过敏性紫癜
   C. 病毒感染
   D. 原发性干燥综合征
   E. 骨关节炎
8. 男性，45 岁。上腹部隐痛 6 个月，1 天前饮酒后呕咖啡样物，约 150 ml，排柏油样便 200 ml，既往无肝病史。查体：BP 90/55 mmHg，P 110 次/分，上腹部轻压痛，无反跳痛和肌紧张，肠鸣音活跃，化验血红蛋白 90 g/L。其止血措施首选
   A. 垂体后叶素
   B. 巴曲酶(立止血)
   C. 氨甲苯酸
   D. 奥美拉唑
   E. 三腔二囊管
9. 急性白血病患者，出现头痛，恶心呕吐，脑脊液压力增高，蛋白质增多，细胞大多为白血病细胞。鞘内注射首选药物为
   A. 环磷酰胺
   B. 三尖杉酯酶碱
   C. 长春新碱
   D. 甲氨蝶呤
   E. 6-巯基嘌呤
10. 女性，55 岁。近 1 个月来每天午睡或夜间发生胸骨后压迫性疼痛，每次持续 10 分钟，含硝酸甘油 5 分钟缓解，临床诊断变异性心绞痛，胸痛发作时心电图的改变应是
    A. 有关导联有异常 Q 波
    B. 有关导联的 ST 段下移
    C. 心电图无变化
    D. 有关导联 T 波倒置
    E. 有关导联的 ST 段抬高
11. 支气管扩张最常见的临床表现是
    A. 慢性咳嗽、咳痰、反复感染
    B. 间断咯血
    C. 气短
    D. 胸痛
    E. 消瘦、贫血
12. 血清胃泌素增高伴胃酸增高，见于
    A. 胃泌素瘤
    B. 慢性萎缩性胃窦胃炎

C. 胰岛 B 细胞瘤
D. 慢性萎缩性胃体胃炎
E. 十二指肠球部溃疡

13. 女性，26 岁。2 个月前患肝炎住院。近日门诊复查，血化验结果：ALT 30 U/L，HAV－IgM(－)，HAV－IgG(＋)，抗 HBs(＋)，抗 HBc(＋)，此时诊断为
A. 甲型肝炎恢复期
B. 乙型肝炎急性期与甲型肝炎感染后状态
C. 乙型肝炎恢复期与甲型肝炎感染后状态
D. 非甲非乙型肝炎
E. 甲型肝炎与乙型肝炎混合感染

14. 肉眼血尿反复发作，最常见于
A. 急进性肾小球肾炎
B. 过敏性紫癜肾炎
C. IgA 肾病
D. 急性肾小球肾炎
E. 狼疮性肾小球肾炎

15. 中年男性，肥胖症，伴高血压，糖耐量减低，尿皮质醇、17－羟类固醇增高，但可被小剂量地塞米松所抑制。诊断可能是
A. Cushing 病
B. 甲状腺功能减退症
C. 糖尿病
D. 肾上腺皮质腺瘤
E. 单纯性肥胖症

16. 关于心电图波形的含义，错误的是
A. P 波为心房除极波
B. Q－T 间期为心室除极和复极全过程所需的时间
C. QBS 波群为心室除极波
D. T 波为心室复极波
E. P－R(Q)间期为心房除极终了至心室除极开始的时间

17. 下丘脑激素调节腺垂体促激素分泌，是通过
A. 下丘脑垂体神经束
B. 神经递质
C. 激素第二信使
D. 下丘脑激素代谢产物
E. 垂体门脉系统

18. 张力性气胸时，胸膜腔内的压力通常为
A. ＜－10 cmH_2O
B. －10～－5 cmH_2O
C. －5～0 cmH_2O
D. 0～＋10 cmH_2O
E. ＞＋10 cmH_2O

19. 外周血反应骨髓的造血功能准确的指标是
A. 出现有核红细胞
B. 血红蛋白与红细胞计数
C. 网织红细胞百分数
D. 网织红细胞绝对值
E. 红细胞出现 Howell－Jolly 小体

20. 目前我国最易引起心房颤动的疾病是
A. 风湿性心脏病、二尖瓣狭窄
B. 甲状腺功能减退症
C. 急性心肌梗死
D. 高血压心脏病
E. 感染性心内膜炎

21. 男性，32 岁，农民。面部水肿，乏力 1 个月。双耳郭见冻疮样皮疹，双手指、足趾掌侧见充血性红斑，尿蛋白(＋＋＋＋)，颗粒管型(＋＋)，ANA(＋)颗粒型，抗 SSA 抗体(＋)。最可能的诊断是
A. 干燥综合征
B. 慢性肾炎
C. 急进性肾炎
D. 系统性红斑狼疮
E. 系统性红斑狼疮＋干燥综合征

22. 急性肾小球肾炎(链球菌感染后肾炎)的发病机制主要是
A. 基底膜抗体介导
B. 沉着的循环免疫复合物介导
C. 原位形成免疫复合物介导
D. 细胞免疫介导
E. 其他炎症介导

23. 关于肥胖症的病因，叙述错误的是
A. 肥胖症是遗传和环境因素共同导致的
B. 某些心理疾病也与肥胖症的发生有关
C. 体力活动减少导致肥胖症风险增加
D. 高热量的快餐类食物可使患肥胖症风险增加
E. 低出生体重患儿成年后肥胖症风险小，而出生体重过重则成年后肥胖症风险增加

24. 关于蛋白尿，下列哪一项是错误的
A. 大、中、小分子均有的蛋白尿见于肾小球肾炎
B. β_2微量白蛋白尿见于早期糖尿病肾病
C. β_2微球蛋白尿为微小病变型肾病的特征
D. 溢出性蛋白尿见于多发性骨髓瘤
E. 分泌性蛋白尿见于肾小管间质疾病

25. 高三酰甘油(甘油三酯)血症作为急性胰腺炎的病因之一，血三酰甘油水平应
A. ＞2.3 mmol/L
B. ＞11.0 mmol/L
C. 达到正常上限的 3 倍
D. ＞20.0 mmol/L
E. 达到正常上限的 3 倍，伴血胆固醇升高

姓名_____ 准考证号_____ 单位_____

二、多选题：以下每道考题有 **5** 个备选答案，每题至少有 **2** 个正确答案。

26. 关于医院获得性肺炎的描述哪些是正确的
A. 患者入院时不存在、也不处于潜伏期的感染
B. 入院 72 小时后在医院内发生的肺炎
C. 无感染高危因素，常见病原体是肺炎链球菌
D. 有感染高危因素，常见病原体是金黄色葡萄球菌
E. 临床表现、实验室和影像学检查的诊断特异性低

27. 下述哪种疾病属于风湿性疾病的范畴
A. 系统性红斑狼疮
B. 干燥综合征
C. 骨关节炎
D. 特发性血小板减少性紫癜
E. 强直性脊柱炎

28. 输血可加重病情的疾病包括
A. 珠蛋白生成障碍性贫血（地中海贫血）
B. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症
C. 再生障碍性贫血
D. 自身免疫性溶血性贫血
E. G－6－PD 缺乏

29. 下列哪些是肺癌诊断的可疑线索
A. 男性 40 岁以上，有长期吸烟史
B. 咳嗽治疗无效或持续痰中带血
C. 反复发作的阻塞性肺炎
D. 肺内类圆形阴影或肺门阴影增宽
E. 双肺广泛哮鸣音

30. 目前国内流行性脑脊髓膜炎的主要菌群有
A. A 群
B. B 群
C. C 群
D. D 群
E. W135 群

31. 全身急性感染引起的急性间质性肾炎，下列哪些是正确的
A. 都是由细菌、病毒或其毒素直接侵犯肾脏引起的间质性炎症
B. 肾间质可见局灶性或弥漫性炎症
C. 有全身急性感染症状及肾脏损害的表现
D. 中段尿培养可无细菌生长
E. 治疗原则为积极治疗全身感染，适当给予糖皮质激素

32. 影响动脉血压的因素有
A. 骨骼肌的挤压作用
B. 心排血量
C. 体位改变
D. 大动脉的弹性
E. 总外周阻力

33. 药物减重的目标是
A. 使体重恢复到正常范围
B. 使原体重减轻 5%～10%
C. 最好能逐步接近理想体重
D. 减重后维持体重不再反弹和增加
E. 使降血压、降血糖、调节血脂药物能更好地发挥作用

34. 尿毒症时常见的电解质紊乱有
A. 高血钾
B. 高血磷
C. 低血钙
D. 低血钾
E. 轻度高镁血症

35. 主动脉瓣狭窄患者常出现心绞痛症状的原因为
A. 冠状动脉灌注压降低
B. 心肌耗氧增加
C. 左心室肥厚，心肌毛细血管密度相对减少
D. 严重冠状动脉狭窄
E. 心室收缩压升高，射血时间延长

36. 红细胞生成的造血原料有
A. 维生素 B_{12} 和叶酸
B. 维生素 K
C. 铁质
D. 蛋白质
E. 维生素 C

37. 易患骨性关节炎的人群是
A. 肥胖
B. 老年女性
C. 局部外伤史
D. 年轻女性
E. 举重运动员

38. 原发性胆汁性肝硬化患者的典型实验室检查可见
A. 血清氨基转移酶升高 5 倍以上
B. 血清总胆汁酸升高
C. 血清抗线粒体抗体阳性
D. 血清 IgM 升高
E. B 型超声可见胆总管明显扩张

39. 伤寒皮疹的特点有
A. 多见于病程第 7～13 天
B. 直径 2～4 mm
C. 多在 10 个以上，分批出现
D. 多分布于胸、腹部

E. 多在2～4日内消退

40. 心房颤动发生血栓栓塞事件的中危因素包括
A. 年龄≥75岁
B. 脑卒中
C. 心功能不全和(或)充血性心力衰竭
D. 原发性高血压
E. 糖尿病

41. 影响肾素-血管紧张素-醛固酮系统水平测定的药物有
A. 螺内酯
B. β受体阻滞剂
C. 血管紧张素转化酶抑制剂
D. 噻嗪类利尿剂
E. 血管紧张素受体拮抗剂

42. 关于慢性萎缩性胃炎，下列说法正确的是
A. 可同时伴有胃体黏膜灶性萎缩
B. 可伴有浅表性胃炎
C. 可能与幽门螺杆菌无关
D. 可能与胆汁反流有关
E. 治疗时不能用抗酸或抑酸药物

43. 肺气肿患者肺功能检查常提示有
A. 阻塞性通气功能障碍
B. 限制性通气功能障碍
C. 弥散功能降低
D. 气道阻力升高
E. 支气管激发试验阳性

44. 容易发生桥本甲状腺炎的有
A. 先天性性腺发育不全
B. 高碘饮食
C. 低碘饮食
D. 妊娠
E. 斑秃

45. 肝性脑病的少见病因是
A. 病毒性肝硬化
B. 酒精性肝硬化
C. 原发性肝癌
D. 严重的胆道感染
E. 妊娠期急性脂肪肝

三、共用题干题：以下每道考题有**2～6**个提问，每个提问有**5**个备选答案，请选择**1**个最佳答案。

（46～48题共用题干）

男性，45岁。LVEF 25%，扩张型心肌病，NYHA分级Ⅲ级。

46. 下列治疗药物中最佳组合是
A. ACEI＋利尿剂
B. ACEI＋利尿剂＋地高辛＋Betaloc平片
C. ACEI＋利尿剂＋地高辛＋Betaloc缓释片
D. ARB＋利尿剂＋地高辛
E. ARB＋地高辛

47. 常规治疗疗效不佳，你准备加用螺内酯，你向患者解释
A. 在常规治疗的基础上加用螺内酯，并不能降低病死率和致残率
B. 在常规治疗的基础上加用螺内酯，仅降低心力衰竭的住院率，不改善NYHA分级
C. 在常规治疗的基础上加用螺内酯，可降低重症心力衰竭患者的病死率和住院率
D. 螺内酯获益的人群是没有进行心力衰竭常规治疗的患者
E. 在常规治疗的基础上加用螺内酯，不仅降低心力衰竭的住院率，还可改善NYHA分极

48. 下列药物不宜应用，除外
A. 钙通道阻滞剂
B. 普罗帕酮
C. 辅酶Q10
D. 维生素E
E. ACEI

（49～51题共用题干）

男性，47岁。因“多尿、口干、多饮10年，下肢麻木4年，右足底溃破1个月”来诊。查体：右足温暖，足背动脉搏动良好，右足底近第3跖趾关节处有一2 cm×2 cm被胼胝包围的溃疡，表面无脓性分泌物，周围组织无红肿。空腹血糖13.8 mmol/L。

49. 根据糖尿病足Wagner分级法，该患者糖尿病足属于
A. 1级
B. 2级
C. 3级
D. 4级
E. 5级

50. 为进一步评估该患者糖尿病足病，优先考虑的检查是
A. 下肢血管造影
B. 经皮氧分压测定
C. 足X线片
D. 神经系统检查，特别是足部压力测定
E. 应用探针探查

51. 对于该患者足溃疡的治疗，必不可少的措施是
A. 抗感染治疗
B. 减轻足底压力
C. 改善循环功能
D. 戒烟
E. 修剪胼胝

（52～54题共用题干）

男性，57岁。进行性胸闷、气短、咳嗽，少量白痰，偶有双手关节疼痛，无关节红肿，肺CT示双下肺片状团块状影，肺功能DL_{CO} 41%，经治疗后上述症状有所好转，1年后出现低热，右手第

需要全本请访问 www.ertongbook.com