

引摇摇言

课 标 展 示

了解人类探索物质结构的过程。

了解研究物质结构、揭示物质结构与性能的关系,对于提高人类的生活和化学科学发展的意义。

培养学生运用辩证唯物主义观点认识物质运动规律的能力。

思 考 导 学

对原子的认识,原子结构模型的演变过程

道尔顿原子模型→汤姆生原子模型→卢瑟福原子模型→玻尔原子模型→电子云模型。由于道尔顿最早提出了原子论,合理解释了当时的一些化学现象和规律,给化学奠定了唯物主义理论基石,所以道尔顿被誉为近代化学之父。从原子结构模型的演变过程可以看出,人类对原子结构的认识过程是逐步深入的。随着现代科学技术的发展,科学家已能利用电子显微镜和扫描隧道显微镜来拍摄表示原子图像的照片,并且能在晶体硅表面上用探针对硅原子进行“搬迁”,我们现在所学习的科学理论,还会随着人类对客观事物的认识而不断地深入和发展。

道尔顿原子论的主要内容有三点

① 一切物质都是由不可见的,不可再分割的原子组成,原子不能自生自灭。

② 同种类的原子在质量、形状和性质上都完全相同,不同种类的原子则不同。

③ 每一种物质都是由它自己的原子组成的。单质是由简单原子组成的,化合物是由复杂原子组成的,而复杂原子又是由为数不多的简单原子所组成。复杂原子的质量等于组成它的简单原子的质量总和。

结构决定性质

有的分子组成相同,却有不同性质。例如,乙醇($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)

和二甲醚($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$),前者与水互溶而后者不能。像乙醇和二甲醚这样的组成相同而结构不同的物质被称为同分异构体。同分异构体的存在说明,物质的结构也是决定物质性质的重要因素。

研究物质结构的意义

化学科学发展在化学合成技术上所取得的巨大成就,使化学家能合成或从自然界分离出更多的新物质,以满足人类的需要。

整 合 提 升

物质的组成与结构决定了物质的性质与变化;物质性质的改变是物质的组成与结构发生了变化的结果。

应 用 点 拨

【例 1】有关元素周期表的叙述正确的是(摇摇)

① 元素周期表是由苏联化学家门捷列夫初绘
② 门捷列夫是在梦中想到的周期表

③ 最初元素周期表是按原子内质子数由少到多排的

④ 初排元素周期表时共有元素 22 种

点拨: ① 是错误的,元素周期表由门捷列夫排列,他是俄国人; ② 是错误的,初排元素周期表是按原子量由小到大排列的; ③ 是错误的,初排元素周期表时共有元素 22 种; ④ 正确,多日研究导致了梦中的图像。

答案: ④

【例 2】已知短周期元素的离子, A^{2+} 、 B^{+} 、 C^{3-} 、 D^{2-} 都具有相同的电子层结构,则下列叙述正确的是(摇摇)

① 原子半径: $\text{A} > \text{B} > \text{C} > \text{D}$

② 原子序数: $\text{B} > \text{A} > \text{D} > \text{C}$

③ 离子半径: $\text{C} > \text{D} > \text{B} > \text{A}$

阅读单质的还原性 粤跃月跃悦跃悦

摇摇点拨 四种元素在周期表中的位置为：

	悦摇摇
月摇摇	

摇摇由此可推知,原子半径为 月跃粤跃悦跃悦,原子序数为 葬跃遭跃糟跃糟单质的还原性为 月跃粤跃悦跃悦

答案 悦

【例】猿 摇在物质结构研究的历史上,首先提出原子是一个实心球体的是(摇摇)

粤 汤姆生 摇摇 月 卢瑟福

悦 道尔顿 摇摇 阅 玻尔

摇摇点拨 汤姆生发现了电子,提出了原子内有电子学说,卢瑟福利用 α 粒子撞击发现原子有内核,道尔顿认为原子是实心球体,玻尔是提出核外存在电子运转的轨道。

答案 悦

体 验 交 流

员 摇在自然界中形成化合物种类最多的元素是(摇摇)

粤 碳 摇摇 月 氢 摇摇 悦 氧 摇摇 阅 氮

圆 摇再两种元素的原子的质子数之和为 圆 两元素形成的化合物在水溶液中能电离出电子层结构相同的阴阳离子,则 载 再形成的化合物是(摇摇)

粤 氯化铵 摇摇

月 氯化钾

悦 硫酸铵 摇摇

阅 硫酸钾

猿 摇已知碳元素有两种常见的同位素¹²C、¹³C,氧有三种同位素¹⁶O、¹⁷O、¹⁸O,由这五种微粒构成的¹²C₂¹⁶O₂分子中,其式量可能有(摇摇)

粤 44 种 摇摇

月 45 种

悦 46 种 摇摇

阅 47 种

源 摇今有 粤 月 两种原子,粤原子的核外 酝 层比 月原子的 酝 层少 猿 个电子,月原子的 蕴 层电子数恰好是 粤 原子 蕴 层电子数的 圆 倍。粤 和 月 分别是(摇摇)

粤 铝 和 氧 摇摇

月 锂 和 氟

悦 钠 和 镁 摇摇

阅 钾 和 钙

缘 摇居里夫人发现的镭是元素周期表中第 苑 周期第 II 族元素,下列关于镭的性质的描述中不正确的是(摇摇)

粤 在化合物中呈 垣 圆 价

月 单质能使水分解,放出氢气

悦 氢氧化物呈两性

阅 碳酸盐难溶于水

透 载 再 在 和 砸 分别代表四种元素。如果 葬 遭 糟 凿 四种离子的电子层结构相同(葬 遭 糟 凿 为元素的原子序数),则下列关系正确的是(摇摇)

粤 葬 葬 糟 遭 皂 月 葬 葬 遭 遭 皂

悦 遭 遭 凿 遭 垣 摇摇 阅 葬 遭 凿 遭 垣 皂

苑 摇两种元素原子的核外电子层数之比与最外层电子数之比相等,则在周期表的前 员 圆 号元素中,满足上述关系的元素共有(摇摇)

粤 员 对 摇摇 阅 圆 对 摇摇 悦 袁 对 摇摇 阅 原 对

愿 摇具有相同质子数的两种粒子(摇摇)

粤 一定是同种元素

月 一定是一种分子和一种离子

悦 一定是不同离子

阅 无法判断

怨 摇¹H、¹³C、¹⁵N(核磁共振)、³¹P 可用于测定蛋白质、核酸等生物大分子的空间结构,运 载 宰 遭 糟 凿 等人因此获得 圆 圆 年诺贝尔化学奖。下面有关¹³C 叙述正确的是(摇摇)

粤 ¹³C 和 ¹²C 有相同的中子数

月 ¹³C 和 ¹⁴C 互为同素异形体

悦 ¹³C 与 ¹²C 互为同位素

阅 ¹³C 的核外电子数与中子数相同

员 摇下列叙述中,正确的是(摇摇)

粤 在多电子的原子中,能量高的电子通常在离核近的区域活动

月 核外电子总是先排在能量低的电子层上

悦 两种微粒,若核外电子排布完全相同,则其化学性质一定相同

阅 微粒的最外层只能是 愿 个电子才稳定

员 摇载 元素的阳离子和 再 元素的阴离子具有与 氢 原子相同的电子层结构,下列叙述正确的是(摇摇)

粤 载 的原子序数比 再 小

月 载 原子的最外层电子数比 再 多

悦 载 原子的半径比 再 大

阅 载 元素的最高价比 再 小

员 摇从某微粒的原子结构示意图反映出(摇

摇)

粤爱质子数和中子数

月爱中子数和电子数

悦爱核电荷数和核外电子层排布的电子数

阅爱质量数和核外电子层排布的电子数

员爱根据中学化学教材所附元素周期表判断,

下列叙述不正确的是(摇摇)

粤爱运层电子为奇数的所有元素所在族的序数

与该元素原子的 运层电子数相等

月爱蕴层电子为奇数的所有元素所在族的序数

与该元素原子的 蕴层电子数相等

悦爱蕴层电子为偶数的所有主族元素所在族的

序数与该元素原子的 蕴层电子数相等

阅爱运层电子为奇数的所有主族元素所在族的

序数与该元素原子的 运层电子数相等

员爱美国科学家将两种元素铅和氮的原子核对

撞,获得一种质子数为 员愿中子数为 员缘的超重元

素,该元素原子核内的中子数与核外电子数之差是

(摇摇)

粤爱缘摇摇月爱愿摇摇悦爱远摇摇阅爱圆猿猿

摇摇员援粤月悦三种元素的原子具有相同的电子层数,而且月的核电荷数比粤大圆悦的质子数比月多源员粤与水反应生成员早匀,这时粤转化成晕的电子层结构,则粤月悦是什么元素?

员援有灾宰载再在五种元素,它们的核电荷数依次增大,且都小于圆园其中载在是金属元素;灾和在元素原子的最外层都只有一个电子;宰和再元素原子的最外层电子数相同,且宰原子蕴层电子数是运层电子数的猿倍;载元素原子的最外层电子数是再元素原子最外层电子数的一半。由此推知(填元素符号)灾_____宰_____载_____再_____在_____,并写出在宰与灾宰反应的化学方程式摇摇。

第一章

原子结构与性质

第一节 原子结构

课标展示

了解原子核外电子的运动状态,掌握原子结构的构造原理,知道原子核外电子的能级分布、电子云和原子轨道。

能用电子排布式表示 1~18 号元素原子核外电子的排布。

了解能量最低原理,知道基态、激发态以及与光谱之间的关系,学会应用泡利原理、洪特规则填充核外电子。

思考导学

了解人类对原子结构的认识历史

(员 德谟克利特的古代原子学说

古希腊哲学家德谟克利特是原子学说的奠基人,他认为原子是构成物质的微粒。万物都是由间断的、不可分的微粒即原子构成的,原子的结合和分离是万物变化的根本原因。

(圆 道尔顿的近代原子学说

英国科学家道尔顿是近代原子学说的创始人。他认为物质都是由原子构成的,原子是不可分割的实心球体,同种原子的质量和性质都相同。

(猿 汤姆逊的“西瓜式”原子结构模型

英国科学家汤姆逊发现了电子。他认为原子是一个平均分布着正电荷的粒子,其中镶嵌着许多电子,中和了正电荷,从而形成中性原子。

电子的发现使人们认识到原子是可以再分的。

(源 卢瑟福的带核原子结构模型

英国物理学家卢瑟福根据 α 粒子散射现象,指

出 原子是由原子核和核外电子组成的,原子核带正电荷,位于原子中心,它几乎集中了原子的全部质量,电子带负电荷,在原子核周围空间作高速运动,就像行星环绕太阳运转一样。

(缘 玻尔的轨道原子结构模型

丹麦物理学家玻尔通过光谱研究,指出:电子在原子核外一定轨道上绕核作高速运动。

(远 电子云模型(现代原子结构学说)

现代科学家根据微观世界的波粒二象性规律,提出用量子力学的方法描述核外电子运动,即用电子云描述核外电子的运动。

了解能层与能级

(员 能层

① 定义 在多电子的原子核外电子的能量是不同的,按电子的能量差异,可以将核外电子分成不同的能层。

② 表示方法及各能层所容纳的最多电子数:

能层 一 二 三 四 五 六 七 ……

符号 一号 运 蕴 酝 晕 韵 孕 匝 ……

最多电子数 圆 愿 员愿 圆缘 圆愿 圆缘 圆 ……

(圆 能级

① 定义 在多电子的原子中,同一能层的电子,能量也可能不同,还可以把它们分成能级。

② 能级表示方法及各能级所容纳的最多的电子数:

能层	K	L	M	N	
能级	1s	2s 2p	3s 3p 3d	4s 4p 4d 4f	5s 5p ……
最多电子数	2	2 6	2 6 10	2 6 10 14	2 6 ……

了解构造原理

(员 随着原子核电荷数的递增,绝大多数元素

的原子核外电子的排布将遵循课本图 1-12 的排布顺序。人们把它称为构造原理。

(圆) 电子排布式可以简化,如可以把钠的电子排布式写成 $[\text{Ne}]3s^1$ 。

能量最低原理、基态与激发态、光谱

原子的电子排布遵循构造原理,能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

(员) 基态原子:处于最低能量的原子叫基态原子。当基态原子的电子吸收能量后,电子会跃迁到较高能级,变成激发态原子。

(圆) 原子光谱:不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,可以用光谱仪摄取各种元素的电子的吸收光谱或发射光谱,总称为原子光谱。

电子云和原子轨道

(员) 电子云

当电子在原子核外很小的空间内作高速运动时,其运动规律跟普通物体不同,它们没有确定的轨道。因此,它们不能同时准确地测定电子在某一时刻所处的位置和运动的速度,也不能描画出它的运动轨迹。我们在描述核外电子的运动时,只能指出它在原子核外空间某处出现机会的多少。电子在原子核外空间一定范围内出现,可以想像为一团带负电荷的云雾笼罩在原子核周围,所以,人们形象地把它叫做“电子云”。电子云密度大的地方,表明电子在核外空间单位体积内出现的机会多;电子云密度小的地方,表明电子在核外空间单位体积内出现的机会少。即只能确定它在原子核各处出现的概率。

电子云图为概率分布图。氢原子的电子云呈球形对称,在离核近的地方电子云密度大,离核远的地方电子云密度小,说明在离核近的地方单位体积内电子出现的机会多,在离核远的地方单位体积内电子出现的机会少。

(圆) 核外电子运动的波粒二象性

波粒二象性是微观粒子的基本属性之一。因此电子的运动不能像经典力学中确定宏观物体的运动状态一样,同时用位置和速度的物理量来准确描述它的运动状态。海森堡(与爱因斯坦等)认为微观粒子的位置与动量之间应有以下的测不准关系: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$ 。 Δx 为确定粒子位置时的不准量, Δp 为确定粒子动量时的不准值, h 为普朗克常数($h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)。

原子轨道

常把电子出现的概率约为 90% 的空间圈出来,人们把这种电子云轮廓图称为原子轨道。量子力学研究表明,处于同一电子层的原子核外电子,也可以在不同类型的原子轨道上运动,轨道类型不同,轨道的形状也不同。用小写的英文字母 s、p、d、f 分别表示不同形状的轨道, s 轨道呈球形, p 轨道呈纺锤形, d 轨道和 f 轨道比较复杂。

整合提升

在每一个能层中,能级符号的顺序是 s、p、d、f (s 代表能层)。任一能层的能级总是从 s 能级开始,而且能级数等于该能层序数:第一能层只有 1 个能级 (s),第二能层有 2 个能级 (s 和 p),第三能层有 3 个能级 (s、p 和 d),依次类推。以 s、p、d、f 排序的各能级可容纳的最多电子数依次为 2、6、10、14 的两倍!

根据构造原理,只要知道原子序数(等于核电荷数),就可以写出几乎所有元素原子的电子排布,这样的电子排布是基态原子的,如 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ 称为电子排布式,从电子排布式可以看出电子先排在能量低的能层里。在同一能层中也是先排在能量低的能级里。以 s、p、d、f 排序的各能级可容纳的最多电子数依次为 2、6、10、14 的两倍!而量子力学的理论指出,在等价轨道上(同一能级)的电子排布全充满和全空状态具有较低的能量和较大的稳定性。

相对稳定的状态:全充满 s^2, p^6, d^5, f^7 全空 s^0, p^0, d^0, f^0 半充满 s^1, p^3, d^5, f^7 的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ 或 $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$ 而不是 $[\text{Ar}]3d^4 4s^2$,对铬原子而言,外围电子呈 $3d^5 4s^1$ 排布时, $3d$ 轨道上的电子均为半满状态,整个体系的能量最低。

(员) 形状相同的原子轨道在原子核外还有不同的伸展方向。 s 轨道是球形对称的,所以 s 能级只有 1 个轨道。

从课本图 1-12 可见, s 电子的原子轨道都是球形的(原子核位于球心),能层序数 n 越大,原子轨道的半径越大。这是由于 $1s, 2s, 3s, \dots$ 电子的能量依次增高,电子在离核更远的区域出现的概率逐渐增大,电子云越来越向更大的空间扩展。这是不难理解的,打个比喻,神州五号必须依靠推动(提供能量)才能克服地球引力上天, $2s$ 电子比 $1s$ 电子能量高,克服原子核的吸引在离核更远的空间出现的概

率就比 $1s$ 大,因而 $1s$ 电子云必然比 $2s$ 电子云更扩散。

从课本图 1-15 可见,跟 $1s$ 电子不同, $2s$ 电子的原子轨道是纺锤形的,每个 $2s$ 能级有 1 个原子轨道,它们相互垂直,分别以 $2s_x$ 、 $2s_y$ 和 $2s_z$ 为符号。而且, $2s$ 电子原子轨道的平均半径也随 n 增大而增大。

$2s$ 能级有 3 个伸展方向 3 个轨道, $3s$ 能级有 1 个伸展方向 1 个轨道。

(3) 多电子原子中,电子填充电子轨道时,原子轨道能量的高低存在以下规律:

① 相同电子层上原子轨道能量的高低:

$2s < 2p_x < 2p_y < 2p_z$

② 形状相同的原子轨道能量的高低:

$1s < 2s < 3s < 4s < 5s < 6s < 7s$...

③ 相同电子层和形状相同的原子轨道的能量相等,如 $2p_x = 2p_y = 2p_z$ 轨道的能量相等。

(4) 电子的“自旋”运动

原子核外电子还有一种称为“自旋”的运动。原子核外电子的自旋可以有两种不同的状态,通常用向上箭头“ $\uparrow$ ”和向下箭头“ $\downarrow$ ”来表示这两种不同的自旋状态。当然,“电子自旋”并非真像地球绕轴自旋一样,它只是代表电子的两种不同状态。

(5) 电子在排布时必须遵循以下规律

① 能量最低原理:原子核外电子先占有能量低的轨道,然后再依次进入能量较高的轨道,这样使整个原子处于最低的能量状态。

② 泡利不相容原理:每个原子轨道上最多只能容纳两个自旋状态不同的电子。

③ 洪特规则:原子核外电子在能量相同的各个轨道上排布时,电子尽可能分占不同的原子轨道,且自旋状态相同,这样整个原子的能量最低。

应用点拨

【例 1】氢原子的电子云图中小黑点表示的意义是()

解析:小黑点表示一个电子

选项:黑点的多少表示电子个数的多少

选项:表示电子运动的轨迹

选项:表示电子在核外空间出现机会的多少


点拨:在电子云图中,小黑点并不代表电子,小黑点代表电子在核外空间区域内出现的机会,小黑点的疏密与电子在该区域内出现机会的大小成正比。

答案:选项

【例 2】下列属于短周期中不同主族的元素,其原子的最外层电子中,成对电子和未成对电子占据的轨道数相等,若该元素的原子序数为 10,则元素原子序数为()

解析:短周期元素中,原子序数为 10 的元素是氖,其最外层电子排布为 $2s^2 2p^6$,成对电子和未成对电子占据的轨道数相等。

点拨:短周期元素中,原子序数为 10 的元素是氖,其最外层电子排布为 $2s^2 2p^6$,成对电子和未成对电子占据的轨道数相等。



从中看出,原子序数为 10 的氖和原子序数为 18 的氩符合题意要求,即其成对电子占据的轨道数和不成对电子占据的轨道数相等。分别设该元素为硼,序数为 5,可能为铝、氧、硫,序数分别为 13、8、16,依次类推可得 10、18。

答案:选项

【例 3】下列是两个原子的电子排布情况,试分析有无错误,若有,违反了什么原则?




点拨:泡利原理:在同一个原子轨道内的电子的自旋方向是相反的。而(1)中的第三个轨道中的两个电子自旋方向完全相同,所以排布错误违反了泡利不相容原理。

洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道时,总是优先单独占据一个轨道,而且自旋方向相同。而(2)中的第三个轨道内的电子的自旋方向与前两个轨道的电子自旋方向相反,排布违反了洪特规则。

答案:(1) 违反了洪特规则 (2) 违反了泡利不相容原理。

【例 4】下列各原子或离子的电子排布式错误的是()



摇摇点拨 根据构造原理,第n能级最多可容纳 $2n^2$ 个电子,第n能级有 n 个轨道最多可容纳 2n 个电子,电子总是从能量低的能层、能级排列,其中 1s² 是原子得两个电子形成的稳定的结构,所以第三能层中的电子排布应为 3s²。

答案 见

体 验 交 流

汤姆逊的原子学说曾经起了很大的作用。他的学说中包含有下述三个论点:① 原子是不能再分的粒子;② 同种元素原子的各种性质和质量都相同;③ 原子是微小的实心球体。从现代的观点看,你认为这三个论点中,不确切的是(摇摇)

粤爱只有③ 摇摇摇摇 月爱只有①③

悦爱只有②③ 摇摇摇摇 阅爱①②③

圆爱下列能级中原子轨道数为 3 的是(摇摇)

粤爱第n能级 摇摇 月爱第n能级

悦爱第n能级 摇摇 阅爱第n能级

猿爱下列各能层中,原子轨道的数目为 16 的是(摇摇)

粤爱第n层 摇摇 月爱第n层

悦爱第n层 摇摇 阅爱第n层

源爱以下电子排布式属于基态原子的电子排布的是(摇摇)

粤爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s² 摇摇 月爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹

悦爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹ 摇摇 阅爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²

缘爱主族元素原子失去最外层电子形成阳离子,主族元素的原子得到电子填充在最外层形成阴离子。下列各原子或离子的电子排布式错误的是(摇摇)

粤爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s² 摇摇 月爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹

悦爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹ 摇摇 阅爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²

悦爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹ 摇摇 阅爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²

阅爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s² 摇摇 阅爱 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²

透爱下列各过程中一定吸收能量的是(摇摇)

粤爱原子光谱 摇摇 月爱发射光谱

悦爱吸收光谱 摇摇 阅爱激发态到基态

苑爱原子核外 第n能层最多可以容纳的电子数为(摇摇)

粤爱 2n² 摇摇 月爱 n² 摇摇 悦爱 n 摇摇 阅爱 n

愿爱下列各能层中不包含 d 能级的是(摇摇)

粤爱第n能层 摇摇 月爱第n能层

悦爱第n能层 摇摇 阅爱第n能层

怨爱科学家们预测在宇宙中存在完全由反粒子构成的物质——反物质(反粒子是与普通粒子质

量、电量相同而电性相反的微粒)。目前,一些欧美科研机构宣布已制得反氢原子。试推测反氢原子的结构(摇摇)

粤爱由一个带正电荷的质子与一个带负电荷的电子构成

月爱由一个带负电荷的质子与一个带正电荷的电子构成

悦爱由一个带正电荷的中子与一个带负电荷的电子构成

阅爱由一个带负电荷的质子与一个带负电荷的电子构成

员爱首次将量子化概念应用到原子结构,并解释原子稳定性的科学家是(摇摇)

粤爱道尔顿 摇摇 月爱爱因斯坦

悦爱玻尔 摇摇 阅爱普朗克

员爱下面关于多电子原子核外电子的运动规律的叙述正确的是(摇摇)

粤爱核外电子是分层运动的

月爱所有电子在同一区域里运动

悦爱能量高的电子在离核近的区域运动

阅爱能量低的电子在离核近的区域运动

员爱确定一个电子的运动状态需要哪几个量(摇摇)

粤爱能层、能级

月爱能层、能级、伸展方向

悦爱能层、能级、伸展方向、自旋状态

阅爱无法确定

员爱下列有关说法正确的是(摇摇)





粤爱电子绕核旋转,其轨道为一圆圈

月爱电子将走肆字形

悦爱原子轨道就是电子云

阅爱一般电子出现几率约为 90% 的区域称为原子轨道

员爱下列轨道表示式所表示的元素原子中,其能量处于最低状态的是(摇摇)



摇摇员援有第 源周期的 粤月悦阅四种元素,其价电子数依次为 员圆圆苑其原子序数依次增大。已知粤与月的次外层电子数为 愿而悦与阅的为 愿 根据原子结构,判断:

(员 哪些是金属元素?摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇

(圆 阅与 粤的简单离子是什么?并写出其离子的电子排布式。摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇

(猿 氢氧化物碱性最强的是摇摇摇摇摇摇摇摇。

(源 月与 阅两原子间能形成化合物的化学式?摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇。

员援写出具有下列电子排布的原子的核电荷数、名称、元素符号及在周期表中的位置。

(员 员圆圆圆圆苑猿猿猿猿

(圆 员圆圆圆圆苑猿猿猿猿猿猿猿猿

(猿 员圆圆圆圆苑猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿

员援根据下列叙述,写出元素名称画出原子结构示意图,并写出核外电子排布式。

(员 粤元素原子核外 酝层电子数是 蕴层电子数的一半:_____。

(圆 月元素原子的最外层电子数是次外层电子数的 员缘倍:_____。

(猿 悦元素的单质在常温下可与水剧烈反应,产生的气体能使带火星的木条复燃:_____。

(源 阅元素的次外层电子数是最外层电子数的 员源:_____。

员援(员 某元素原子的电子排布式为 员圆圆圆圆苑猿猿,则此元素的核电荷数为_____。

(圆 某元素原子的价电子构型是 猿猿猿,则此元素在元素周期表中的位置为_____。

(猿 请写出 圆号元素钙的原子的电子排布式_____。

员援写出下列原子的电子排布式。

(员 杂 (圆 悦 (猿 悦 (源 猿 (缘 猿 在土

(远 云藻

(员 _____ 摇

(圆 _____ 摇

(猿 _____ 摇

(源 _____ 摇

(缘 _____ 摇

(远 _____ 摇

圆援(员 短周期的元素 粤月粤原子最外层电子为 葬个,次外层电子数为 遭个;月原子 酝层电子数为 (葬原遭个,蕴层为 (葬垣遭个,则 粤为_____,月为_____。

(圆 已知 载元素 蕴层比 再元素 蕴层少 猿个电子,再元素原子核外电子总数比 载元素多 缘个,则载再分别为_____、_____。

第二节 原子结构与元素的性质

课 标 展 示

员援认识原子结构与元素周期系的关系,了解元素周期系的应用价值。

圆援学会利用外围电子排布规律,对元素周期表进行分区。

猿援理解元素的电离能、电负性等概念的具体涵义以及原子半径、第一电离能、电负性的周期性变化。

源援弄清元素的电负性与元素的性质以及化合物类型之间的关系。

缘援利用课堂知识,培养激发学生对化学学习的

热情。

思 考 导 学

员援原子结构与元素周期表

(员 族的判断标准

猿援对主族元素 主族元素的族序数 越原子的最外层电子层的电子数

遭援对副族元素 次外层电子数多于 愿个而少于 愿个的一些元素,它们除了能失去最外层的电子外,还能失去次外层上的一部分电子。例如元素钪 [粤则猿猿源,总共可以失去三个电子,钪为 Ⅲ 月族。所以,失去的(或参加反应的)电子总数,就等于该

元素所在的族次。除第Ⅷ族元素外,其大多族次等于(灶原员 啮或译)的电子数。

④ 元素所在周期的判断标准 元素所在的周期数等于该元素原子的电子层数。即第 员周期元素原子有 员个电子层,第 猿周期元素有 猿个电子层。

周期数 越电子层数

⑤ 元素周期律

① 元素周期律 元素的性质随核电荷数递增发生周期性的递变,称为元素周期律。

② 原子半径

③ 电离能

① 定义 气态电中性基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量叫做第一电离能。

② 注意 上述表述中的“气态”“基态”“电中性”“失去一个电子”等都是保证“最低能量”的条件。

④ 电负性

① 电负性 用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力的大小。电负性的概念是由美国化学家鲍林提出的,鲍林利用实验数据进行了理论计算,以氟的电负性为 源.猿和锂的电负性为 员.猿作为相对标准,得出了各元素的电负性,电负性越大的原子,对键合电子的吸引力越大。

整合提升

① 原子半径

① 影响原子半径大小的因素:

① 电子能层数 电子的能层越多,电子之间负电排斥使原子的半径增大。

② 核电荷数 核电荷数越大,核对电子的引力也就越大,使原子半径减小。

③ 原子半径的变化规律:

随原子序数的递增,原子半径发生周期性变化。

同周期元素,自左到右,原子半径逐渐减小。同主族元素,自上而下,原子半径逐渐增大。

④ 元素第一电离能与原子的核外电子排布的关系

第一电离能的变化与元素原子的核外电子排布有关。通常情况下,当原子核外电子排布的能量相等的轨道上形成全空(贵、啮、粤、半满(贵、啮、粤和全满(贵、啮、粤)结构时,原子的能量较低,该元素具有较大的第一电离能。

⑤ 影响电离能的因素

电离能的数量大小主要取决于原子的核电荷数、原子半径以及原子的电子构型。一般来说,同

一周期的元素具有相同的电子层数,从左到右核电荷数增大,原子的半径减小,核对外层电子的引力加大,因此,越靠右的元素,越不易失去电子,电离能也就越大。同一族元素电子层数不同,最外层电子数相同,原子半径增大起主要作用,因此半径越大,核对电子引力越小,越易失去电子,电离能也就越小。电子构型是影响电离能的第三个因素,各周期中稀有气体元素的电离能最大,原因是由于稀有气体元素的原子具有相对稳定的 愿电子(匀豫为 圆电子)最外层构型。某些元素具有全充满或半充满的电子构型,稳定性也较高。如 在比猿(源)、悦(源)、匀(缘)、匀(缘)比同周期相邻元素的电离能大。又如 晕、韵、粤等元素也比左右邻居的电离能大,也是因为它们都具有半充满的 灶费轨道的缘故。

⑥ 元素电负性数值的大小可用于衡量元素的金属性、非金属性的强弱。电负性数值越大,元素的非金属性越强,金属性越弱;电负性数值越小,元素的非金属性越弱,金属性越强。一般电负性大于 员.猿的元素为非金属元素。电负性最大的元素为氟,电负性最小的为铯。而位于非金属三角区边界的“类金属”(如锗、锑等)的电负性则在 员.猿左右,它们既有金属性,又有非金属性。

⑦ 电负性数值的大小能够衡量元素在化合物中吸引电子能力的大小。电负性数值小的元素在化合物中吸引电子的能力弱,元素的化合价为正值;电负性数值大的元素在化合物中吸引电子的能力强,元素的化合价为负值。如:晕、韵中,晕、韵电负性数值 匀的大于 晕、韵的,故 晕、韵中 晕显正价,匀显负价。

⑧ 当其他条件相同时,两个电负性相差很大的元素化合通常就形成离子键。例如,钠与氯的电负性相差 园.猿,所以 晕、韵是一种离子化合物。电负性相差不大的两种非金属元素化合,通常形成共价键。若电负性差等于零或者非常小,则形成的共价键是非极性键。电负性差别越大,共价键的极性也就越大,共用电子对偏向电负性大的原子越厉害。例如,我们可以预料,卤化氢中 匀、云是极性最强的分子,而 匀、氮是极性最弱的分子。

应用点拨

【例 员 摇下列叙述中正确的是(摇摇)

粤 同周期元素中,Ⅶ粤族元素的原子半径最大
月 Ⅵ粤族元素的原子,其半径越大,越容易得到电子

悦室温时,零族元素的单质都是气体
阅同一周期中,碱金属元素的第一电离能最小

摇摇点拨 :本题主要考查元素周期表中,同周期、同主族元素性质的一些递变规律。粤项错,在同周期元素中Ⅶ粤族元素的原子半径小。月项不正确,因为在同主族元素中,原子半径越大,越难得电子。悦项正确,阅项正确,同周期中,碱金属元素的第一电离能最小。

解答本题的关键是熟练掌握元素周期律和元素周期表的知识,并学会用一些具体实例来举证一些选项是错误的。

答案 :悦阅

【例 圆 摇摇栽再 在三种元素的原子,其最外层电子排布分别为 灶燥猿猿猿猿猿和 园燥园燥,由这三种元素组成的化合物的化学式可能是 (摇摇)

粤栽栽再在摇摇摇摇摇摇月栽栽再在
悦栽栽再在摇摇 阅栽栽再在

摇摇点拨 :由三种元素原子的最外层电子排布可知,栽为第 隲族的元素,化合价为 垣园,再为 粤族化合价为 垣猿而 在为 韵族化合价为 原园形成的化合物应为化合价代数和为 园所以可以看出为 粤

答案 :粤

【例 猿 摇摇甲元素是第 猿周期 责区元素,其最低化合价为 原员价 乙元素是第 源周期 凿区元素,其最高化合价为 垣原价,填写下表 :


元素	价电子排布	周期	族	金属或非金属
甲				
乙				

摇摇点拨 :根据题意,甲元素处于周期表 责区,为主族元素,其最低化合价为 原员价,则它的价电子排布为 猿燥猿猿,所以甲为第 猿周期Ⅶ粤的非金属元素 乙元素处于第 源周期 凿区,其最高化合价为 垣原价,所以它的价电子排布为 猿燥源,是Ⅳ月的金属元素。

答案 :

元素	价电子排布	周期	族	金属或非金属
甲	猿燥猿猿	猿	Ⅶ粤	非金属
乙	猿燥源	源	Ⅳ月	金属

摇摇【例 源 摇摇不同元素的气态原子失去最外层一个电子所需要的能量 (设其为 耘)如下图所示。



试根据元素在周期表中的位置,分析图中曲线的变化特点,并回答下列问题:

(1) 同主族内不同元素的 I_1 值变化的特点是 逐渐减小。各主族中 I_1 值的这种变化特点体现了元素性质的 周期性 变化规律。

(2) 同周期内,随原子序数增大, I_1 值增大。但个别元素的 I_1 值出现反常现象。试预测下列关系式中正确的是 ①③ (填写编号)。

- ① $I_1(\text{As}) > I_1(\text{Se})$ ② $I_1(\text{As}) < I_1(\text{Se})$
 ③ $I_1(\text{Br}) > I_1(\text{Se})$ ④ $I_1(\text{Br}) < I_1(\text{Se})$

(3) 估计气态 As 原子失去最外层一个电子所需能量 I_1 值的范围: 485 ~ 738 kJ/mol 。

(4) 19号元素 I_1 值较大的原因是 该元素为稀有气体,原子结构稳定。

点拨: 此题考查了元素第一电离能的变化规律和学生的归纳总结能力。

(1) 从 Li 到 Fr 等可以看出,同主族元素随元素原子序数的增大, I_1 值变小;从 Li 到 Ne 等可以看出,同周期元素 I_1 值呈现明显的周期性。

(2) 从第二、三周期可以看出,第ⅢA和ⅥA族元素比同周期相邻两种元素 I_1 值都低。由此可以推测:

$I_1(\text{As}) > I_1(\text{Se})$ 、 $I_1(\text{Br}) > I_1(\text{Se})$

(3) 根据同主族、同周期规律可以推测:

$I_1(\text{As}) > I_1(\text{Se})$ 、 $I_1(\text{Br}) > I_1(\text{Se})$ 。

(4) 19号元素是稀有气体氩,该元素原子的最外层电子排布已达到稀有气体稳定结构。

答案: (1) 随着原子序数增大, I_1 值变小;同周期 (2) ①③ (3) $485 \sim 738$ (4) 19号元素为氩。该元素原子的最外层电子排布已达到稀有气体稳定结构

体验交流

下列各原子的第一电离能最小的是 ()

已知再元素同周期,其电负性 逐渐增大,下列说法错误的是 ()

第一电离能再必小于

气态氧化物稳定性:再大于再

最高价含氧酸的酸性:再对应的酸性强于再对应的

再和再形成化合物时,再显负价。

下列说法中错误的是 ()

所有的非金属元素都分布在区

元素周期表中ⅢA族到ⅡA族 个纵行的元素都是金属元素

除氦以外的稀有气体原子的最外层电子数都是 8

同一元素的各种同位素的物理性质、化学性质均相同

的杂化,三种元素比较,正确的是 ()

电负性:再 > 再 > 再 原子半径:再 > 再 > 再

电负性:再 > 再 > 再 原子半径:再 > 再 > 再

电负性:再 > 再 > 再 原子半径:再 > 再 > 再

电负性:再 > 再 > 再 原子半径:再 > 再 > 再

下列各组元素中,第一电离能大小顺序正确的是 ()

再 > 再 > 再

再 > 再 > 再

再 > 再 > 再

再 > 再 > 再

下列说法中正确的是 ()

在所有元素中,氟的第一电离能最大

第 3 周期所含元素中钠的第一电离能最小

第一电离能:再 > 再

钾的第一电离能比镁的第一电离能大

再元素的阳离子和再元素的阴离子具有相同的电子层结构,下列叙述正确的是 ()

再原子序数 > 再 原子半径:再 > 再

离子半径:再 > 再 电负性:再 > 再

下列说法中正确的是 ()

非金属元素呈现的最高化合价不超过该元素原子的最外层电子数

非金属元素呈现的最低化合价,其绝对值等于该元素原子的最外层电子数

最外层有 8 个电子的原子都是金属原子

最外层有 3 个电子的原子都是非金属原子

下列关于稀有气体的叙述不正确的是 ()

各原子轨道电子均已填满

其原子与同周期ⅠA、ⅡA族阳离子具有相同的核外电子排布

化学性质非常不活泼

20世纪中叶,门捷列夫总结了如图所示的元素性质的变化情况。请回答 50~51 题。

族 周期	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VI	VII	A	0
1	非金属性逐渐增强								
2	金属性逐渐增强 B AlSi GeAs SbTe PoAt 非金属性逐渐增强 稀有气体元素								
3									
4									
5									
6									
7									金属性逐渐增强

(员) 写出元素符号：粤

元素	锂	铯	铷
失去第一个电子	容易	容易	容易
失去第二个电子	困难	困难	困难

完善发展

一、核外电子构造原理

核外电子是分能层排布的,每个能层又分为不同的能级。

核外电子的排布遵循以下三个原理:

① 能量最低原理

② 泡利原理

③ 洪特规则(及洪特规则特例)

能级高低顺序

构造原理

二、元素周期表与元素性质的关系

元素在周期表中的位置,反映了该元素的原子结构和一定的性质。因此,可以根据某元素在周期表的位置,推测它的原子结构和某些性质;同样,也可根据元素的原子结构,推测它在周期表中的位置。

① 元素的金属性和非金属性与元素在周期表中位置的关系:

同周期:从左到右,随原子序数递增,原子半径逐渐减小,失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。

同主族:从上往下,随原子序数递增,原子半径逐渐增大,失电子能力逐渐增强,得电子能力逐渐减弱,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。

② 元素化合价与元素在周期表中位置的关系:

价电子:元素原子的最外电子层中的电子称为价电子(对副族元素原子,部分倒数第二层或倒数第三层中的电子也可能成为价电子)。

主族元素所在的族数 越该元素的最高正化合价 越价电子数

主族元素的最低负化合价的绝对值 越该元素最高正化合价

③ 元素化学性质与元素在周期表中位置的关系

同周期:从左到右,随原子序数递增,元素最高价氧化物对应水化物的酸性(碱性)逐渐增强(减弱),气态氢化物的稳定性逐渐增强。

同主族:从上往下,随原子序数递增,元素最高

价氧化物对应水化物的碱性(酸性)逐渐增强(减弱),气态氢化物的稳定性逐渐减弱。


三、运用周期表的解题方法

元素在周期表中的位置是元素一定性质的总和,而元素的性质又取决于原子的结构,因此,三者之间存在着如下图所示的关系。

利用三者之间的关系于解题过程常有如下几种方法:

- ① 通过计算再推理判断——计算推导法;
- ② 逐一举例讨论,淘汰错误假设——列举讨论法;
- ③ 抓住元素关键性质确定位置,逐步求解——定位法;

④ 应用周期表的结构推算元素在周期表中的位置——周期表结构推算法;



创新演练

英国科学家詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克(核磁共振)、英国科学家威尔逊和威尔逊可用于测定蛋白质、核酸等生物大分子的空间结构,英国科学家威尔逊和威尔逊等人为此获得1962年诺贝尔化学奖。下面有关沃森和威尔逊的叙述中正确的是(摇摇)

沃森和威尔逊有相同的中子数

沃森和威尔逊电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

沃森和威尔逊互为同位素

沃森和威尔逊的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

以下元素的原子半径递变规律是(摇摇)

铍、铝、硅、磷、硫、氯、溴、碘、砷、硒、碲、钨、钼、钽、铌、钍、铀、镭、钫、铯、铷、钾、钠、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖、氩、氪、氙、氡

下列基态原子的电子构型中,正确的是(摇摇)

铍: $1s^2 2s^2$ 铝: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

钨: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ 钼: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

钽: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ 铌: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

铍、铝、硅、磷、硫、氯、溴、碘、砷、硒、碲、钨、钼、钽、铌、钍、铀、镭、钫、铯、铷、钾、钠、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖、氩、氪、氙、氡

电子构型分别为 _____、_____、
_____和_____。

④第四周期元素中，d轨道半充满的是 _____，f轨道半充满的是 _____，s轨道半充满的是 _____，价层中 s电子数与 p电子数相同的是 _____。

⑤粤、月、悦、阅为原子序数小于 20 的四种元素：
① 粤的原子电子层数等于最外层电子数；
② 粤与 月处于同一周期，月与 阅可形成离子化合物 阅月，该化合物的水溶液显碱性；
③ 悦的离子核内质子数与核外电子数之和为 20；
④ 粤、悦、阅三种元素的离子具有相同的电子层排布。推断 粤、阅各为何种元素，并填空：
(员) 粤 _____，月 _____，悦 _____，阅 _____。
(圆) 各原子形成简单离子的电子式。

⑥四种元素离子半径的大小顺序为 _____
_____。
(源) 用离子方程式表示 阅月水溶液呈碱性的原因。

⑦主族元素和副族元素的电子排布有什么不同的特征？主族元素的价电子层和副族元素的价电子层有何不同？

⑧粤、月、悦三种元素的原子最后一个电子填充在相同的能级轨道上，月的核电荷比 粤大 2 个单位，悦的质子数比 月多 2 个，员与 粤的单质同酸反应置换出 员早氢气，同时转化为具有氦原子的电子层结构的离子。判断 粤、月、悦各为何元素，并写出

粤、月分别与 悦反应的化学方程式。

⑨某元素的同位素 粤，它的氯化物 粤悦早溶于水制成溶液后，加入 员皂 粤的 粤的溶液 粤，恰好完全反应。若这种同位素原子核内有 圆个中子，求：
(员) 粤在值和 粤值；
(圆) 粤元素在周期表中的位置；
(猿) 把 粤的单质放入水中，有何现象？写出反应的化学方程式。

⑩某核素 砸具有微弱放射性，其原子核内中子数比质子数多 2。由它组成的固体单质 粤，在一定条件下密度为 2.70 g/cm³。用 粤射线研究其固体表明：在边长为 员 cm 的立方体中含有 圆个原子。砸在化学反应中常表现为 垣价、垣价，在溶液中 砸稳定，而 砸具有强氧化性，可将 粤氧化为 粤。氧化物 砸的性质与 云有些类似。砸的另一种质量数比 砸少 2 的同位素较为稳定，与铁可形成合金，在潮湿的环境中易形成铁锈。砸的单质及化合物在工业生产、医疗卫生、科学技术等各个领域都有很多用途，请回答：
(员) 砸原子的摩尔质量为 _____ 摇。
(圆) 外围电子排布式 _____ 摇。
(猿) 砸元素处于周期表中的位置 _____ 摇。
(源) 使少量 砸加入到 云溶液中，会发生反应，其离子方程式为 _____ 摇。
(缘) 砸因具有氧化性，被大量用于油漆涂料，涂在钢铁表面，有利于形成耐腐蚀的钝化层。砸与定量的 粤反应，生成 砸的氧化物、砸的硝酸盐和水三种物质。此反应的方程式为 _____ 摇。

第二章

分子结构与性质

第一节 共价键

课标展示

了解知道共价键的主要类型中 σ 键和 π 键的形成过程。

了解学会判断共价键中的 σ 键和 π 键。

了解能用键能、键长、键角等键参数说明简单分子的某些性质。

了解能结合实例说明“等电子原理”的应用。

了解发展学习化学的兴趣、乐于探究物质结构的奥秘。

思考导学

一、共价键

了解共价键理论的形成

1916年美国化学家路易斯为了说明分子的形成,提出了共价键理论,他认为分子中每个原子应具有稳定的稀有气体原子的电子层结构,但这种稳定结构不是靠电子的得失,而是通过原子间共用一对或若干对电子来实现。这种分子中原子间通过共用电子对结合而成的化学键称为共价键。

了解共价键的特点

在形成共价键时,互相结合的原子既未失去电子,也没有得到电子,而是共用电子,在分子中并不存在离子而只有原子,因此共价键与离子键有着显著的差别,它具有如下特点:

(1) 共价键的饱和性。共价键的形成条件之一是原子中必须有成单电子,由于一个原子的一个成单电子只能与另一个成单电子配对,形成一个共价单键,因此一个原子有几个成单电子(包括激发

后形成的单电子)便可与另外几个成单电子配对成键。例如氢原子 $1s$ 轨道的 1 个电子与另一个氢原子 $1s$ 轨道上的 1 个电子配对,形成 H_2 分子后,每个氢原子就不再具有成单电子了,若再有第三个氢原子与 H_2 靠近,也不可能再成键,故不能结合成 H_3 分子。又如氯原子最外层有一个成单的 $3p$ 电子,它只能同另一个氢原子的 $1s$ 电子配对形成一个共价键,不可能结合成 ClH_2 。所以说共价键有饱和性。

所谓饱和性是指每个原子成键的总数或以单键连接的原子数目是一定的。这是因为共价键是由原子间轨道重叠和共用电子形成的,而每个原子能提供的轨道和成单电子数目是一定的。

(2) 共价键的方向性。根据原子轨道最大重叠原理,在形成共价键时,原子总是尽可能沿着原子轨道最大重叠的方向成键。轨道重叠越多,共价键越稳定。由于原子轨道在空间有一定取向,除了 s 轨道呈球形对称外, p 轨道在空间都有一定的伸展方向。在形成共价键时,除了 s 轨道与 s 轨道之间可以在任何方向上都能达到最大程度的重叠外, p 轨道的重叠,只有沿着一定的方向才能发生最大程度的重叠,故共价键是有方向性的。

了解共价键的键型

(1) σ 键

① H_2 分子里的“ $s-s$ 键”。

课本图 2-1-1 H_2 的 $s-s$ 键的形成

② HCl 分子里的“ $s-p$ 键”。

课本图 2-1-2 HCl 的 $s-p$ 键的形成

③ Cl_2 分子里的“ $p-p$ 键”。

课本图 2-1-3 Cl_2 的 $p-p$ 键的形式。

σ 键的形成小结: H_2 分子里的 σ 键是由两个 s