2005年（下）高等教育自学考试全国统一命题考试

病理学试卷及参考答案

（考试时间 150分钟）

题　号	一	二	三	四	五	总　分	
题　分	25	10	15	35	15	核分人	
得　分						复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（本大题共 25小题，每小题 1分，共 25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 细胞病理学发展阶段主要采用的疾病观察、研究手段和方法是（　　）

A. 核酸探针　　B. 细胞培养

C. 光学显微镜　　D. 免疫组织化学

2. 新月体性肾小球肾炎的特征性病变是（　　）

A. 中性粒细胞渗出于肾小囊内　　B. 肾小囊上皮细胞增生

C. 肾小球内皮细胞增生　　D. 毛细血管基底膜增厚

3. 流行性脑脊髓膜炎的典型病变是属于（　　）

A. 纤维素性炎　　B. 化脓性炎

C. 浆液性炎　　D. 出血性炎

4. 痈的基本病理变化是（　　）

A. 纤维素性炎　　B. 浆液性卡他性炎

C. 化脓性炎　　D. 出血性炎

5. 引起急性细菌性前列腺炎的常见细菌是（　　）

A. 大肠杆菌　　B. 绿脓杆菌

C. 肺炎双球菌　　D. 草绿色链球菌

6. 关于幼年型糖尿病发病错误的描述是（　　）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

A.与营养及饮食有关　　B.与遗传因素有关

C.与病毒感染有关　　D.自身免疫反应

7.肾母细胞瘤的特点是（　　）

A.好发于成年人　　B.可见未分化的肾胚芽组织

C.肿瘤体积较小　　D.生物学特性为良性

8.有关生物性致癌因素,根据目前的知识,不正确的是（　　）

A. EB病毒与鼻咽癌的发生有关

B. EB病毒与 Burkitt淋巴瘤发生有关

C.人乳头瘤病毒(HPV)与肝癌发生有关

D.人乳头瘤病毒(HPV)与子宫颈癌的发生有关

9.毛细血管内增生性肾小球肾炎是一种（　　）

A.以变质为主的炎症　　B.以渗出为主的炎症

C.以增生为主的炎症　　D.以出血为主的炎症

10.关于胃溃疡病,溃疡的描述不正确的是（　　）

A.溃疡多单发,直径在 2cm以内,圆形,边缘整齐

B.溃疡多单发,直径多大于 2cm,近似圆形,边缘不整齐

C.溃疡底部平坦洁净,深达粘膜下层甚至可更深

D.溃疡周围胃粘膜皱襞以溃疡为中心呈放射状

11.造成血浆胶体渗透压降低的主要原因是（　　）

A.血浆白蛋白减少　　B.血浆球蛋白减少

C.血浆珠蛋白减少　　D.血钠含量减少

12.慢性支气管炎产生大量粘液痰的组织学基础是（　　）

A.粘液“渗出”　　B.炎症渗出

C.支气管炎症　　D.支气管粘液腺增生

13.门脉性肝硬变,假小叶的病理组织学特征,不含有的病变是（　　）

A.肝细胞再生的结节

B.肝细胞大片坏死

C.广泛增生的纤维组织将肝小叶分割包绕成大小不等的肝细胞团

D.小叶内中央静脉缺如、偏位或有两个以上

14. 关于结节性甲状腺肿的错误描述是 ( )

A. 单一的球形结节，有完整的纤维性包膜　B. 多发结节，结节多无完整的包膜

C. 发病与缺碘有关　D. 结节内可有出血、坏死和钙化

15. 前列腺癌最易转移到 ( )

A. 心　B. 肺

C. 肝　D. 骨

16. 甲状腺癌中发病数量多，而恶性度较低，五年生存率较高的类型是 ( )

A. 滤泡性腺癌　B. 乳头状腺癌

C. 髓样癌　D. 未分化癌

17. 有关肿瘤的大小，不正确的是 ( )

A. 巨大的肿瘤多为良性　B. 巨大的肿瘤多为恶性

C. 巨大的肿瘤可发生在体表　D. 巨大的肿瘤多发生在腹腔

18. 高血压患者脑最严重的并发症是 ( )

A. 萎缩　B. 高血压脑病

C. 囊性变　D. 脑出血

19. 关于慢性纤维空洞型肺结核，下述描述中错误的是 ( )

A. 常在肺上部有一个或多个厚壁空洞

B. 常伴有肺内弥漫散在分布的粟粒性结核

C. 结核菌可沿支气管在肺内播散

D. 空洞内血管受累破溃可引起大咯血

20. 关于原发性肺结核下述不正确的描述是 ( )

A. 多发生于儿童　B. 肺原发灶并有肺门淋巴结结核

C. 肺内病变进展时常在肺内形成结核球　D. 肺内病变进展时常发生血道播散

21. 下述中不属于大骨节病的骨关节病变是 ( )

A. 关节软骨坏死并溃疡形成　B. 关节内游离体

C. 骨瘤　D. 骺板软骨变性坏死

22. 阿米巴痢疾肠道溃疡特点是 ( )

A. 溃疡呈椭圆形，其长径与肠管长轴平行

B. 溃疡呈带状，边缘参差不齐，其长径与肠管长轴垂直

C.溃疡呈口小底大烧瓶状,边缘呈潜行性

D.溃疡呈大小不等形状不一的浅表溃疡

23.下列哪项不是肉芽肿性炎的常见病因？ (　　)

A.结核杆菌　　B.乙型脑炎病毒

C.伤寒杆菌　　D.梅毒螺旋体

24.引起亚急性细菌性心内膜炎常见细菌是 (　　)

A.草绿色链球菌　　B.金黄色葡萄球菌

C.肠球菌　　D.白色念珠菌

25.临床上最易发生种植性转移的肿瘤是 (　　)

A.甲状腺癌　　B.股骨肉瘤

C.胃粘液癌　　D.阴茎鳞癌

得　分	评卷人	复查人

二、多项选择题 (本大题共 5小题,每小题 2分,共 10分)在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

26.门静脉高压形成的侧支循环包括 (　　)

A.食管下段静脉丛　　B.直肠静脉丛

C.脐周围静脉网　　D.下肢静脉

E.肝静脉

27.慢性活动性肝炎,肝细胞坏死的特征性表现是 (　　)

A.弥漫性分布的点状坏死　　B.碎片状坏死

C.桥接坏死　　D.弥漫性大片坏死

E.嗜酸性坏死

28.在中毒型细菌性痢疾中常出现 (　　)

A.结肠假膜性炎　　B.结肠滤泡性炎

C.中毒性休克　　D.腹泻及典型的粘液脓血便

E.中毒性脑病

29.关于脑动脉粥样硬化的描述中正确的是 (　　)

A.病变以大脑中动脉和脑底 Willis环最显著　　B.可导致脑回变窄及脑沟变宽等脑萎缩

C.可引起智力减退　　D.可引起脑出血

E.可引起弥漫性脑水肿

30.以下有关硅肺的特点正确的是　　(　　)

A.以肺炎症及纤维化为主要特点　　B.是与机体免疫力无关的疾病

C.硅肺的发生与硅尘大小有关　　D.病变一般呈双侧弥漫分布

E.结节与结核不同,不发生坏死

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

三、名词解释(本大题共 5小题,每小题 3分,共 15分)

31.干性坏疽

32.子宫颈息肉

33.地方性甲状腺肿

34.风湿细胞

需要全本请访问 www.ertongbook.com

35.**树胶肿**

得　分	评卷人	复查人

四、简答题 (本大题共 5小题,每小题 7分,共 35分)

36.**写出七个肿瘤病理学检查方法名称**。

37.**人体 AIDS病可能有哪些感染途径？**

38.**后天梅毒按其病程发展可分为几期？各期梅毒的基本病变是什么？**

39.简述弥漫性血管内凝血的主要病理变化和病理临床联系。

40.在炎症过程中,内皮细胞出现哪些改变可导致血管通透性增加?其作用机制如何?

得　分	评卷人	复查人

五、论述题 (本大题共 1小题,共 15分)

41.请从年龄、病因、病变特点、病变分布和结局及合并症几方面列表比较大叶性肺炎与小叶性肺炎的不同点。

2005年 (下)病理学试卷参考答案

一、1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.A 7.B 8.C 9.C 10.B 11.A 12.D 13.B 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.B 20.C 21.C 22.C 23.B 24.A 25.C

二、26.ABC 27.BC 28.BCE 29.ABCD 30.ACD

三、31.干性坏疽多发生在四肢末端,由于在体表,水分易蒸发,坏疽部位的组织干燥,凝缩,呈黑褐色。

32.子宫颈息肉是慢性子宫颈炎时,宫颈粘膜上皮、腺体及间质结缔组织增生,形成突出粘膜表面的息肉状物。

33.地方性甲状腺肿是因缺碘引起;地区流行性;双侧甲状腺弥漫性或结节性肿大。

34.风湿细胞见于风湿病;细胞形态 (大,单核或多核,核染色质居中)。

35.树胶肿是晚期 (第三期)梅毒的病变;类似结核肉芽肿的肉芽肿性病变;肉芽肿韧而有弹性 (或质地如树胶)。

四、36.活检,细胞学检查,组织化学,免疫组化,电镜、流式细胞术,PCR,原位杂交。

37.(1)性交传染;

(2)输入含有 HIV的血液;

(3)输入含有 HIV的血制品;

(4)共用受 HIV污染的针头作静脉注射;

(5)母体内病毒通过胎盘感染胎儿。

38.(1)分三期;

(2)第一期梅毒——硬性下疳形成;

(3)第二期梅毒——梅毒疹;

(4)第三期梅毒——器官梅毒期,树胶肿形成。

39.(1)广泛性微血栓形成;(2)出血现象;(3)梗死病变;(4)休克及低血压;(5)器官功能衰竭。

40.(1)内皮细胞收缩和 或穿胞作用增强;

(2)直接损伤内皮细胞,坏死脱落;

(3)白细胞介导的内皮细胞损伤;

(4)新生毛细血管壁通透性高,其内皮细胞连接不健全。

五、41.

不同点	大叶性肺炎	小叶性肺炎
(1)年龄	中青年	老人、儿童、体弱、久病
(2)病因	肺炎球菌	混合性感染
(3)病变特点	纤维素性炎,分四期	化脓性炎,以细支气管为中心
(4)病变分布	肺段或一个肺大叶	灶性分布、双侧
(5)结局及合并症	溶解吸收,肺肉质变,纤维素性胸膜炎败血症及脓毒血症感染中毒性休克	病死率高,与年龄、原有疾病、机体状况及肺炎程度有关