2005年（下）高等教育自学考试全国统一命题考试

儿科护理学（二）试卷及参考答案

（考试时间 150分钟）

题　号	一	二	三	四	五	总　分	
题　分	30	10	15	30	15	核分人	
得　分						复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（本大题共 30小题，每小题 1分，共 30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 正常小儿前囟和颅骨骨缝闭合的年龄是（　　）

A. 6～10个月，2～3个月　　B. 6～10个月，3～4个月

C. 1～1.5岁，3～4个月　　D. 1～1.5岁，5～6个月

2. 对母亲的危险因素最容易造成胎儿畸形的时间是（　　）

A. 妊娠 2～8周　　B. 妊娠 12～28周

C. 妊娠 28～34周　　D. 妊娠 34周～出生

3. 一个小儿开始能走得好，能蹲着玩，能叠一块方木，能说出几个词和自己的名字，会表示同意、不同意，其最可能的年龄是（　　）

A. 12个月　　B. 15个月

C. 18个月　　D. 24个月

4. 一个能走得好并能爬台阶，能有目标扔球，能认识和指出身体各部分，会自己进食，会表示大小便的小儿最可能的年龄是（　　）

A. 12个月　　B. 15个月

C. 18个月　　D. 24个月

5. 为预防以下几种传染病使用的免疫制剂中属减毒活疫苗的是（　　）

需要全本请访问 www.ct.cngbook.com

A.结核　　B.脊髓灰质炎

C.伤寒　　D.乙型脑炎

6.接种卡介苗时以下哪项操作不规范？（　　）

A.用 2%碘酊及 75%乙醇消毒注射部位皮肤

B.2个月以上小儿接种前应做结核菌素试验

C.接种后局部小溃疡应保护创口不受感染

D.接种后个别小儿局部淋巴结肿大可热敷

7.婴幼儿时期最常见的肺炎是（　　）

A.支气管肺炎　　B.大叶性肺炎

C.间质性肺炎　　D.毛细支气管炎

8.小儿风湿热最易受累的心脏瓣膜是（　　）

A.主动脉瓣　　B.肺动脉瓣

C.三尖瓣　　D.二尖瓣

9.幼儿住院时主要压力来源是（　　）

A.环境陌生　　B.与父母分离

C.躯体形象改变　　D.丧失独立能力

10.使用肾上腺皮质激素的适应证不包括（　　）

A.急性严重感染　　B.过敏性疾病和哮喘发作

C.白血病和自身免疫性疾病　　D.水痘

11.低渗性脱水较高渗性脱水更易出现（　　）

A.高热　　B.烦渴

C.休克　　D.神经细胞脱水

12.低血钾的原因不包括（　　）

A.长期禁食　　B.腹泻

C.服用安体舒通利尿　　D.胃肠道引流

13.3个月婴儿，体重 6kg，给予 8%糖牛奶喂养，每日需要牛奶的量是（　　）

A.660ml　　B.760ml

C.820ml　　D.860ml

14.7个月婴儿添加辅食,合适的是　　(　　)

A.鱼泥、蛋羹、肝泥、碎菜、粥、果泥　　B.蛋黄、菜汁、果汁、米湖、鱼肝油

C.软饭、挂面、带馅食物、豆制品　　D.碎肉、馒头、豆腐

15.新生儿正常呼吸频率每分钟为　　(　　)

A.35～39次　　B.40～45次

C.46～50次　　D.51～55次

16.诱发新生儿呼吸窘迫综合征的主要因素是　　(　　)

A.急产　　B.早产

C.窒息　　D.低血钙

17.新生儿红细胞的寿命一般为　　(　　)

A.40～60天　　B.60～80天

C.80～100天　　D.100～120天

18.糖尿病母亲的婴儿比正常婴儿更有可能患　　(　　)

A.水肿　　B.低血糖症

C.高镁血症　　D.窒息

19.一硬肿患儿,体温 32℃,双下肢及臀部全部出现硬肿,全身情况差,其硬肿程度为　　(　　)

A.轻度　　B.中度

C.重度　　D.极重度

20.新生儿硬肿常见的首发部位是　　(　　)

A.面颊　　B.上肢

C.大腿　　D.小腿

21.佝偻病活动早期的表现是　　(　　)

A.易激惹、夜啼、多汗等神经精神症状　　B.肌张力低下

C.方颅　　D.肋骨串珠

22.小儿腹泻时常引起的酸碱紊乱的类型是 ( )

A.代谢性酸中毒 B.代谢性碱中毒

C.呼吸性酸中毒 D.呼吸性碱中毒

23.当补液纠正脱水与酸中毒时,患儿突然发生惊厥,应首先考虑 ( )

A.低血糖 B.低血钠

C.低血镁 D.低血钙

24.最常见的先天性心脏病的类型是 ( )

A.房间隔缺损 B.动脉导管未闭

C.法洛四联症 D.室间隔缺损

25.婴儿时期最易出现心力衰竭的疾病是 ( )

A.法洛四联症 B.房间隔缺损

C.室间隔缺损 D.风湿性心脏病

26.诱发心肌炎的最常见的病毒是 ( )

A.埃可病毒 B.腺病毒

C.流感和副流感病毒 D.柯萨奇病毒乙组

27.护理法洛四联症患儿,要注意保证入量,其目的是防止 ( )

A.血压下降 B.心力衰竭

C.脑血栓 D.肾功能不全

28.小儿“生理性贫血”多见于 ( )

A.出生后 2～3个月 B.出生后 4～5个月

C.出生后 6～10个月 D.出生后 10～12个月

29.川崎病的主要死亡原因是 ( )

A.心力衰竭 B.心律紊乱

C.心源性休克 D.心肌梗死

30.有并发症的麻诊患儿应隔离至 ( )

A.出疹后 5天 B.出疹后 7天

C.出疹后 10天　　D.出疹后 14天

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

二、填空题(本大题共 5小题,每空 1分,共 10分)

31.青春期女孩从_____岁开始到_____岁止。

32.婴儿_____个月会独自坐,_____个月会爬行。

33.新生儿肺透明膜病是由于缺乏_____引起的,多见于_____。

34.缺铁性贫血是一种_____、_____性贫血。

35.小儿肥胖常见于_____、_____和青春期 3个年龄阶段。

得　分	评卷人	复查人

三、名词解释(本大题共 5小题,每小题 3分,共 15分)

36.食物特殊动力作用

37.适于胎龄儿

38.中性温度

需要全本请访问 www.ct.congbook.com

39.**生理性黄疸**

40.**高血压脑病**

得　分	评卷人	复查人

四、简答题 (本大题共 6小题,每小题 5分,共 30分)

41.**简述小儿生长发育顺序性遵循的规律**。

42.试述换血疗法的目的。

43.简述新生儿窒息复苏的方案。

44.简述原发性肾病综合征常见的并发症。

45.什么是“骨髓外造血”？

46.**简述脑性瘫痪的主要临床表现**。

得　分	评卷人	复查人

五、论述题 (本大题共 1小题，15分)

47.患儿，男，9个月，平时发育营养正常，人工喂养，3天来腹泻，蛋花汤样大便 15～20次 /日，伴低热，偶有呕吐，1天来尿少，6小时无尿，查体：T38℃，精神萎靡，口干，眼窝及前囟凹陷，皮肤弹性差，四肢凉，BP 64 /40mmHg，血清钠 135mmol/L。

(1)列出该患儿的临床诊断。（3分 ）

(2)列出本病例主要护理诊断 (至少 5个)。（6分 ）

(3)列出主要护理措施。（6分 ）

2005年(下)儿科护理学(二)试卷参考答案

一、1.C 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.A 8.D 9.B 10.D 11.C 12.C 13.A 14.A 15.B 16.B 17.C 18.B 19.B 20.D 21.A 22.A 23.D 24.D 25.C 26.D 27.C 28.A 29.D 30.C

二、31.11～12 17～18 32.6 8

33.肺泡表面活性物质 早产儿 34.小细胞 低色素

35.婴儿期 5～6岁

三、36.食物特殊动力作用指食物消化、吸收及转化过程中所需的热能。

37.适于胎龄儿指出生体重在同胎龄平均体重第10～90百分位者。

38.中性温度指能维持正常体温和皮肤温度的最适宜的环境温度,在此温度下,人体耗氧量最少,新陈代谢率最低,蒸发散热亦少。

39.生理性黄疸是在新生儿出生后2～3天出现,4～5天达高峰,14天消退(早产儿可延至生后3～4周)。除皮肤黄染外无临床症状,肝功正常,血中未结合胆红素增加,但总胆红素<205μmol/L(早产儿可达256μmol/L)。

40.高血压脑病指血压急剧增高,超过脑血管代偿性收缩机制,使脑组织血液灌注急剧增多而致脑水肿。表现为剧烈头痛、烦躁不安、恶心、呕吐、复视或一过性失明、惊厥、昏迷等症状。

四、41.(1)由上到下;

(2)由近到远;

(3)由粗到细;

(4)由低级到高级;

(5)由简单到复杂。

42.(1)移去致敏红细胞和血清中抗体,终止红细胞破坏,防止继续溶血。

(2)降低血清胆红素,防止核黄疸。

(3)纠正溶血导致的贫血,防止缺氧和心功能不全。

43.尽量吸净呼吸道粘液;建立呼吸,增加通气;维持正常循环,保证足够心搏出量;药物治疗;评价。

44.(1)感染;

(2)电解质紊乱;

(3)血栓形成;

(4)低血容量休克;

(5)急性肾功能衰竭。

45.出生后,尤其在婴儿期,当遇到各种感染性贫血或造血需要增加时,肝、脾和淋巴结可适应需要恢复到胎儿时期的造血状态,出现肝脾淋巴结肿大,末稍血中出现有核红细胞或(和)幼稚中性粒细胞。这是小儿造血器官的一种特殊反应,称为“骨髓外造血”。

46.(1)运动发育落后,主动运动减少;

需要全本请访问 www.ct.congbook.com

(2)肌张力异常,肌张力增高、低下或高低变化不定;

(3)姿势异常,呈现弓状反张或为四肢痉挛;

(4)反射异常,痉挛性脑瘫可有腱反射亢进,可引出踝阵挛。

五、47.(1)临床诊断:小儿腹泻重型,重度等渗脱水。

(2)主要护理诊断:①腹泻:与肠道感染有关;②体液不足:与腹泻、呕吐有关;③体温过高:与肠道感染有关;④有皮肤完整性受损的危险:与大便次数过多刺激臀部皮肤有关;⑤潜在并发症:休克。

(3)主要护理措施:①调整饮食;②控制感染:床边隔离;③补充液体,纠正脱水;④严密观察病情;⑤维持皮肤完整性;⑥健康教育。