2005年（下）高等教育自学考试全国统一命题考试

妇产科护理学（二）试卷及参考答案

（考试时间 150分钟）

题　号	一	二	三	四	五	六	总　分	
题　分	20	10	15	15	20	20	核分人	
得　分							复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（本大题共 20小题，每小题 1分，共 20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 以下提示胎儿已成熟的羊水检查项目是（　　）

A. 卵磷脂 鞘磷脂 =1.8∶1　　B. 肌酐浓度 =3mg%

C. 胆红素类物质$\triangle OD_{450}$ =0.03　　D. 脂肪细胞出现率为 15%

2. 尖锐湿疣的潜伏期为（　　）

A. 2～14天　　B. 15～28天

C. 1～3个月　　D. 4～6个月

3. 某患者需放置子宫托治疗子宫脱垂，错误的健康宣教内容是（　　）

A. 月经期停止使用　　B. 妊娠期停止使用

C. 晨起放入，睡前取出　　D. 放托后每一年检查 1次

4. 有关先天性无阴道病人的描述，正确的是（　　）

A. 多数病人第二性征发育不良

B. 外阴检查可见阴道口处有 5cm的阴道盲端

C. 多数病人因青春期后一直未见月经来潮或婚后性交困难而就诊

D. 病人出现周期性下腹部疼痛

5. 绒毛膜癌病人的主要治疗方法是（　　）

需要全本请访问 www.ct.cungook.com

A.放疗　　B.同位素治疗

C.子宫切除　　D.化疗

6.侵蚀性葡萄胎最常发生在　　(　　)

A.良性葡萄胎后　　B.流产后

C.足月产后　　D.异位妊娠后

7.淋病双球菌对下列具有抵抗力的是　　(　　)

A.高温　　B.肥皂

C.干燥　　D.潮湿

8.外阴癌手术病人,术后开始服用大便软化剂较好的时间是　　(　　)

A.第 3天　　B.第 4天

C.第 5天　　D.第 6天

9.为羊水过多孕妇进行羊膜腔穿刺放羊水,错误的措施是　　(　　)

A.从腹部固定胎儿为纵产式　　B.术前行 B超监测,选择恰当穿刺点

C.放羊水速度缓慢,每分钟 5～10mL　　D.一次放液量不应超过 500mL

10.双胎妊娠胎儿及新生儿并发症中不包括　　(　　)

A.巨大儿　　B.胎位异常

C.脐带脱垂　　D.胎儿畸形

11.某轻度妊娠高血压综合征患者,休息后水肿不消退,其踝部、小腿及大腿可见凹陷性水肿,其它部位无水肿。判断该患者水肿分度为　　(　　)

A.＋　　B.＋＋

C.＋＋＋　　D.＋＋＋＋

12.新生儿面部与全身皮肤呈青紫色;呼吸节律不整且表浅;心跳规则有力,心率 100次/分,肌张力好,肢体屈曲,对外界刺激有反应,喉反射存在;该新生儿属于　　(　　)

A.正常新生儿　　B.轻度窒息

C.中度窒息　　D.重度窒息

13.下列受到致畸因子的作用后发生生理功能缺陷及生长迟缓的时期是　　(　　)

A.胚前期　　B.胚胎期

C.胎儿期　　D.新生儿期

14.初产妇,宫内孕 40周,临产 17小时后,宫口开大 3厘米,胎膜未破,头先露,S=0,宫缩弱、规律,间歇期不能完全松弛。此孕妇目前子宫收缩的情况是 (　　)

A.协调性子宫收缩乏力　　B.不协调性子宫收缩乏力

C.协调性子宫收缩过强　　D.不协调性子宫收缩过强

15.胎头下降延缓是指 (　　)

A.潜伏晚期至宫口扩张达 9～10cm,胎头下降速度每小时小于 1cm

B.潜伏晚期至宫口扩张达 9～10cm,胎头下降速度每小时小于 2cm

C.活跃晚期至宫口扩张达 9～10cm,胎头下降速度每小时小于 1cm

D.活跃晚期至宫口扩张达 9～10cm,胎头下降速度每小时小于 2cm

16.发生产后出血最主要的原因为 (　　)

A.宫缩乏力　　B.软产道裂伤

C.胎盘因素　　D.凝血功能障碍

17.下列有关急性病毒性肝炎孕产妇的治疗原则错误的是 (　　)

A.早期妊娠应终止　　B.孕中、晚期不宜终止妊娠

C.分娩时注意缩短第二产程　　D.产后用抗生素预防感染

18.在妊娠期心脏病患者中,下列不是早期心衰体征的是 (　　)

A.轻微活动后出现气短、心悸、胸闷　　B.休息时心率 >110次/分

C.休息时呼吸 >20次/分　　D.肝脾大,有压痛

19.根据婚前体检结果,以下情况可以生育的是 (　　)

A.女方患有强直性肌营养不良　　B.男方患有先天性心脏病

C.女方为血友病基因携带者　　D.男女双方均为先天聋哑

20.臀位最易发生的并发症是 (　　)

A.胎膜早破　　B.胎儿窘迫

C.产后出血　　D.子宫破裂

得　分	评卷人	复查人

二、多项选择题 (本大题共 5小题,每小题 2分,共 10分)在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21. 关于急性胎儿窘迫的描述,下列正确的是 (　　)

A. 多发生在妊娠末期　　B. 初期表现为胎动减少

C. 羊水可呈现为黄绿色　　D. 胎心率 >180次 /分

E. 胎儿头皮血检测 PH>7. 20

22. 骨盆入口平面狭窄的特点是 (　　)

A. 骶耻外径 <18cm　　B. 骨盆入口前后径 <10cm

C. 骨盆坐骨棘间径 <10cm　　D. 骨盆对角径 <11. 5cm

E. 骨盆耻骨弓角度 <90°

23. 围绝经期功血妇女的处理原则是 (　　)

A. 止血　　B. 促进排卵

C. 减少月经出血量　　D. 恢复卵巢功能

E. 调整月经周期

24. 晚期妊娠引产的并发症主要有 (　　)

A. 产后出血　　B. 感染

C. 脐带脱垂　　D. 宫缩乏力

E. 子宫破裂

25. “TORCH”是引起孕妇感染的微生物英文词的首字母缩略词,下列叙述正确的是 (　　)

A.T是弓形体　　B.O是其他微生物

C.R是风疹病毒　　D.C是巨细胞病毒

E.H是单纯疱疹病毒

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

三、填空题(本大题共 13小题,每空 1分,共 15分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.胎心率＜120次/分,持续_____分钟及以上为胎儿心动过缓。

27.发生先兆子宫破裂时,子宫下段与宫体之间形成明显的环状凹陷,称为_____。

28.妊娠合并活动性肺结核的妇女应尽早联合用药治疗,首选药物为_____合用_____口服。

29.正常妊娠 28～36周间,一般每_____周测量 1次子宫底高度。

30.接受子宫、输卵管碘油造影的妇女,造影前_____天一定要禁止性生活。

31.低位阴道灌洗时灌洗筒高度距床面不应超过_____cm,以避免污物进入宫腔。

32.绒毛膜癌的转移途径主要是_____转移。

33.急性淋病多在淋菌侵入_____天后发病,但早期多无症状。

34.早产儿呼吸系统发育不成熟,_____细胞产生的表面活性物质缺乏。

35.妊娠满_____周至不足 37周终止者,称为早产。

36.1975年国际外阴病研究协会根据组织病理学特征的不同,将慢性外阴营养不良分为_____型营养不良、_____型营养不良和混合型营养不良。

37.对外阴癌病人做活检时,可采用甲苯胺蓝进行外阴染色,再用 1%_____洗去染料,在仍蓝染部取活检。

38.妊娠 30周后,为矫正臀先露,可嘱孕妇采取_____卧位。

得　分	评卷人	复查人

四、名词解释(本大题共 5小题,每小题 3分,共 15分)

39.羊膜腔穿刺术

需要全本请访问 www.ertongbook.com

40.脐带脱垂

41.尿瘘

42.双合诊

43.继发性子宫收缩乏力

得　分	评卷人	复查人

五、简答题(本大题共 4小题,每小题 5分,共 20分)

44.简述葡萄胎患者的主要临床表现。

45.请列出 5种性激素补充疗法(HRT)的禁忌证。

46.请列举出 5条糖尿病孕妇应及时终止妊娠的情况。

47.**简述胎膜早破的病因**。

得　分	评卷人	复查人

六、论述题 (本大题共 2小题,每小题 10分,共 20分)

48.为母儿血型不合发生溶血的新生儿采用换血疗法的目的是什么？换血的注意事项有哪些？

49.张女士，30岁，未婚，既往体健，月经规律，13$\frac{3\sim5}{28\sim30}$天，量中，经前无不适。停经 45天，门诊诊断为早孕，张女士希望进行药物流产，请你向她介绍目前常用药物名称，用药方法及注意事项。

2005年(下)妇产科护理学(二)试卷参考答案

一、1.B 2.C 3.D 4.C 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A 11.B 12.B 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.D 19.C 20.A

二、21.CD 22.ABD 23.ACE 24.BCE 25.ABCDE

三、26.10

27.病理性缩复环

28.异烟肼 利福平

29.2

30.3

31.30

32.血行远处

33.3～7

34.肺泡Ⅱ型

35.28

36.增生 硬化苔癣

37.醋酸

38.胸膝

四、39.羊膜腔穿刺术抽取羊水作检查是产前诊断的重要辅助方法。羊水检查可判断胎儿有无遗传性疾病,胎儿的成熟度,有无发育异常,胎儿的安危等。

40.脐带位于胎先露部前方或一侧,胎膜未破,称为脐带先露。脐带先露实际上是轻度的脐带脱垂,也称隐性脐带脱垂。若胎膜已破,脐带进一步脱出于胎先露部的下方,经宫颈进入阴道内,甚至经阴道显露于外阴部,称为脐带脱垂。

41.尿瘘是指人体泌尿系统与其他系统之间有异常通道,使病人无法自主排尿,主要表现为尿液不断外流。

42.检查者一手示指和中指涂擦润滑剂后伸入阴道内,另一手放在腹部配合检查,此为双合诊检查。

43.继发性子宫收缩乏力是指产程开始子宫收缩正常,只是在产程进展到某阶段(多在活跃期或第二产程),子宫收缩转弱,产程进展缓慢,甚至停滞。

五、44.(1)停经后阴道流血:大部分病人常在停经后之 2～4个月出现不规则的阴道流血,其特点为间断性、量逐渐增多,连绵不断,常有反复大量出血,色暗红,出血可伴有水泡状组织排出。

(2)腹痛:由于葡萄胎迅速增长,使子宫急速增大所致的下腹部胀痛,也可为葡萄胎间歇性阴道流血以前的阵发性宫缩,以排出葡萄胎块。

(3)妊娠高血压综合征症状:部分病人可有高血压、水肿、蛋白尿等妊娠高血压综合征的症状,甚至有的病人出现子痫症状,如抽搐、昏迷等。

(4)子宫异常增大、变软。

(5)卵巢黄素化囊肿。

45.(1)雌激素依赖性肿瘤:乳癌、子宫内膜癌、黑色素瘤。

(2)原因不明的阴道出血。

(3)严重的肝、肾功能障碍。

(4)近 6个月内血栓栓塞性疾病。

需要全本请访问 www.ct.congbook.com

(5)红斑狼疮。

46.(1)重度妊高征;(2)酮症酸中毒;(3)并发严重的肝、肾损害;(4)恶性、进展性、增生性视网膜病变;(5)动脉硬化性心脏病;(6)胎儿宫内发育迟缓;(7)严重感染;(8)孕妇营养不良;(9)胎儿畸形。

47.创伤、宫颈内口松弛,妊娠后期性交刺激或引起胎膜炎;细菌、病毒或弓形体等引起的下生殖道感染;羊膜腔内压力升高(如多胎妊娠、羊水过多);胎儿先露部与骨盆入口未能很好衔接(如头盆不称,胎位异常);胎膜发育不良致菲薄脆弱,孕妇缺乏某些微量元素如铜等。

六、48.(1)可将患儿血中免疫抗体、致敏红细胞和过量胆红素替换,从而阻断继续溶血而预防核黄疸的发生,并纠正贫血。

(2)换血注意事项:换血前应停止哺乳,抽出胃内容物,以防呕吐物吸入气管;肌注苯巴比妥或水合氯醛灌肠,使患儿安静;监测生化、胆红素、免疫抗体、血红蛋白等;术前测量静脉压,以后每换 100mL血再复测 1次(正常为 4～8cmH_2O),如有异常,适当调整换血量;静脉压 >10cmH_2O,宜多抽吸,少注入,避免发生心衰;换血应在严格无菌操作下进行,专人看护,记出入量,密切观察患儿生命体征及一般状况。换血后根据情况仍可继续光疗并用抗生素预防感染,术后 8小时可恢复哺乳。

49.(1)常用药物:米非司酮(RU486)与前列腺素(PG)配伍。

(2)用药方法:口服 RU486 25mg,每天 2次,共 3天;于第 4天上午口服米索前列醇 0.6mg,顿服。

(3)①注意事项:RU486应空腹服用,上午 10时、下午 4时服最好;②服药以后会出现少许的阴道流血,通常用米索前列醇 6小时以后排出绒毛及胚囊,注意观察病人阴道流血的量、质、色及内容物,将内容物留下以确定为绒毛及胚胎组织后才能倒掉,必要时送病检,若流产失败应及时终止妊娠,流产不全出血多者应急诊清宫;③在服药以后 5周应随访,了解月经恢复情况。