2005年（下）高等教育自学考试全国统一命题考试

妇产科护理学（一）试卷及参考答案

（考试时间 150分钟）

题　号	一	二	三	四	五	总　分	
题　分	25	15	15	25	20	核分人	
得　分						复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（本大题共 25小题，每小题 1分，共 25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 骨盆出口横径是指（　　）

A. 两侧坐骨结节内侧缘之间的距离　　B. 两侧坐骨结节外侧缘之间的距离

C. 两侧坐骨棘内侧缘之间的距离　　D. 两侧坐骨棘外侧缘之间的距离

2. 足月新生儿出现生理性黄疸最高峰的时间是出生后第（　　）

A. 2～3天　　B. 4～5天

C. 6～7天　　D. 8～9天

3. 妊娠 2个月出现难免流产，首选的治疗原则是（　　）

A. 注射催产素　　B. 应用抗生素抗感染

C. 尽快清宫　　D. 应用大量雌激素止血

4. 胎心监测时，提示脐带受压的是（　　）

A. NST无反应型　　B. 加速

C. 早期减速　　D. 可变减速

5. 妊娠期贫血的诊断标准是（　　）

A. Hb＜120g/L或红细胞压积 ＜30%　　B. Hb＜110g/L或红细胞压积 ＜33%

C. Hb＜100g/L或红细胞压积 ＜30%　　D. Hb＜80g/L或红细胞压积 ＜25%

6. 导致产力异常的原因不包括（　　）

需要全本请访问 www.ct.cungook.com

A.精神过度疲劳　　B.早产儿

C.巨大儿　　D.双胎、羊水过多

7.产褥期胎盘附着处子宫内膜完全修复的时间是产后（　　）

A.2周　　B.4周

C.6周　　D.8周

8.正常初产妇进入第二产程的标志是（　　）

A.宫口开全　　B.胎头拨露

C.宫缩时会阴膨出，肛门放松　　D.产妇屏气，肛门放松

9.外阴伤口水肿时湿热敷常用的药液是（　　）

A. 50%硫酸镁　　B. 75%酒精

C. 1∶5000高锰酸钾液　　D. 4%小苏打液

10.更年期综合征的临床表现不包括（　　）

A.阴道分泌物增多　　B.假性心绞痛

C.阵发性潮热　　D.骨质疏松

11.妊娠合并风湿性心脏病妇女，25岁，G_1P_0，目前孕 38周，心功能Ⅰ～Ⅱ级，估计胎儿体重2700g，分娩期正确的处理是（　　）

A.产后腹部加压 3小时　　B.助产缩短第二产程

C.加强阴道检查，了解产程进展　　D.肌注麦角新碱预防产后出血

12.侵蚀性葡萄胎最常见的转移器官是（　　）

A.阴道　　B.子宫旁组织

C.肺　　D.脑

13.子宫颈癌最早出现的临床表现是（　　）

A.经期改变　　B.经量改变

C.腹痛　　D.接触性出血

14.妊娠合并病毒性肝炎的妇女分娩时，错误的处理是（　　）

A.临产备新鲜血　　B.立即行剖宫产术

C.预防产后出血　　D.防止肝、肾功能衰竭

15.不易受到化疗药物损伤的人体细胞是 ( )

A.肌细胞 B.生殖细胞

C.造血细胞 D.毛囊皮肤组织细胞

16.提示子宫肌瘤扭转的临床表现为 ( )

A.体温迅速升高 B.恶心呕吐

C.大量阴道出血 D.剧烈腹痛

17.下列属于子宫内膜癌普查手段的是 ( )

A.宫腔镜 B. B超

C.淋巴造影 D.细胞学检查

18.关于顺铂化疗,下列正确的是 ( )

A.用药前测膝腱反射、呼吸、尿量 B.脱发是主要的副作用

C.用药前先大量静脉输液 D.用药前正确测量血压

19.下列不属于测定卵巢功能的检查是 ( )

A.基础体温测定 B.阴道涂片细胞学检查

C.宫颈粘液涂片检查 D.腹腔镜检查

20.滴虫性阴道炎的典型分泌物表现是 ( )

A.脓血性 B.泡沫样

C.血性 D.豆腐渣样

21.正常初产妇分娩过程中,关于潜伏期正确的描述是 ( )

A.从规律宫缩到宫口扩张 2cm B.宫颈口平均 1小时开大 1cm

C.潜伏期最大时限为 8小时 D.从规律宫缩到宫口扩张 3cm

22.术后并发血栓性静脉炎,其治疗不包括 ( )

A.早期下床活动 B.绝对卧床休息

C.使用弹性绷带 D.应用抗凝剂

23.化疗患者血小板低于多少,即可有潜在的出血 ( )

A.20 000/mm3 B.50 000/mm3

C.80 000/mm3 D.100 000/mm3

24. 为闭经患者作阴道脱落上皮细胞及宫颈粘液检查的目的是 ( )

A. 了解子宫内膜是否缺陷　　B. 了解病变是否在垂体

C. 了解雌激素水平　　D. 了解下丘脑—垂体—卵巢轴是否成熟

25. 利凡诺引产适用于 ( )

A. 妊娠 10周以内要求终止妊娠而无禁忌证者

B. 妊娠 10～14周要求终止妊娠而无禁忌证者

C. 妊娠 14～27周要求终止妊娠而无禁忌证者

D. 妊娠 28周以后要求终止妊娠而无禁忌证者

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

二、填空题 (本大题共 10小题,每空 1分,共 15分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26. 口服避孕药期间因漏服药引起的不规则少量阴道出血称为_____。

27. 妊娠期妇女乳房的发育受到激素的控制,雌激素促进乳腺_____的发育,孕激素促进乳腺_____的发育。

28. 流产是指妊娠 28周前终止,胎儿体重在_____g以下。

29. 糖尿病孕妇的胰岛负担增加是由于胎盘分泌的胎盘生乳素、_____和_____,在不同程度上都有对抗胰岛素的作用所导致的。

30. 总产程超过_____小时为滞产。

31. 产后出血是指产后 24小时内阴道出血超过_____ml者。

32. 尖锐湿疣的病原体是_____,婴幼儿的尖锐湿疣由患病母亲直接传播,也可以经_____传播。

33. 胎脂有保护皮肤和_____的作用。

34. 产褥汗是以睡眠和_____时最明显,一般产后_____左右自行好转。

35. 临产是指规律性宫缩,同时伴有进行性_____和_____。

得　分	评卷人	复查人

三、名词解释(本大题共 5小题,每小题 3分,共 15分)

36.月经

37.功能失调性子宫出血病

38.子宫复旧

39.妊娠高血压综合征

40.产褥感染

需要全本请访问 www.ct.ongbook.com

得　分	评卷人	复查人

四、简答题 (本大题共 5小题,每小题 5分,共 25分)

41.**简述孕妇妊娠后期,小腿痉挛的原因和预防及缓解方法**。

42.**简述子宫内膜异位症的临床表现**。

43.**列举慢性子宫颈炎的病理类型**。

44.**简述骨盆狭窄的临床类型**。

45.**简述正常子宫收缩力的特点**。

得　分	评卷人	复查人

五、论述题(本大题共 2小题,每小题 10分,共 20分)

46.初孕妇,35岁,妊娠 34周,以无诱因、无腹痛、反复阴道大量流血,呈休克状态就诊。腹部检查:子宫软,无压痛,胎儿臀位,胎头高浮。

请回答:(1)最有可能的临床诊断是什么?(2分)

(2)如何配合医生抢救?(8分)

47. 黄某，32岁，G_1P_0，孕 2月余，因阴道少量出血就诊，妇科检查：阴道及宫颈充血，呈紫蓝色，子宫、宫颈软，子宫约 3月妊娠大小。B超检查发现宫腔增大，呈“暴风雪”改变，未见胎心搏动。尿妊娠试验阳性，肺部 X线检查正常。

请问：(1)最可能的临床诊断是什么？(2分)

(2)主要的护理措施有哪些？(8分)

2005年(下)妇产科护理学(一)试卷参考答案

一、1.A 2.B 3.C 4.D 5.C 6.B 7.C 8.A 9.A 10.A 11.B 12.C 13.D 14.B 15.A 16.D 17.D 18.C 19.D 20.B 21.D 22.A 23.B 24.C 25.C

二、26.突破性出血

27.腺管 腺泡

28.1000

29.雌激素 孕激素

30.24

31.500

32.人乳头状瘤病毒 胎盘 胎盘血循环

33.减少散热(保温)

34.初醒 1周

35.宫颈口扩张 胎先露下降

三、36.月经是由于卵巢及子宫内膜周期性的变化而引起的子宫规律性、周期性的出血,是生殖器功能成熟的表现。

37.功能失调性子宫出血病简称功血,是由于内分泌调节系统的功能失常所导致的月经周期不规律、经量多少不等、经期长短不定的子宫出血,内外生殖器无明显器质性病变,无全身出血性疾病及妊娠合并症。

38.子宫复旧是指胎盘娩出后的子宫逐渐恢复至非孕状态的过程。

39.妊高征是产科特有的常见疾病,妊娠20周后发生高血压、水肿、蛋白尿的一组症候群。严重时可发生头痛、眼花、胸闷,甚至出现抽搐、昏迷。

40.产褥感染系分娩与产褥期因生殖道创面,受致病菌的感染所致引起的局部或全身炎症的变化。

四、41.原因:血液钙离子浓度降低或因维生素D缺乏影响钙离子吸收。

缓解方法:伸膝使足背屈、腓肠肌按摩或热敷。

预防:增加孕妇饮食中钙、维生素D的入量,局部保暖,或口服复合维生素B等。

42.(1)月经量多:为最常见症状之一,个别患者表现周期延长,经前点滴出血。

(2)痛经:常出现在经前并持续整个月经期至干净后进行性加重,有时伴有肛门坠痛。

(3)不育。

(4)盆检可发现包块或触痛结节,有时子宫增大。

43.(1)宫颈糜烂;

(2)宫颈肥大;

(3)宫颈息肉;

(4)宫颈腺体囊肿或答纳博特囊肿;

(5)子宫颈内膜炎。

44.(1)骨盆入口狭窄;

(2)中骨盆狭窄;

(3)骨盆出口狭窄;

(4)均小骨盆;

需要全本请访问 www.ertongbook.com

(5)骨产道的特殊情况,骨盆畸形,尾骨与骨盆骨折后造成骨盆变形。

45.(1)节律性:宫缩强度由弱到强;宫缩持续时间逐渐延长;宫缩间歇期逐渐缩短。

(2)对称性和极性:宫缩从两侧宫角开始向宫底部集中,然后再向下扩展。

(3)缩复作用。

五、46.(1)前置胎盘。

(2)①立即使病人平卧、吸氧,迅速用粗针头建立静脉通路,以确保液体、血液、药物的输入。

②测血压、脉搏、听胎心,观察阴道出血量及腹痛情况,保留病人的内裤及血垫等,以估计出血量。

③遵医嘱准备好抢救物品、药品、配血备用。

④做好各种化验检查,如血型、血常规等。

⑤如情况允许移动病人可用轮椅或平车。

⑥做好孕妇及家属的精神安慰与支持。

47.(1)葡萄胎;

(2)护理措施:

①入院护理包括心理护理。

②观察阴道出血情况。

③预防感染:保持会阴部清洁。

④生活护理。

⑤清宫术的护理:术前护理:建立有效静脉通路,备血,准备好抢救措施,排空膀胱,药物准备(催产素)

术中护理:严密观察生命体征,阴道出血量及腹痛,及时给予催产素。

术后护理:健康宣教,严格做好随访。

⑥化疗的护理:预防性化疗。

⑦出院宣教:避孕宜选用避孕套及阴道隔膜。