2005年（下）高等教育自学考试全国统一命题考试

内科护理学（一）试卷及参考答案

（考试时间 150分钟）

题　号	一	二	三	四	五	总　分	
题　分	30	15	15	20	20	核分人	
得　分						复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（本大题共 30小题，每小题 1分，共 30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄病人最常见的早期症状为（　　）

A. 劳力性呼吸困难　　B. 咳嗽

C. 咯血　　D. 食欲不振、腹胀

2. 心脏骤停时常见的心电图表现为（　　）

A. Ⅱ度房室传导阻滞　　B. 窦性停搏

C. 心室颤动　　D. Ⅲ度房室传导阻滞

3. 下列心律失常类型中，具有突然发生、突然停止特点的是（　　）

A. 频发早搏　　B. 室上性阵发性心动过速

C. 窦性心动过速　　D. 心房颤动

4. 观察休克病人的病情变化，其病情好转的表现为（　　）

A. 胸骨部位皮肤指压阳性　　B. 脉压小于 20mmHg

C. 尿量超过 30ml/h　　D. 脉细速

5. 某女性患者，在日常活动时出现乏力、心悸及呼吸困难等症状，休息时不出现，则该患者的心功能状况为（　　）

A. 心功能Ⅰ级　　B. 心功能Ⅱ级

C. 心功能Ⅲ级　　D. 心功能Ⅳ级

需要全本请访问 www.ct.cngbook.com

6.心力衰竭患者每日钠盐的摄入量宜小于 ( )

A.1g B.2g

C.3g D.5g

7.循环系统疾病病人出现呼吸困难,主要见于 ( )

A.左心功能不全 B.右心功能不全

C.心肌缺血、缺氧 D.心律失常

8.洋地黄中毒时心脏方面的反应最常见的表现为 ( )

A.心房颤动 B.室性早搏呈二联律

C.室上性心动过速 D.房室传导阻滞

9.支气管肺癌药物止痛首选的给药途径是 ( )

A.口服给药 B.直肠给药

C.肌肉注射 D.静脉给药

10.临床上最常见的继发性肺结核是 ( )

A.结核性胸膜炎 B.血行播散型肺结核

C.浸润型肺结核 D.慢性纤维空洞型肺结核

11.下列首选青霉素治疗的肺炎为 ( )

A.军团菌肺炎 B.肺炎支原体肺炎

C.绿脓杆菌肺炎 D.肺炎球菌肺炎

12.慢性阻塞性肺气肿(肺气肿型)突出的临床表现是 ( )

A.长期咳嗽 B.逐渐加重的呼吸困难

C.大量咳痰 D.疲乏无力、体重减轻

13.胃溃疡患者疼痛发生时间多为 ( )

A.午夜至凌晨 3点 B.进食后半小时

C.进食后 1～3小时 D.进食后 4～5小时

14.进展期胃癌最早出现的症状是 ( )

A.恶心、呕吐 B.发热

C.上腹痛 D.呕血与黑便

15.有关急性胰腺炎腹痛特点陈述错误的是 ( )

A.多数为急性腹痛 B.进食后疼痛加重

C.呕吐后疼痛减轻 D.腹痛常位于上腹正中

16.下列不发展为肝硬化的病毒性肝炎是 ( )

A.甲型肝炎 B.乙型肝炎

C.丙型肝炎 D.乙型合并丁型肝炎重叠感染

17.原发性肝癌目前非手术治疗的首选方法为 ( )

A.放射治疗 B.免疫治疗

C.中医治疗 D.肝动脉栓塞化疗

18.上消化道出血的病因占首位的是 ( )

A.胃癌 B.急性胃黏膜病变

C.消化性溃疡 D.食道胃底静脉破裂出血

19.尿毒症酸中毒病人的呼吸特点为 ( )

A.呼吸浅而快 B.呼吸深而长

C.呼吸浅而慢 D.呼吸有暂停现象

20.原发性肾病综合征的临床表现中最常见的是 ( )

A.高血压 B.水肿

C.面色苍白、疲乏无力 D.肾功能不全

21.典型少尿型急性肾功能衰竭患者肾功能开始恢复的标志是 ( )

A.尿常规检查正常 B.血清肌酐逐渐下降

C.进行性尿量增多 D.血清尿素氮逐渐下降

22.甲状腺功能亢进症重要的体征是 ( )

A.甲状腺肿大伴血管杂音 B.浸润性突眼

C.腱反射亢进 D.心律失常以频发早搏多见

23.甲亢患者服用抗甲状腺药物减至维持量后还须继续服用 ( )

A.0.5～1年 B.1～1.5年

C.1.5～2年 D.2～2.5年

24.外周血糖化血红蛋白测定一般可反映多长时间内的血糖水平 ( )

A.近 1～2个月 B.近 2～3个月

C.近 3～4个月 D.近 4～5个月

25.引起继发性再生障碍性贫血的药物和最多见的是 ( )

A.阿司匹林 B.保泰松

C.氯霉素 D.磺胺药

26.血管壁异常引起的出血性疾病是 ( )

A.特发性血小板减少性紫癜 B.血友病

C.弥散性血管内凝血 D.过敏性紫癜

27.一氧化碳中毒的发病机制错误的是 ( )

A.CO与 Hb亲和力比 O_2 与 Hb亲和力大 240倍

B.COHb解离较氧合血红蛋白解离慢 3600倍

C.CO可抑制细胞色素氧化酶、影响细胞呼吸

D.氧合血红蛋白解离增强

28.急性中毒洗胃时,若毒物种类不明,应选用的洗胃液体是 ( )

A.1∶5000高锰酸钾 B.2%碳酸氢钠溶液

C.温开水 D.淡肥皂水

29.流行性乙型脑炎的健康教育内容中错误的是 ( )

A.进行防蚊、灭蚊及疫苗接种 B.对密切接触者可服用利福平预防

C.有症状时及时就诊 D.对留有后遗症者指导功能锻炼

30.有一可疑霍乱病人,粪便涂片镜检见鱼群样排列的革兰染色阴性弧菌,为确诊还需作的检查是 ( )

A.粪便培养 B.血培养

C.制动试验 D.血清抗体检测

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

二、填空题 (本大题共 15空,每空 1分,共 15分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31.慢性心力衰竭诱发因素中各种感染可加重心脏负荷,特别是_____感染最为常见。

32.急性心肌梗死的主要并发症有乳头肌功能失调或断裂、_____和_____。

33.肺泡通气与肺血流灌注之比为_____时,才能保证有效的气体交换。

34.支气管扩张患者的脓痰静置后可分为三层,上层为_____、中层为_____、下层为脓性物和坏死组织。

35.肝硬化失代偿期临床主要表现为肝功能减退和_____所致的症状和体征。

36.消化性溃疡最常见的并发症是_____。

37.急性胰腺炎病人禁用的止痛药为_____。

38.慢性肾小球肾炎心有的临床表现是_____。

39.抗甲状腺药物的主要不良反应是_____。

40.输血反应以_____最多见,其次是_____反应。

41.中毒型细菌性痢疾循环衰竭的治疗原则是_____、纠正酸中毒和给予血管活性药。

42.伤寒致病的主要因素是_____。

得　分	评卷人	复查人

三、名词解释 (本大题共 5小题,每小题 3分,共 15分)

43.肺性脑病

44.自发性心绞痛

需要全本请访问 www.ertongbook.com

45.**日射病**

46.**系统性红斑狼疮**

47.**随时消毒**

得　分	评卷人	复查人

四、简答题 (本大题共 4小题,每小题 5分,共 20分)

48.**简述急性白血病化疗药物的主要不良反应**。

49.简述肝性脑病的常见诱发因素。

50.简述高血压急症的治疗要点。

51.简述保护甲、乙型病毒性肝炎易感人群的措施。

得　分	评卷人	复查人

五、论述题 (本大题共 2小题,每小题 10分,共 20分)

52. **患者,男性,20岁。因间断咳喘发作 3年,近 3天咳嗽、气喘、呼吸困难加重收入院。入院后 2天咳喘不缓解,且逐渐加重,应用各种止喘药治疗无效。诊断为重症哮喘发作,自发病以来进食少,且尿量减少,24小时尿量共** 700ml。

体检:T 37℃,BP 120/70mmHg,R 28**次/分**,P 130**次/分**,**端坐呼吸,大汗淋漓,口唇轻度紫绀,两肺叩诊过清音,听诊呼吸音减弱,呼气相延长,并可闻及广泛哮鸣音,心率** 130**次/分,律齐,余**(一)。

请写出:(1)**此病人** 2**个主要的护理诊断**。

(2)**对病人进行健康教育的内容**。

53.患者，男性，80岁。患糖尿病 20年，坚持按饮食计划进餐，近十年加用口服达美康 40mg，分中、晚餐前半小时服用，血糖控制尚好。近一周受凉后低热、咳嗽、咳黄痰、纳差、乏力，患者仍按时服药，半天来出现意识不清入院。

体检：BP 100/70mmHg，R 26次/分，意识不清，角膜反射存在，心率 110次/分，律齐，两肺散在干湿□音，余（－）。

实验室检查：血糖 1.1mmol/L(20mg/dl)，尿糖阴性。

请写出：(1)患者意识不清的原因。

(2)严重威胁患者生命的一个护理诊断。

(3)在配合医生抢救过程中，护士可采取哪些护理措施？

2005年(下)内科护理学(一)试卷参考答案

一、1.A 2.C 3.B 4.C 5.B 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C 11.D 12.B 13.B 14.C 15.C 16.A 17.D 18.C 19.B 20.B 21.C 22.A 23.C 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.B 30.A

二、31.呼吸道　32.心脏破裂　心室壁瘤

33.0.8　34.泡沫　黏液

35.门静脉高压　36.出血

37.吗啡　38.蛋白尿

39.粒细胞减少　40.发热　过敏

41.扩充血容量　42.伤寒杆菌内毒素

三、43.肺性脑病是指因呼吸功能衰竭导致缺氧、CO_2潴留而引起的神经、精神功能障碍。

44.自发性心绞痛是指疼痛的发生与劳累、情绪激动等使心肌需氧量增加的因素无明显关系,而可能与冠脉血流量一过性减少有关。疼痛程度较重,时限较长,含服硝酸甘油不易缓解。

45.日射病是指由于烈日曝晒或强烈热辐射作用头部,引起脑组织充血、水肿,温度可达40～42℃,出现剧烈头痛、头晕、眼花、耳鸣、呕吐、烦躁不安,而体温多不升高。

46.系统性红斑狼疮是一累及全身多个系统的自身免疫病,血清出现多种自身抗体,并有明显的免疫紊乱。

47.随时消毒是指随时对传染源的排泄物、分泌物、污染物品进行消毒,以便及时杀灭从传染源排出的病原体,防止传播。

四、48.(1)局部反应:静脉炎;局部组织的炎症甚至坏死;

(2)骨髓抑制;

(3)消化道反应;

(4)其他:末梢神经炎;心肌及心脏传导损害、出血性膀胱炎、口腔粘膜溃疡。

49.(1)上消化道出血;

(2)大量排钾利尿,放腹水;

(3)高蛋白饮食;

(4)感染及药物(如利尿药、安眠药、镇静药等);

(5)便秘及其他(腹泻、外科手术、尿毒症、分娩)。

50.(1)卧床休息,抬高床头;

(2)吸氧;

(3)快速降压:常用药物有硝普钠、硝苯地平;

(4)有高血压脑病时给予脱水剂;

(5)患者发生躁动不安、抽搐时,可给予镇静剂。

51.(1)甲型病毒性肝炎:①主动免疫:接种甲肝减毒活疫苗(甲肝疫苗)。②被动免疫:注射丙种球蛋白。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

(2)乙型病毒性肝炎：①主动免疫：接种乙肝疫苗。②被动免疫：注射高效价乙肝免疫球蛋白(HBIG)。

五、52.(1)护理诊断：①气体交换受损：与支气管平滑肌痉挛、气道粘膜水肿有关。(答“清理呼吸道无效：与痰液粘稠不易咳出有关”或“低效性呼吸型态：与支气管平滑肌痉挛有关”也算对。)②有体液不足的危险：与呼吸频数、入量不足有关。

(2)健康教育：①树立信心，长期治疗可以控制病情；②帮助病人识别过敏因素，回避过敏因素；③充分休息、合理饮食；④按医嘱合理用药；⑤正确使用定量吸入器；⑥自我监测病情作好哮喘日记；⑦了解哮喘发作的警告，及时控制急性发作。

53.(1)低血糖反应。

(2)潜在并发症：低血糖昏迷(或急性意识障碍——浅昏迷：与低血糖反应有关)。

(3)护理措施：①遵医嘱静脉注射50%葡萄糖液；②开放静脉，遵医嘱给予葡萄糖液及抗生素；③病情观察：意识状态、生命体征变化，定时测血糖，记出入量；④按昏迷护理常规进行护理；⑤病人清醒后向病人及家属作健康指导，说明降糖药应随进餐量作相应调整。