2005年（下）高等教育自学考试全国统一命题考试

外科护理学（一）试卷及参考答案

（考试时间 150分钟）

题　号	一	二	三	四	五	总　分	
题　分	30	20	8	20	22	核分人	
得　分						复查人	

第一部分　选择题

得　分	评卷人	复查人

一、单项选择题（本大题共 30小题，每小题 1分，共 30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 含氯消毒剂遇水后形成有效的消毒成分是（　　）

A. 氯乙定　　B. 戊二醛

C. 次氯酸　　D. 氯石灰

2. 治疗等渗性缺水，比较理想的溶液是（　　）

A. 生理盐水　　B. 平衡盐溶液

C. 10%葡萄糖溶液　　D. 5%葡萄糖盐水

3. 静脉补充氯化钾时，在 500ml葡萄糖溶液中最多加入 10%氯化钾溶液（　　）

A. 10ml　　B. 15ml

C. 20ml　　D. 25ml

4. 经中心静脉导管输注营养液的患者若突然出现呼吸困难，怀疑空气栓塞，首先应将患者置于（　　）

A. 左侧卧位　　B. 右侧卧位

C. 平卧位　　D. 半卧位

5. 大面积烧伤后 2天内，最主要的全身性病理改变是（　　）

A. 低血容量休克　　B. 急性肾功能衰竭

需要全本请访问 www.ct.cnbook.com

C.应激性溃疡　　D.脓毒症

6.颅脑手术后患者行脑室外引流,术后每日引流量不宜超过　　(　　)

A.200ml　　B.300ml

C.400ml　　D.500ml

7.损伤性血胸患者胸腔内积血不凝固的原因是　　(　　)

A.凝血因子减少　　B.胸腔内渗液稀释

C.心、肺及膈肌运动有去纤维蛋白作用　　D.凝血酶原减少

8.开胸手术后第一天通常最适宜的体位是　　(　　)

A.平卧位　　B.仰卧中凹位

C.侧卧位　　D.半卧位

9.尿三杯试验中,若仅第一杯尿液异常提示病变的部位在　　(　　)

A.肾脏　　B.膀胱

C.后尿道　　D.前尿道

10.肾结石患者在非手术治疗期间有利于治疗的运动方式是　　(　　)

A.散步　　B.气功

C.太极拳　　D.跳绳

11.骨折的专有表现是　　(　　)

A.疼痛和压痛　　B.畸形

C.功能障碍　　D.肿胀

12.男性,80岁,左股骨颈囊内骨折,因全身情况差,不适宜手术,采用骨牵引治疗。该患者的早期并发症是　　(　　)

A.废用综合征　　B.股骨头缺血坏死

C.坠积性肺炎　　D.脂肪栓塞

13.腰椎间盘突出症好发的椎间盘是　　(　　)

A.腰 1～2　　B.腰 2～3

C.腰 3～4　　D.腰 4～5

14.枕骨大孔疝与小脑幕切迹疝的主要区别是 ( )

A.枕骨大孔疝呼吸障碍明显 B.小脑幕切迹疝无意识障碍

C.小脑幕切迹疝头痛、呕吐症状较轻 D.枕骨大孔疝一般不出现颈后的压痛

15.静息痛常见于 ( )

A.下肢静脉曲张 B.血栓闭塞性脉管炎

C.下肢动脉硬化 D.血栓性静脉炎

16.下列关于肛管疾病手术前后护理的叙述,正确的是 ( )

A.术前清洁灌肠 B.严格限制饮食

C.术后腹胀时用肛管排气 D.术后便秘时口服液体石蜡

17.肠套叠的好发年龄为 ( )

A.2岁以内 B.2～3岁

C.3～4岁 D.4～5岁

18.胃大部切除术后,引起低血糖综合征的主要原因是 ( )

A.食物过快进入空肠 B.胰岛素分泌过少

C.葡萄糖吸收太慢 D.血糖一时性降低

19.胃十二指肠溃疡穿孔患者出现疼痛难忍、大汗淋漓,不正确的处理方法是 ( )

A.禁食、禁水 B.胃肠减压

C.适当给予镇静镇痛 D.补液抗炎

20.胃癌最主要的转移方式是 ( )

A.直接蔓延 B.淋巴转移

C.血行转移 D.腹腔种植

21.X线检查见膈下游离气体时,应首先考虑的是 ( )

A.胆囊穿孔 B.胃十二指肠穿孔

C.肝破裂 D.幽门梗阻

22.腹股沟部半球形疝块,不进阴囊,压迫内环,疝块仍可出现的是 ( )

A.腹股沟斜疝 B.股疝

C.腹股沟直疝　　D.切口疝

23.明确乳房肿块性质最可靠的方法是（　　）

A.B超　　B.钼钯 X线摄片

C.红外线热像图　　D.活组织病理检查

24.乳腺癌的早期表现是（　　）

A.乳头内陷　　B.乳房肿块

C.皮肤“桔皮样”改变　　D.乳房外形改变

25.甲状腺大部切除术后最危急的并发症是（　　）

A.呼吸困难和窒息　　B.喉返神经损伤

C.喉上神经损伤　　D.甲状旁腺损伤

26.分泌胃泌素的胃粘膜细胞是（　　）

A.主细胞　　B.壁细胞

C. G细胞　　D.粘液细胞

27.可以近似反映心脏后负荷的监测指标是（　　）

A.血压　　B.心率

C.中心静脉压　　D.肺动脉楔入压

28.男性，75岁，食管癌切除，食管胃吻合术后第 6天，突然出现胸痛、高热、呼吸困难、WBC2.0 $\times 10^9$ /L，中性粒细胞 90%，首先怀疑（　　）

A.肺炎　　B.吻合口瘘

C.肺不张　　D.切口感染

29.化脓性关节炎最常见的致病菌是（　　）

A.肺炎球菌　　B.大肠杆菌

C.金黄色葡萄球菌　　D.溶血性链球菌

30.骨盆骨折患者最严重的并发症是（　　）

A.膀胱尿道损伤　　B.直肠损伤

C.腰骶神经丛损伤　　D.休克

第二部分　非选择题

得　分	评卷人	复查人

二、填空题（本大题共 10小题，每空 1分，共 20分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31. 骨折病人的三大处理原则是复位、_____和_____。

32. 尿失禁的临床分类包括真性尿失禁、_____和_____。

33. 胆管内结石继发感染时的典型临床表现是腹痛、_____和_____。

34. 胸腔引流管引流胸腔积液时，应放置在_____；引流胸腔积气时，应放置在_____。

35. 禁食时，体内贮存的肝糖原，在_____小时内即可消耗尽，在饥饿时最主要的内源性能源是_____。

36. 24小时补液总量应从三个方面考虑，即正常每日需要量，_____和_____。

37. 颅前窝骨折常损伤的颅神经为_____和_____。

38. 在休克监测过程中，如患者动脉压较低，中心静脉压也低，提示_____，若患者动脉压较低而中心静脉压偏高，提示_____。

39. 根据尿中血液的含量，血尿可分为_____和_____。

40. 头皮血肿按血肿发生的部位不同分为帽状腱膜下血肿，_____和_____。

得　分	评卷人	复查人

三、名词解释（本大题共 4小题，每小题 2分，共 8分）

41. 腹膜刺激征

42. 完全胃肠外营养

需要全本请访问 www.ertongbook.com

43.**搭肩试验**

44.**脑震荡**

得　分	评卷人	复查人

四、简答题 (本大题共 4**小题,每小题** 5**分,共** 20**分)**

45.**简述皮肤牵引术的护理要点**。

46.简述“T”管拔除的指征。

47.简述手术后患者切口疼痛的特点及对病人的影响。

48.**简述肾和输尿管结石患者非手术治疗期间的健康指导内容**。

得　分	评卷人	复查人

五、病例分析题(本大题共 2小题,每小题 11分,共 22分)

49.男性,60岁,身高 168cm,体重 80kg,因股骨颈骨折行皮牵引治疗,卧床 7天后出现下肢肿胀,并主诉疼痛,高度怀疑下肢深静脉血栓形成。

问:(1)患者发生下肢静脉血栓的可能原因是什么?(3分)

(2)该患者出现下肢深静脉血栓后应如何处理?(5分)

(3)此类患者应如何早期预防下肢深静脉血栓?(3分)

50.女性，33岁，饭后参加体育活动时突感腹中部剧痛，进行性加重，并出现频繁呕吐，4小时后就诊。体检：T36.8℃，P86次/分，R28次/分，BP75/60mmHg，急性病容，四肢发冷，皮肤潮湿，全腹压痛，肌紧张，肠鸣音减弱，诊断为“肠梗阻”。

问：(1)请列出该患者存在的两个主要的护理诊断或问题。（2分）

(2)患者出现哪些表现提示其病情加重？（5分）

(3)目前护理要点有哪些？（4分）

2005年(下)外科护理学(一)试卷参考答案

一、1.C 2.B 3.B 4.A 5.A 6.D 7.C 8.D 9.D 10.D 11.B 12.C 13.D 14.A 15.B
16.D 17.A 18.A 19.C 20.B 21.B 22.C 23.D 24.B 25.A 26.C 27.A 28.B 29.C 30.D

二、31.固定 功能锻炼

32.假性尿失禁 压力性尿失禁

33.寒战高热 黄疸

34.腋中线与腋后线之间第6～8肋间 锁骨中线第2肋间

35.24 脂肪组织

36.已损失量 额外损失量

37.嗅神经 视神经

38.血容量不足 心功能不全

39.肉眼血尿 镜下血尿

40.皮下血肿 骨膜下血肿

三、41.压痛、反跳痛和腹肌紧张,三者合称腹膜刺激征,是急性腹膜炎的主要标志。

42.完全胃肠外营养指通过静脉途径给予病人每日所需的全部营养素,是营养治疗的一种方法。

43.搭肩试验是指肩关节脱位时患侧肘部贴胸壁时,手掌搭不到健侧肩部,(或手掌搭在健侧肩部时,肘部无法贴近胸壁。)

44.脑震荡是指暴力引起的一时性脑功能障碍,而无器质性改变,是原发性脑损伤中最轻的一种。

四、45.(1)观察胶布或海绵有无移动、滑脱,绷带是否松散。

(2)保持有效牵引。保持正确体位。

(3)观察足背皮肤感觉及伸趾功能。

(4)观察肢端血运与肿胀情况。

46.(1)术后"T"管留置10～14天。

(2)体温正常。

(3)黄疸消失。

(4)胆汁引流量减至200～300ml/d。

(5)无结石残留。

47.(1)特点:①于麻醉作用消失后出现,24小时内最强烈,2～3天后逐渐减轻。

(2)影响:②影响休息、睡眠,甚至身体器官的生理功能,不利于病人恢复。

48.(1)饮食指导;

(2)宣传饮水、运动的意义;

(3)合理应用药物;

需要全本请访问 www.ertongbook.com

(4)告知病人若出现某些异常情况(如恶心、呕吐、寒战、发热、尿流性状和气味改变)时,应及时就诊;

(5)指导病人观察尿中结石的排出情况。

五、49.(1)年龄大,60岁,体重 80kg,骨折,卧床时间长。

(2)患肢抬高、制动、温敷,禁按摩,溶栓治疗。

(3)抬高患肢;局部热敷;穿弹力袜或应用弹力绷带;肢体运动;抗凝治疗;病情允许尽早下地活动。

50.(1)PC:休克;

PC:绞窄性肠梗阻;

疼痛:与肠缺血坏死及炎症刺激壁层腹膜有关;

体液不足:与频繁呕吐有关。

(2)①腹痛发作急骤,起始即为持续性剧痛,或在阵发性加重之间仍有持续性疼痛,肠鸣音可不亢进。

②病情发展迅速,早期即有休克,抗休克治疗后改善不明显。

③有明显腹膜刺激征,体温上升,脉搏加快,白细胞计数升高。

④腹胀不对称,腹部有局部隆起或触及有压痛的肿块(胀大的肠袢)。

⑤呕吐物、胃肠减压抽出物、肛门排出物为血性,或腹腔穿刺抽出血性液。

⑥经积极非手术治疗而症状体征无明显改善。

⑦腹部 X线检查见孤立、突出胀大的肠袢,不因时间而改变位置,或有假肿瘤状阴影;或肠间隙增宽,提示有腹腔积液。

(3)应用解痉剂;处理呕吐;维持体液平衡;禁食;胃肠减压;病情允许时半卧位;病情观察;应用抗生素;做好术前准备。