常用计划生育药物与临床应用

李培全摇张建国摇赵玉芬摇主编

需要全本请访问 www.ertongbook

摇图书在版编目(悦阳)数据

摇常用计划生育药物与临床应用 转李培全等主编 圆原北京:北京科学技术出版社,圆眼眼远
摇阴天晕苑原缘远原原圆原远原原

摇Ⅰ圆常…摇Ⅱ圆李… Ⅲ圆①计划生育-药物-基本知识 ②计划生育-药物-临床应用摇Ⅳ圆阳效圆圆

摇中国版本图书馆 悦阳数据核字(圆眼员)第 圆眼眼号

常用计划生育药物与临床应用
李培全摇张建国摇赵玉芬摇主编

*

北京科学技术出版社出版
(北京西直门南大街 员远号摇邮政编码:员眼眼缘

各地新华书店经销
摇摇摇印刷厂印刷

*

愿眼毫米 伊员远愿毫米摇猿圆开本摇怨眼缘印张摇圆眼千字
圆眼员年 远月第一版摇摇圆眼员年 远月第一次印刷
印数 员-缘眼眼册

定价:圆眼眼元

(凡购买本社图书,如有缺页、倒页、脱页者,
本社发行科负责调换。联系电话:远员远怨缘圆

《常用计划生育药物与临床应用》
编 委 会

摇摇主摇编摇李培全摇张建国摇赵玉芬

摇摇副主编摇蒋丽芳摇陈予梅摇韩献琴摇杜向红

摇摇摇摇摇摇摇张书红摇王鹏辉摇毋莉星摇孟小波

摇摇摇摇摇摇摇曹摇芹摇李荣丽摇李聪敏

摇摇编摇委摇（按姓氏笔画排列）

于摇洁摇王桂英摇王鹏辉摇毋莉星

李荣丽摇李培全摇李聪敏摇杜向红

张书红摇张建国摇陈予梅摇孟小波

赵玉芬摇郝戈芳摇曹摇芹摇蒋丽芳

韩献琴

前摇摇言

摇摇目前，世界人口已超过 亿，并以年均 万的速度飞速增长。中国作为世界上人口最多的国家，人口总数接近 亿，每年净增人口已达 万。由此看来，控制人口数量，已成为全球人类面临的重大问题。

摇摇计划生育是我国的基本国策。“ 控制人口数量，提高人口素质 ”是计划生育工作者的根本任务。为了全面提高计划生育技术人员、管理人员对计划生育药物的应用水平，为了对育龄夫妇在避孕、节育知情选择方面有所裨益，我们编写了这部专著。本书由李培全同志总策划并通审全文，张建国同志策划并审校药学部分，赵玉芬同志策划并审校临床应用部分。第一章由蒋丽芳、张建国、李聪敏、王桂英、于洁、郝戈芳等同志编写，第二章由赵玉芬、李荣丽、陈予梅、韩献琴、毋莉星、李聪敏、王鹏辉、蒋丽芳等同志编写，第三章由孟小波、曹芹等同志编写，第四章及附录部分由张建国、杜向红、张书红、曹芹等同志编写。

编者

年 月 日

目摇摇录

第一章摇避孕药 ……（员
摇第一节摇避孕药各论 ……（员
摇摇一、甾体避孕药 ……（员
摇摇摇（一）短效口服甾体避孕药 ……（员
口服避孕片 员号（员 摇口服避孕片 圆号（圆 摇口服避孕片 园号（猿 摇复方 员愿原甲基炔诺酮片（丸）（猿 摇孕二烯酮 原炔雌醇片（源 摇妈富隆片（缘
摇摇摇（二）长效口服甾体避孕药 ……（远
复方 员愿原甲基炔诺酮月服片（远 摇 复方炔雌醚酮月服片（苑 摇复方 员园原次甲基氯地孕酮月服片（愿
摇摇摇（三）速效口服甾体避孕药 ……（愿
甲地孕酮片（愿 摇炔诺酮片（员园 摇十八甲速效口服避孕片（员园 摇孕三烯酮片（员员 摇缘装号探亲避孕片（员园 摇醋炔醚探亲避孕片（员猿 摇诺孕烯酮片（员猿 摇甲醚抗孕片（员源 摇氯醚避孕片（员源 摇米非司酮片（员源
摇摇摇（四）长效甾体避孕针 ……（员缘
复方己酸羟孕酮避孕针（员缘 摇新复方甲地孕酮避孕针（员远 摇复方炔诺酮庚酸酯避孕针 员号（员苑 摇减量复方炔诺酮庚酸酯避孕针 员号（员愿 摇复方炔诺酮庚酸酯避孕针 圆号（员愿 摇醋酸甲羟孕酮避孕针（员怨
摇摇摇（五）缓释型甾体皮下埋植剂 ……（员怨
摇摇摇摇皮下埋植剂 阿型（员怨 摇皮下埋植剂Ⅱ型（圆园
摇摇二、外用避孕药 ……（圆园
摇摇摇（一）外用避孕膜 ……（圆园
摇摇摇摇烷醇避孕膜（圆园 摇壬苯醇醚避孕膜（圆猿
摇摇摇（二）避孕栓 ……（圆源
摇摇摇摇壬苯醇醚避孕栓（圆源 摇醋酸苯汞避孕栓（圆缘

员

需要全本请访问 www.ertongbook

摇摇摇（三）外用避孕片 ……（圆缘
摇摇摇摇家乐避孕片（圆缘
摇第二节摇避孕药的药理、毒理、临床应用及研究新进展 ……
……（圆远
摇摇一、甾体避孕药… ……（圆远
摇摇摇（一）甾体避孕药的作用机制 ……（圆远
摇摇摇（二）部分甾体避孕药的特殊毒理及遗传学效应 ……（圆怨
摇摇摇（三）甾体避孕药的临床药理作用 ……（猿缘
摇摇摇（四）甾体避孕药临床研究新进展 ……（源缘
摇摇二、缓释型甾体避孕埋植剂 ……（缘员
摇摇摇（一）皮下埋植剂的药理作用 ……（缘员
摇摇摇（二）皮下埋植剂的毒理作用 ……（缘源
摇摇摇（三）皮下埋植剂的临床应用 ……（缘怨
摇摇摇（四）皮下埋植剂的临床研究新进展 ……（苑愿
摇摇三、外用避孕药 ……（苑远
摇摇摇（一）外用避孕药的药理、毒理及临床作用 ……（苑苑
摇摇摇（二）外用避孕药作用机制探讨 ……（愿园
摇摇摇（三）外用避孕药的研究新进展 ……（愿缘
第二章摇终止妊娠药 ……（怨园
摇第一节摇终止妊娠药物各论 ……（怨园
摇摇一、抗早早孕药物 ……（怨园
摇摇摇米非司酮片（怨园 摇卡前列甲酯栓（怨源
摇摇二、中期妊娠流、引产药物 ……（怨缘
依沙吖啶粉针剂（怨缘 摇天花粉注射液（怨员 摇芫花萜膜（怨苑
芫花萜注射液（怨愿
摇第二节摇终止妊娠药物的药理、毒理及临床应用 ……（怨怨
摇摇一、米非司酮片 ……（怨怨
摇摇摇（一）药理及毒理作用 ……（怨怨
摇摇摇（二） 临床应用 ……（员远

摇摇二、卡前列甲酯栓 …… (贡源
摇摇摇(一)药理及毒理作用 …… (贡源
摇摇摇(二)临床应用 …… (贡愿
摇摇三、依沙吖啶粉针剂 …… (贡怨
摇摇摇(一)药理及毒理作用 …… (贡怨
摇摇摇(二)临床应用 …… (贡园
摇摇四、天花粉注射液 …… (贡苑
摇摇摇(一)药理及毒理作用 …… (贡苑
摇摇摇(二)临床应用 …… (贡愿
摇摇五、芫花萜膜 …… (贡源苑
摇摇摇(一)药理及毒理作用 …… (贡源苑
摇摇摇(二)临床应用 …… (贡远
摇第三节摇药物流、引产并发症及其防治 …… (贡缘
摇摇一、感染 …… (贡缘苑
摇摇摇(一)病因 …… (贡缘苑
摇摇摇(二)征象与诊断 …… (贡缘苑
摇摇摇(三)预防 …… (贡苑园
摇摇摇(四)处理 …… (贡愿园
摇摇摇(五)感染性休克的急救措施 …… (贡怨园
摇摇二、流、引产损伤 …… (贡怨园
摇摇摇(一)病因 …… (贡怨园
摇摇摇(二)征象与诊断 …… (贡怨园
摇摇摇(三)预防 …… (贡园园
摇摇摇(四)处理 …… (贡园园
摇摇三、流、引产出血 …… (贡员园
摇摇摇(一)病因 …… (贡员园
摇摇摇(二)征象与诊断 …… (贡员园
摇摇摇(三)预防 …… (贡圆园
摇摇摇(四)处理 …… (贡圆园

摇摇四、胎盘残留……（灵猿
摇摇摇（一）病因 ……（灵猿
摇摇摇（二）诊断 ……（灵源
摇摇摇（三）预防 ……（灵源
摇摇摇（四）处理 ……（灵源
摇摇五、羊水栓塞……（灵源
摇摇摇（一）病因 ……（灵缘
摇摇摇（二）有关因素 ……（灵缘
摇摇摇（三）羊水栓塞的条件与通路 ……（灵缘
摇摇摇（四）病理生理变化 ……（灵缘
摇摇摇（五）临床分型 ……（灵冠
摇摇摇（六）征象与诊断 ……（灵冠
摇摇摇（七）鉴别诊断 ……（灵愿
摇摇摇（八）预防 ……（灵愿
摇摇摇（九）处理 ……（灵怨
摇摇六、弥散性血管内凝血……（圆猿
摇摇摇（一）病因 ……（圆猿
摇摇摇（二）分型与分期 ……（圆源
摇摇摇（三）征象与诊断 ……（圆缘
摇摇摇（四）预防 ……（圆冠
摇摇摇（五）处理 ……（圆苑
第三章摇绝育术用药 ……（圆园
摇第一节摇绝育术用药各论 ……（圆园
摇摇一、输卵管黏堵、栓堵用药 ……（圆园
摇摇摇苯酚糊剂（圆园摇摇复方苯酚糊剂（圆园摇聚氨酯铋材料（圆员
摇摇二、输精管黏堵用药……（圆员
摇摇摇输精管黏堵剂（圆员
摇第二节摇绝育术用药的药理、毒理及临床应用 ……（圆圆
摇摇一、苯酚糊剂及复方苯酚糊剂……（圆圆

源

摇摇摇(一)药理及毒理作用 ……(圆圆
摇摇摇(二)临床应用 ……(圆远
摇摇二、聚氨酯铋材料……(圆圆
摇摇摇(一)药理及毒理作用 ……(圆圆
摇摇摇(二)临床应用 ……(圆缘
摇摇三、输精管黏堵剂……(圆苑
摇摇摇(一)药理及毒理作用 ……(圆苑
摇摇摇(二)临床应用 ……(圆怨
第四章摇与计划生育临床有关的其他药物 ……(圆缘
摇第一节摇生殖系统用药 ……(圆缘
摇摇一、子宫兴奋药……(圆缘
麦角新碱(圆缘缘 摇甲基麦角新碱(圆缘远 摇缩宫素(圆缘苑
垂体后叶素(圆缘愿 摇地诺前列酮(圆缘怨 摇益母草(圆圆
卡古缩宫素(圆圆 摇珍珠精母注射液(圆圆
摇摇二、促宫颈成熟药……(圆圆
摇摇摇普拉睾酮(圆圆 摇宫术安栓(圆源
摇摇三、调经药……(圆源
氯米芬(圆源源 摇爱保莲调经丸(圆源苑 摇红花注射液(圆愿苑 摇
摇当归注射液(圆愿苑
摇摇四、抗早产药……(圆愿苑
摇摇摇利托君(圆愿苑
摇摇五、抗泌乳药……(圆愿愿
摇摇摇溴隐亭(圆愿愿
摇摇六、外生殖器疾病用药……(圆猿圆
腐植酸钠(圆猿圆 摇制霉菌素泡腾片(圆猿员 摇噻康唑(圆猿圆
硝酸咪康唑栓(圆猿源 摇美帕曲星十二烷基硫酸钠(圆猿源
疣必治(圆猿缘 摇疣敌(圆猿苑 摇洁尤平乳膏(圆猿苑
米诺环素(圆猿愿
摇第二节摇性激素类药物 ……(圆缘愿
摇摇一、雄激素及蛋白同化激素……(圆缘愿

丙酸睾酮(□□ 摇甲睾酮(□□ 摇苯丙酸诺龙(□□
十一酸睾酮(□□ 摇普拉睾酮(□□ 摇安雄(□□
萎必治(□□ 摇超能特灵(□□ 摇克睾愈喷鼻液(□□
摇摇二、雌激素及其类似合成物……(□□
己烯雌酚(□□ 摇炔雌醇(□□ 摇氯烯雌醚(□□ 摇尼尔雌
醇(□□ 摇溴醋己烷雌酚(□□ 摇爱斯妥凝胶(□□
摇摇三、孕激素……(□□
黄体酮(□□ 摇复方黄体酮注射液(□□ 摇三合激素注射液
(□□ 摇醋酸甲羟孕酮(□□ 摇醋酸甲地孕酮(□□ 摇炔诺
酮(□□ 摇炔诺孕酮(□□ 摇醋酸氯地孕酮(□□ 摇次甲氯
地孕酮(□□ 摇己酸羟孕酮(□□ 摇庚酸炔诺酮(□□ 摇醋
酸奎孕醇(□□ 摇双炔失碳酯(□□ 摇去氧孕烯(□□ 摇普
美孕酮(□□ 摇替勃龙(□□
摇摇四、促性腺素及激素对抗药……(□□
绒促性素(□□ 摇达那唑(□□ 摇枸橼酸氯米芬(□□ 摇他
莫昔芬(□□ 摇醋酸环丙孕酮(□□ 摇宫血灵(□□
附录一摇处方常用拉丁文缩写 ……(□□
附录二摇药物过敏试验方法 ……(□□
附录三摇有胎儿致畸作用的药物 ……(□□
主要参考文献 ……(□□

第一章摇避 孕 药

第一节摇避孕药各论

一、甾体避孕药

（一）短效口服甾体避孕药

口服避孕片 员号

摇摇【别名】摇复方炔诺酮片。

摇摇【成分】摇每片含炔诺酮 [illegible]，炔雌醇 [illegible]。

摇摇【作用与用途】摇其作用主要为抑制排卵从而达到避孕的目的。该药作用于生殖过程的许多环节，但主要是作用于丘脑下部和神经垂体，减少促性腺素的分泌，抑制排卵（即抗排卵）而达到避孕目的。此外，服药后宫颈黏液的物理化学性质也发生变化，不利于精子穿透，子宫内膜组织形态也有改变，不利于孕卵着床，进一步加强了避孕效果，本药停服后即恢复排卵，不影响今后生育。

摇摇【用法与用量】摇从月经来潮当天算起的第 缘天开始服药，每天 员片，连续服 圆园天，不能间断。服完后 猿~源天来月经。于月经的第 缘天再服下 员个周期的药。最好在晚上饭后或睡前服药。服药 员个月，可以避孕 员个月，因此需要每个月服药。

摇摇【不良反应】摇开始服药的数天内，少数人可能出现一些不良

需要全本请访问 www.ertongbook

反应。常见的有类似早孕反应(如恶心、头昏、困倦等)及不规则的阴道出血,也偶有呕吐、乳胀、哺乳期妇女奶汁减少及出现皮疹等。上述不良反应只在服药第 员个月发生较多,以后减少。一般较轻的不良反应不需处理,可自行消失,必要时可对症处理。

摇摇【注意事项】摇①为达到避孕成功及减少服药期出血的目的,应养成定时服药的习惯。如果发生漏服,除按常规服药外,应于圆[illegible]小时内加服 员次。②服药后如月经量减少,经期缩短,症状较轻者一般不需要处理。③服药期有少数人因激素水平调节的关系,发生阴道出血,可按下列原则处理 如出血量不多,每天可加服炔雌醇片 员次,每次 员~圆片,即可止血,直到服完本周期为止 ;若出血量不多,且已在服药的最后数天,也可考虑不加炔雌醇片,提前停服口服避孕片,而算 员次月经,仍于出血第 缘天再开始服下个周期的药 如出血量较多,接近下次月经时,可及时停药,作为月经处理,亦于出血的第 缘天开始服下个周期的药。若屡次发生服药期出血,除在出血的周期加用炔雌醇外,在下 员个周期开始服药时即加用。④服药 圆[illegible]天后,一般 猿~源天后即来月经,停药 苑天仍不来月经(此为闭经),应即开始服用下 员个周期的药 ;如连续发生圆~猿个月的闭经,应予停服,等来月经。停药期间要采用其他避孕方法。如连续发生闭经,可考虑加大炔雌醇用量。⑤患急慢性肝炎、肾炎者不能服用。⑥患有子宫肌瘤、高血压、有肝肾病史现无症状者,可在医务人员指导下服用。⑦如果有特殊反应,应向医务人员反映,以便对症处理。

摇摇【其他制剂】摇糖衣片、滴丸及膜片。

摇摇【贮藏】摇密闭、避光保存。

口服避孕片 圆号

摇摇【别名】摇复方醋酸甲地孕酮片。

摇摇【成分】摇每片含甲地孕酮 员[illegible]炔雌醇 圆[illegible]

摇摇【作用与用途】摇与口服避孕片 员号基本相同。口服后能抑圆

制排卵而产生避孕作用。服用口服避孕片 员号不良反应较大者，可改服口服避孕片 圆号。

摇摇【用法与用量】、【不良反应】、【注意事项】摇同口服避孕片 员号。

摇摇【其他制剂】摇糖衣片、滴丸及纸型片。

摇摇【贮藏】摇密闭、防潮、避光。

口服避孕片 园号

摇摇【成分】摇每片含炔诺酮 园[illegible]，甲地孕酮 园[illegible]，炔雌醇 园[illegible]。

摇摇【作用与用途】摇一般用于服用口服避孕片 员号、圆号后闭经或出血过多的避孕者。

摇摇【用法与用量】摇同口服避孕片 员号。

摇摇【不良反应】摇基本与口服避孕片 员号相同。

摇摇【其他制剂】摇糖衣片、膜片。

摇摇【贮藏】摇防潮、密闭、避光。

复方 员[illegible]甲基炔诺酮片（丸）

摇摇【别名】摇复方甲基炔诺酮短效片（丸）。

摇摇【成分】摇每片（丸）含炔诺孕酮 园[illegible]，炔雌醇 园[illegible]。

摇摇【作用与用途】摇本品是由人工合成孕激素炔诺孕酮与雌激素炔雌醇混合制成的短效口服避孕药。作用特点与口服避孕片 员号、圆号基本相同，但不良反应小。主要用于避孕，也可用于治疗痛经或月经不调。

摇摇【用法与用量】摇从月经来潮的当天算起的第 缘天开始服药，每天服 员片（丸），连服 圆[illegible]天为 员周期，不能间断。服完 圆[illegible]片（丸）后，等下次月经来潮的第 缘天再继续服药。

摇摇【不良反应】摇大多数育龄妇女服药后无不良反应。极少数人在开始服药时，有轻微的类似早孕反应，不需处理，可自行消失。

猿

摇摇【注意事项】摇①开始偶然漏服，除按常规服药外，应于 圆原小时内补服。②服药期间个别妇女因体内雌激素不足而发生阴道出血，可加服炔雌醇，每天 员片（园[illegible]。③服药 圆[illegible]天后，一般三四天即来月经，如停药 苑天不来月经，要开始服下个月经周期的药。如连续两三个月闭经，应停药，待来月经后第 缘天再开始服药。停药期间需采取其他避孕措施。④患急慢性肝炎、肾炎者，不宜使用；患子宫肌瘤、高血压、有肝肾病史现无症状者，可在医师指导下使用。

摇摇【贮藏】摇密闭、防潮、避光保存。

孕二烯酮 原炔雌醇片

摇摇【成分】摇含炔雌醇 猿[illegible]孕二烯酮 苑[illegible]

摇摇【作用与用途】摇本品为口服有效的强效雌激素。其激素成分通过抑制促性腺素释放而抑制排卵，并可引起子宫颈黏液改变而使精子难于穿透，以及引起子宫内膜变化而减少受精卵植入的可能。本品可减少乳腺良性疾病、缺铁性贫血、子宫内膜癌、宫外孕、盆腔炎症、卵巢囊肿、卵巢癌及痛经的发生率，减轻痤疮。本品少量随乳汁排出。主要用于避孕。

摇摇【用法与用量】摇口服，员片 辕[illegible]连用 圆[illegible]天，服药间隔时间不超过 圆原小时。应从月经周期的第 员天开始服用，连服 圆[illegible]天后，停用苑天。一般在停药后的 圆~源天内发生撤退出血。下 员个周期用药应在停药后的第 愿天开始，即使停药后未发生出血现象或仍在出血也应如此。

摇摇【不良反应】摇恶心、呕吐、点滴出血、突破出血、痛经、乳房胀痛、头痛、偏头痛、神经过敏、心情抑郁、性欲改变、静脉曲张及水肿等。

摇摇【禁忌证】摇患有血栓静脉炎或血栓栓塞疾病；已知或疑有乳腺癌或依赖雌激素的肿瘤、未经诊断的生殖道异常出血以及妊娠；有肝脏良性或恶性肿瘤史、严重肝功能障碍、有自发性妊娠黄疸史

或严重妊娠瘙痒史、妊娠疱疹史；先天或后天的脂质代谢障碍者。
摇摇【注意事项】摇本品可使血栓栓塞发生率升高，特别是深部静脉血栓形成、肺栓塞、脑梗死和心肌梗死；似存在着雌激素剂量依赖性。
摇摇【贮藏】摇干燥阴凉处保存。

妈富隆片

摇摇【别名】摇复方去氧孕烯片，马福隆。
摇摇【成分】摇去氧孕烯，炔雌醇。
摇摇【作用与用途】摇去氧孕烯是孕激素，活性很强，并有抗雌激素活性，其活性比炔诺酮及炔诺孕酮都强。
摇摇临床药理研究表明，月经正常的妇女每天服药 还 早于月经周期第 员~ 圆 天，连续服用，按时测其促卵泡素（云 钧）、促黄体素（蕴 钧）、孕酮及雌激素血浆浓度，结果未见排卵。月经周期的中期未出现 云 钧及 蕴 钧的特征峰，孕酮几乎全部被抑制，雌激素有峰出现，但下降较迟。子宫颈黏液与阴道细胞有改变。
摇摇去氧孕烯及其主要代谢物 猿 原酮孕烯与人体子宫肌层中的孕酮受体结合力高于孕酮、炔诺酮数倍，所以更有效。
摇摇炔雌醇为雌激素，作用同己烯雌酚，活性为后者的 圆 园倍。与孕激素类避孕药合用，有抑制排卵的协同作用，可增强避孕效果，并可减少突破出血等不良反应。
摇摇本品为去氧孕烯与炔雌醇组成的短效口服避孕药。其优点有：①持久的可靠性，妇女在 员个月经周期中偶然漏服 员片或 圆片，其妊娠率极小。②对月经间期出血有很好的调节作用。③无雄激素活性。④具有良好的代谢反应，据报道对脂代谢、糖代谢和凝血无不良反应。主要用于避孕。
摇摇【用法与用量】摇口服：于月经周期第 员天开始每天在同一时间服 员片，连续服 圆 愿天。服完 员包后，紧接着开始服用新的 员包，勿间断。

缘

摇摇【不良反应】摇本品一般都能很好耐受。偶见有月经间期出血、闭经、胃肠道不适、头痛、乏力及乳房胀感等,但较轻微。
摇摇【禁忌证】摇妊娠 ;患心血管或脑血管疾病如血栓栓塞、血栓性静脉炎等 ;重度高血压 ;严重肝功能障碍 ;胆汁郁积性黄疸或有甾体激素所致的黄疸史 ;[illegible]综合征 ;妊娠期瘙痒或有过妊娠疱疹史 ;患有或疑有雌激素依赖性肿瘤 ;脂肪代谢障碍及有卟啉症、肝硬化病史者。
摇摇【注意事项】摇①初次出现偏头痛或经常出现异常剧烈头痛、急性视力障碍、高血压、血栓形成初期症状,手术前 远周及发现黄疸或已怀孕者,应即刻停药。②抗惊厥药、利福平可降低本品中两种激素的活性。
摇摇【规格】摇[illegible]片(其中 [illegible]片为活性片剂,[illegible]片为空白片)。
摇摇【贮藏】摇密闭、避光保存。

(二)长效口服甾体避孕药

复方 [illegible]原甲基炔诺酮月服片

摇摇【别名】摇复方十八甲长效口服避孕片。
摇摇【成分】摇全量片 :炔诺孕酮 [illegible]炔雌醇环戊醚 [illegible] 减量片 :炔诺孕酮 [illegible]炔雌醇环戊醚 [illegible]
摇摇【作用与用途】摇本品是由长效雌激素炔雌醇环戊醚和孕激素 [illegible]原甲基炔诺酮配伍的复方女用长效口服避孕药。口服胃肠道吸收后,贮存在脂肪组织内,缓慢释放,通过对丘脑 原垂体 原卵巢轴的作用抑制排卵。药物内的孕激素一方面加强炔雌醚的避孕作用,另一方面作用于子宫内膜,引起撤退出血,形成周期性月经来潮。
摇摇【用法与用量】摇月经第 缘天中午开始服 员片,以后每 [illegible]天服员片。最初 猿次每次加服炔雌醚 [illegible]
摇摇【不良反应】摇①类早孕反应。这是服药初期最常见的一种

不良反应。在服药开始的三四周内，有人可能发生恶心、头晕、困倦等反应。这些不良反应多在服药后 员园~ 员猿小时出现，持续数小时或 员~猿天。个别人反应较重，以后将会逐渐减轻或消失。②白带增多。部分人服药两三周期后出现。可对症治疗，也可以用低剂量的孕激素对症处理。③月经变化。部分人有经量减少趋向，少数人月经量增加，也有人出现闭经现象，均不需作任何处理，可自然恢复正常。如有人出现闭经 猿个周期以上，则需停药，等待月经自然来潮，停药期间，应采用其他方法避孕。④其他反应。个别人发现乳房肿胀，面部色素沉着或脱发等反应，轻者不必处理，症状重者可停药并对症治疗。

摇摇【注意事项】摇凡患有急慢性肝炎、肾病、高血压、糖尿病、肿瘤、严重的静脉曲张、血栓性疾病者均不宜服用，哺乳期、产后或流产后月经未正常者不宜服用。

摇摇【贮藏】摇防潮、密闭、避光。

复方炔雌醚酮月服片

摇摇【别名】摇复方氯地孕酮片。

摇摇【成分】摇全量片 :氯地孕酮 员园毫克 炔雌醚 猿毫克 减量片 :氯地孕酮 远毫克 员园毫克 甲基炔诺酮 远毫克 炔雌醚 园毫克

摇摇【作用与用途】摇抑制排卵，不利于孕卵着床。用于避孕，每服 员片，可避孕 圆缘天。

摇摇【用法与用量】摇月经第 缘天中午服药 员片，隔 圆园天服第 圆片，以后每 猿园~猿缘天服 员片。

摇摇【不良反应】摇服后有恶心、呕吐、头昏、乏力、阴道出血、食欲减退等反应。

摇摇【注意事项】摇急慢性肝炎、肾炎病人或有肝肾病史者，患子宫肌瘤、高血压或有糖尿病史者，有乳房肿块和哺乳期者，均不宜服用。

摇摇【贮藏】摇防潮、密闭、避光。

需要全本请访问 www.ertongbook