实用临床药物手册系列

上海市医学会临床药事分委会 辕胡晋红主编

妇产科药物手册

主摇编 :李摇玲摇摇摇摇摇

编写者 :袁摇波摇赵玉芬

摇摇摇摇张黎明摇成佳景摇

第二军医大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

摇图书在版编目（忄儿孱）数据

摇妇产科药物手册 辖李玲主编援 原上海 :第二军医大学出版社，圆匪园源援员
摇（实用临床药物手册系列 辖朝晋红主编）
摇陨杂月晕苑原愿元远园原圆园园源原载

摇Ⅰ援妇…援…摇Ⅱ援李…援…摇Ⅲ援妇产科病 原药物 原手册摇Ⅳ援…原…

摇中国版本图书馆 忄儿孱数据核字（圆匪园源）第 圆愿怨怨元号

妇产科药物手册

主摇摇编 :李摇玲
责任编辑 :王摇勇
第二军医大学出版社出版发行
上海翔殷路 愿愿号摇邮政编码 圆匪园源猿
电话 辖专真：圆匪员原远怨源怨猿猿
全国各地新华书店经销
上海长阳印刷厂印刷
开本 苑愿×员怨圆摇员辕猿摇印张 员员援源摇字数 圆匪远千字
圆匪园源年 员月第 员版摇圆匪园源年 员月第 员次印刷
印数 员~猿匪匪匪
陨杂月晕苑原愿元远园原圆园园源原载猿匪 · 圆园
定价 :圆匪援匪元

内容提要

全书共 [illegible]章，收录了目前临床中使用较为广泛的妇产科药物以及近年上市的新药。收载品种齐全，共计 [illegible]种西药和 [illegible]种中成药，对药名（含别名），制剂规格，药理作用，适应证，用法、用量，药物相互作用，不良反应与注意事项等进行了详细阐述。本书在内容编排上紧密结合临床实际需要，尽量突出全、新、简明、实用的特点，各项内容力求完备，注意涵盖所收载药物各种不同的用法，适合临床医生和药师特别是妇产科医生参考使用。

实用临床药物手册系列
编委会名单

主 任 委 员 胡晋红

副主任委员 张爱莉 唐仲进

顾　　问 张楠森 芮耀诚

委　　员 (以姓氏笔画为序)

王宏图 石力夫 李玲

沈刚 张爱莉 陈念祖

胡晋红 唐仲进 曹惠明

笪志民

策　　划 高敬泉 石进英

序

医药科技是当今发展最迅速的领域之一，新理论、新药物、新疗法层出不穷，药物治疗变得越来越复杂。如何在浩如烟海的药物中选择出适当的药物，制订合理的用药方案，是实施合理治疗的关键，需要大量的药物信息的支持，单凭经验或记忆选择用药已不能适应临床用药的需求。因此，各种用药参考书籍已成为临床医生和药师的有力工具。然而，在实际工作中既可随身携带，又能提供用药详细信息的手册还为数不多。为此，上海市医学会临床药事分委会组织部分临床经验丰富的药学专家，参考国内外有关药物治疗的专著，结合我国各类、各级医院临床用药的实际情况，编著了这套“实用临床药物手册系列”，以便为临床医生和药师提供系统、及时、准确的药物信息。

本系列书分科编写，主要分内科、精神神经科、肿瘤科、儿科、妇产科、皮肤科、眼耳鼻喉口腔科 苑个分册。每一分册重点围绕专科药物的品种和特点撰写，内容相互不重复，如抗生素等普遍使用的药物只收载于内科分册中。

本系列书为专业参考书，具有科学性、实用性、系统性、新颖性等特点，收载了国家基本药物等临床常用药物以及国外新上市药物。其内容简明扼要，主要药品按制剂规格，药理作用，适应证，用法、用

需要全本请访问 www.ertongbook.com

量,药物相互作用,不良反应及注意事项等栏目编写,特别加强了药物相互作用及不良反应等对合理用药参考价值大的相关内容。适合临床医生、临床药师与执业药师使用。

本系列书在编写过程中得到了同行们的热情鼓励与大力支持,在此,谨向他们致以衷心的感谢!

由于临床研究资料的不断更新,书中的疏漏在所难免,可能存在的不妥之处敬请读者指正,并请在参考使用过程中加以甄审。

胡晋红

[illegible]年 [illegible]月

前摇摇言

随着妇产科用药品种的增多以及新药层出不穷，全面、正确地了解这些药物的药理作用和临床使用特点，对临床医生合理地选择和使用药物具有十分重要的意义。本书是专门介绍妇产科用药的手册，以满足临床医生和药师的需要，帮助他们了解目前所使用的一些专科新药的知识。

本手册收录了目前临床中使用较为广泛的妇产科药物以及近年上市的新药，收载品种较齐全，共计 [illegible] 种西药和 [illegible] 种中成药，西药按药理作用或用途分类，中成药以汉语拼音首字字母顺序排列。药品正文内容均列有通用名，商品名与别名，制剂规格，药理作用，适应证，用法、用量，药物相互作用，不良反应与注意事项等项目。在内容编排上，紧密结合临床实际需要，尽量突出全、新、简明、实用的特点，各项内容力求完备，注意涵盖所收载药物各种不同的用法，使临床医生和药师能够快速地检索处方用药的各方面信息，基本能够满足临床医生和药师日常工作的需要。

尽管我们在编写过程中做了大量的核实工作，但由于研究资料的不断更新，挂一漏万之处在所难免，因此本手册内容仅供参考，不妥

之处敬请各位同行与使用者不吝赐教和修正。

在编写本手册时参考引用了国内外的一些文献和书刊，限于篇幅未能尽数列出，在此谨向原作者和出版社致谢。

李摇玲

[illegible]年 愿月

目摇摇录

第一章摇雌激素类药物
摇雌二醇（圆 摇环戊丙酸雌二醇（源 摇苯甲酸雌二醇（源 摇戊酸雌二醇（缘 摇雌三醇（苑 摇炔雌醇（怨 摇美雌醇（员员 摇尼尔雌醇（员员 摇己烯雌酚（员圆 摇甲己烯雌酚（员源 摇丙酸己烯雌酚（员源 摇己烷雌酚（员缘 摇溴醋己烷雌酚（员缘 摇炔雌醚（员远 摇普鲁雌醚（员苑 摇氯烯雌醚（员愿 摇共轭雌激素（员怨 摇苯甲异炔诺酮（圆员 摇

第二章摇孕激素类药物
摇黄体酮（圆缘 摇甲羟孕酮（圆远 摇炔孕酮（圆愿 摇环丙孕酮（圆怨 摇去甲促孕二酮（猿员 摇普美孕酮（猿员 摇孕三烯酮（猿员 摇

第三章摇雄激素类及蛋白类固醇药物
摇甲睾酮（猿缘 摇丙酸睾酮（猿远 摇十一酸睾酮（猿苑 摇苯乙酸睾酮（猿愿 摇氯睾酮（猿怨 摇氟甲睾酮（猿怨 摇复庚睾酮（源员 摇美雄酮（源员 摇庚酸睾酮（源圆 摇苯丙酸诺龙（源圆 摇癸酸诺龙（源缘 摇美雄诺龙（源源 摇羟甲烯龙（源源 摇复合睾酮酯（源缘 摇司坦唑醇（源远

第四章摇促性腺激素及影响排卵药物

摇绒促性素 (源 摇尿促性素 (缘 摇重组人促卵泡激素α (缘 摇重组人促卵泡激素β (缘 摇布舍瑞林 (缘 摇戈那瑞林 (缘 摇戈舍瑞林 (缘 摇亮丙瑞林 (远 摇那法瑞林 (远 摇西曲瑞克 (远 摇加尼瑞克 (远 摇

第五章摇子宫收缩、抗早孕及引产药物
摇缩宫素 (远 摇麦角新碱 (苑 摇垂体后叶素 (苑 摇依沙吖啶 (苑 摇米非司酮 (苑 摇前列腺素 (苑 摇地诺前列素 (苑 摇地诺前列酮 (苑 摇吉美前列素 (苑 摇甲烯前列素 (愿 摇卡波前列素 (愿 摇硫前列酮 (愿 摇普拉睾酮 (愿 摇普洛舒定 耘 (愿 摇环氧司坦 (愿 摇天花粉蛋白 (愿 摇芫花萜 (愿 摇

第六章摇抗早产及保胎药物
摇利托君 (愿 摇沙丁胺醇 (怨 摇特布他林 (怨 摇硫酸镁 (怨 摇烯丙雌醇 (怨 摇

第七章摇抗泌乳药物
摇溴隐亭 (怨 摇甲麦角林 (怨 摇卡麦角林 (员园 摇

第八章摇避孕药物
一、长效避孕药
摇己酸孕酮 (员园 摇氯地孕酮 (员园 摇次甲氯地孕酮 (员园 摇炔诺孕酮 (员园 摇庚炔诺酮 (员园 摇甲

孕环酯 (元源 摇

需要全本请访问 www.ertongbook.com

二、短效避孕药

摇炔诺酮（[illegible]） 摇左炔诺孕酮（[illegible]） 摇甲地孕酮（[illegible]） 摇奎孕酮（[illegible]） 摇诺孕酯（[illegible]） 摇去氧孕烯（[illegible]） 摇炔酮肟（[illegible]） 摇双炔失碳酯（[illegible]） 摇孕二烯酮（[illegible]） 摇屈螺酮[illegible]炔雌醇（[illegible]） 摇

三、外用避孕药

摇苯扎氯铵（[illegible]） 摇米他氯铵（[illegible]） 摇酚碘氯胶（[illegible]） 摇苯汞（[illegible]） 摇复方苯酚（[illegible]） 摇孟苯醇醚（[illegible]） 摇壬苯醇醚（[illegible]） 摇烷苯醇醚（[illegible]） 摇

第九章摇性激素对抗药

摇达那唑（[illegible]） 摇阿纳曲唑（[illegible]） 摇来曲唑（[illegible]） 摇他莫昔芬（[illegible]） 摇氯米芬（[illegible]） 摇托瑞米芬（[illegible]） 西替考马（[illegible]） 摇氨鲁米特（[illegible]） 摇福美司坦（[illegible]） 摇依西美坦（[illegible]） 摇曲妥珠单抗（[illegible]） 摇

第十章摇抗骨质疏松药

摇羟乙膦酸盐（[illegible]） 摇阿伦膦酸钠（[illegible]） 摇丙氨膦酸盐（[illegible]） 摇氯曲膦酸盐（[illegible]） 摇利塞膦酸钠（[illegible]） 氟化钠（[illegible]） 摇一氟磷酸二钠（[illegible]） 摇一氟磷酸谷氨酰胺（[illegible]） 摇活性钙（[illegible]） 摇氨基酸螯合钙（[illegible]） 摇骨化三醇（[illegible]） 摇[illegible]基骨化醇（[illegible]） 鲑鱼降钙素（[illegible]） 摇鳗鱼降钙素（[illegible]） 摇

第十一章摇抗感染药物

一、青霉素类抗生素

摇青霉素 郧(灵藏源 摇普鲁卡因青霉素 (灵藏蒲 摇苄星青霉素 (灵藏苑 摇苯唑西林钠 (灵藏愿 摇氯唑西林钠 (灵藏怨 摇氨苄西林钠 (灵藏园 摇阿莫西林 (灵藏圆 摇羧苄西林钠 (灵藏源 摇哌拉西林钠 (灵藏缘 摇氨苄西林—舒巴坦 (灵藏愿 摇阿莫西林—克拉维酸 (灵藏怨 摇哌拉西林钠—三唑巴坦钠 (灵藏员 摇替卡西林钠—克拉维酸钾 (灵藏缘 摇

二、头孢菌素类抗生素

摇头孢氨苄 (灵藏愿 摇头孢羟氨苄 (灵藏怨 摇头孢唑啉钠 (圆藏员 摇头孢拉定 (圆藏圆 摇头孢克洛 (圆藏源 摇头孢孟多酯钠 (圆藏缘 摇头孢呋辛钠 (圆藏愿 摇头孢呋辛酯 (圆藏怨 摇头孢噻肟钠 (圆藏员 摇头孢哌酮钠 (圆藏猿 摇头孢他啶 (圆藏缘 摇头孢唑肟 (圆藏苑 摇头孢甲肟 (圆藏愿 摇头孢克肟 (圆藏园 摇头孢曲松钠 (圆藏员 摇头孢哌酮钠—舒巴坦 (圆藏猿 摇头孢吡肟 (圆藏缘 摇

三、氨基糖苷类抗生素

摇链霉素 (圆藏愿 摇庆大霉素 (圆藏员 摇阿米卡星 (圆藏猿 妥布霉素 (圆藏苑 摇大观霉素 (圆藏苑 摇

四、大环内酯类抗生素

摇红霉素 (圆藏怨 摇克拉霉素 (圆藏员 摇罗红霉素 (圆藏猿 阿奇霉素 (圆藏缘 摇乙酰麦迪霉素 (圆藏苑 摇吉他霉素 (圆藏愿 摇交沙霉素 (圆藏怨 摇

五、四环素类抗生素

摇四环素 (圆缘圆 摇土霉素 (圆缘圆 摇多西环素 (圆缘猿 摇美他环素 (圆缘源 摇米诺环素 (圆缘缘 摇

六、林可霉素类抗生素

摇林可霉素 (圆缘愿 摇克林霉素 (圆原圆 摇

七、其他抗生素

摇多黏菌素 月(圆原圆 摇万古霉素 (圆原猿 摇去甲万古霉素 (圆原缘 摇磷霉素 (圆原苑 摇氨曲南 (圆原愿 摇亚胺培南—西司他丁钠 (圆原怨 摇

八、磺胺类抗菌药物

摇复方磺胺甲□唑 (圆猿圆 摇磺胺嘧啶 (圆猿猿 摇柳氮磺吡啶 (圆猿缘 摇

九、喹诺酮类抗菌药物

摇吡哌酸 (圆猿远 摇诺氟沙星 (圆猿苑 摇氧氟沙星 (圆猿园 左氧氟沙星 (圆猿圆 摇依诺沙星 (圆猿猿 摇环丙沙星 (圆猿源 摇妥舒沙星 (圆猿远 摇

十、其他抗菌药物

摇呋喃唑酮 (圆源苑 摇呋喃妥因 (圆愿愿 摇甲硝唑 (圆愿愿 替硝唑 (圆愿园 摇

十一、抗真菌药物

摇两性霉素 月(圆愿园 摇咪康唑 (圆愿源 摇益康唑 (圆愿远 酮康唑 (圆愿苑 摇伊曲康唑 (圆愿怨 摇氟康唑 (猿圆园 摇克霉唑 (猿圆圆 摇氟胞嘧啶 (猿圆猿 摇特比萘芬 (猿圆源 制霉菌素 (猿圆缘 摇

十二、抗病毒药物

摇阿昔洛韦 (猿圆苑 摇阿糖腺苷 (猿圆怨 摇利巴韦林 (猿猿园 摇齐多夫定 (猿猿圆 摇拉米夫定 (猿猿源 摇干扰

素 (猿缘 摇
第十二章摇其他妇科药物
摇联苯苄唑 (猿苑 摇聚甲酚磺醛 (猿愿 摇聚维酮碘
(猿圆 摇
第十三章摇中成药
摇艾附暖宫丸 (猿圆 摇八珍益母丸 (猿辕 摇当归红
枣颗粒 (猿源 摇当归丸 (猿源 摇福尔净 (猿缘 摇福
尔坤栓 (猿园 摇妇康宁片 (猿苑 摇妇科千金片
(猿苑 妇炎消胶囊 (猿愿 摇肤阴洁洗液 (猿怨 摇加
味逍遥丸 (猿怨 摇金妇康 (猿圆 摇金刚藤糖浆
(猿员 摇抗宫炎片 (猿员 摇丽人圣洁 (猿圆 摇七制
香附丸 (猿辕 摇圣洁洗液 (猿源 摇四物合剂 (猿缘
摇调经止带丸 (猿园 摇痛经丸 (猿园 摇维妮好
(猿苑 摇乌鸡白凤丸 (猿愿 摇益母草膏 (猿怨 摇玉
清液 (猿员 元胡止痛片 (猿圆 摇
中文索引 …… (猿源
英文索引 …… (猿园

第一章雌激素类药物

雌激素根据其来源分为类：

天然雌激素是类固醇化合物，有雌二醇、雌酮、雌三醇，它们的生理活性强度比为

雌激素合成衍生物具有可口服和专效的优点，有炔雌醇、炔雌醚和戊酸雌二醇。

全合成雌激素是非类固醇化合物，与雌二醇结构大体相似，有雌激素作用，如氯烯雌醚。

雌激素主要通过与靶细胞内雌激素受体特异结合，形成复合物，然后与雌激素反应成分相互作用。雌激素可通过皮肤、黏膜、皮下肌肉等各种途径吸收。主要用于：①补充女性激素分泌不足；②更年期综合征；③回乳；④乳腺癌；⑤前列腺癌；⑥避孕；⑦其他。

雌激素的主要不良反应有：①厌食、恶心、呕吐及头昏；②长期大量使用可引起子宫内膜过度增生及子宫出血，增加子宫癌的发生率，绝经期妇女使用雌激素可使子宫癌发病率增加；③长期大量使用，可致水、钠潴留，引起高血压、水肿以及加重心力衰竭；④除前列腺癌及绝经后乳腺癌患者外，禁用于其他肿瘤患者。

雌二醇 (员苑 雌二醇、求偶素、爱斯妥、补佳乐、妇舒特、更乐、求偶二醇、伊尔贴)

韵藻糟蹋(韵藻糟蹋藻藻孕孙糟糟糟糟,耘耘糟糟糟糟造

【制剂规格】摇注射液 员园皂员皂;控释贴片 :每张分别含雌二醇 园皂苑皂、源皂苑皂、愿皂苑皂,相应面积为缘糟皂,员园糟皂,圆园糟皂;凝胶剂 :每支 愿园早,含雌二醇园灶员豫;缓释片剂 员园皂早。

【药理作用】摇本品是体内主要由卵巢成熟滤泡分泌的一种天然雌激素,能促进和调节女性性器官及副性征的正常发育。其主要药理作用为 :①促使子宫内膜增生,增强子宫平滑肌的收缩 ;②促使乳腺导管发育增生,但较大剂量能抑制腺垂体催乳素的释放,从而减少乳汁分泌 ;③抗雄激素作用 ;④降低血中胆固醇,并能增加钙在骨中的沉着。本品可从胃肠道和皮肤吸收,但口服易被破坏,因此主要采用肌内注射和外用。外用时雌二醇从皮肤渗透直接进入血液循环,可避免肝脏首过代谢作用,且不损害肝功能。本品在体内代谢为活性较弱的雌酮及雌三醇,并与葡萄糖醛酸和硫酸结合后灭活,从尿中排出。

【适应证】摇临床用于卵巢功能不全或卵巢激素不足引起的各种症状,主要是功能性子宫出血、原发性闭经、绝经期综合征以及前列腺癌等。肝、肾功能不全者忌用。

【用法、用量】摇肌内注射 :每次 园援缘~员援园皂早,

需要全本请访问 www.ertongbook.com