中华医学全集

国家基本药物大全（五）

王宝勤　主编

中华医学电子音像出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编．—北京：中华医学
电子音像出版社，2004

ISBN 7-900106-23-5
Ⅰ．中… Ⅱ．王… Ⅲ．医药学－文集－汇编
Ⅳ．R2.52
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行
(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)
全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷
开本：787×1092 1/32
2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷
版号：ISBN 7-900106-23-5/R·01
定价：6998.00 元(1CD,含配套书)

目　录

沁尿系统用药..... 1
利尿药..... 2
◎阿米洛利..... 2
◎氨苯蝶啶..... 3
◎布美他尼..... 5
◎呋塞米..... 7
◎螺内酯..... 8
◎氢氯噻嗪..... 10
前列腺素调节约.....11
◎非那甾胺.....11
尿路平滑机松驰药..... 12
◎黄酮哌酯..... 12
◎特拉唑嗪..... 13
脱水药..... 15

◎甘露醇..... 15
消化类药..... 17
其他消化类药..... 18
◎安达美..... 18
◎垂体后叶素..... 19
◎东莨菪碱..... 20
◎二甲硅油..... 21
◎复合氨基酸..... 22
◎口服补液盐..... 24
◎凝血酶..... 25
◎水乐维他..... 26
◎维他利匹特..... 27
◎英脱利匹特..... 28
止泻药..... 30
◎地芬诺酯(苯乙哌啶)..... 30
◎复方樟脑酊..... 32
◎洛派丁胺..... 32

泻药..... 35
◎蓖麻油..... 35
◎地芬诺酯(苯乙哌啶)..... 36
◎酚酞..... 37
◎复方樟脑酊..... 38
◎甘油..... 39
◎开塞露..... 40
◎洛派丁胺..... 41
◎液体石蜡..... 43
肝胆疾病辅助用药..... 44
◎苯丙醇..... 44
◎复合支链氨基酸..... 46
◎谷氨酸钾..... 47
◎谷氨酸钠..... 48
◎核糖核酸..... 49
◎精氨酸..... 50
◎联苯双酯..... 51

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎葡醛内酯..... 52
◎去氢胆酸..... 53
◎乳果糖..... 54
◎水飞蓟素..... 56
◎熊去氧胆酸..... 57
◎鱼肝油酸钠..... 59
肠道用药..... 59
◎柳氮磺胺吡啶..... 59
胃肠解痉及胃动力药..... 61
◎阿朴吗啡..... 61
◎阿托品..... 62
◎颠茄..... 65
◎丁溴东莨菪碱..... 66
◎多潘立酮..... 68
◎甲氧氯普胺..... 69
◎山莨菪碱..... 71
◎溴丙胺太林..... 72

酶及菌帛剂..... 73
◎多酶片..... 73
◎干酵母..... 74
◎乳酶生..... 75
◎胃蛋白酶..... 76
◎胰酶..... 77
激素及内分沁类药..... 79
下丘脑垂体激素..... 80
◎垂体后叶素..... 80
◎促皮质素..... 81
◎促性腺激素释放激素激动剂..... 83
◎加压素..... 83
◎尿促性素..... 85
◎绒促性素..... 86
◎生长激素..... 88
影响古代谢药..... 89
◎骨化三醇..... 89

◎降钙素..... 90
◎碳酸钙..... 91
◎维生素 D2..... 92
◎维生素 D3..... 93
甲状腺激素及抗甲状腺..... 94
◎丙硫氧嘧啶..... 94
◎复方碘口服溶液..... 95
◎甲巯咪唑..... 96
◎甲状腺片..... 97
◎左旋甲状腺素..... 99
肾上腺激素..... 100
◎氨鲁米特..... 100
◎倍氯米松..... 101
◎地塞米松..... 103
◎甲泼尼龙..... 104
◎可的松..... 105
◎泼尼松..... 106

◎泼尼松龙..... 108
◎氢化可的松..... 109
◎去氧皮质酮.....110
肾上腺素能阻滞剂.....112
◎酚苄明.....112
◎酚妥拉明.....113
降血糖药及胰岛素.....115
◎苯乙双胍.....115
◎二甲双胍.....117
◎格列本脲.....118
◎格列吡嗪.....119
◎格列喹酮..... 121
◎格列齐特..... 122
◎胰岛素..... 123
雄激素及同化激素..... 125
◎苯丙酸诺龙..... 125
◎丙酸睾酮..... 127

◎十一酸睾酮..... 128
烧伤药..... 130
◎磺胺嘧啶锌..... 130
◎磺胺嘧啶银..... 131
生物制品..... 132
疫苗、菌苗毒素及血..... 133
◎多价精制气性坏疽抗毒素..... 133
◎精制白喉抗毒素..... 134
◎精制抗蝮蛇毒血清..... 135
◎精制抗狂犬病血清..... 136
◎精制抗炭疽血清..... 137
◎精制破伤风抗毒素..... 138
◎精制肉毒抗毒素..... 139
疫苗类..... 140
◎A 群脑膜炎球菌多糖菌苗..... 140
◎冻干黄热病活疫苗..... 141
◎冻干卡介苗..... 142

◎冻干流行性腮腺炎活疫苗..... 144
◎冻干流行性乙型脑炎活疫苗..... 145
◎冻干麻疹活疫苗..... 145
◎冻干人用布氏菌病活菌苗..... 147
◎冻干鼠疫活菌苗..... 148
◎钩端螺旋体菌苗..... 149
◎脊髓灰质炎活疫苗..... 151
◎流行性乙型脑炎灭活疫苗..... 154
◎人用狂犬病疫苗..... 155
◎森林脑炎疫苗..... 156
◎伤寒副伤寒甲乙菌苗..... 158
◎伤寒菌苗..... 159
◎炭疽活菌苗..... 160
类毒素类..... 161
◎吸附百日咳菌苗、白喉、破伤风类毒素混合制剂..... 161
◎乙型肝炎血源疫苗..... 163

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎吸附精制白喉、破伤风二联类毒素..... 164
◎吸附精制白喉类毒素..... 165
◎吸附精制破伤风类毒素..... 166
细胞精子类..... 168
◎冻干精制人白细胞干扰素..... 168
◎基因工程干扰素 A1 169
◎基因工程干扰素A-2A..... 170
◎基因工程干扰素A-2B..... 172
血液制品..... 173
◎破伤风免疫球蛋白..... 173
◎人胎盘丙种球蛋白..... 175
◎人血丙种球蛋白..... 176
◎乙型肝炎免疫球蛋白..... 177

泌尿系统用药

利尿药

◎阿米洛利

药剂名称：阿米洛利

别 名 ： 胍 酰 吡 嗪 、 氨 氯 吡 咪 、 Amloride、Amipramiaide

性状：其盐酸盐为淡黄色粉末，无臭或几乎无臭。溶于水、乙醇，几乎不溶于氯仿，乙醚。

药理和应用：

为利尿剂，与氨苯蝶啶相似，作用于远曲小管、降低氢离子的分泌及钾、钠交换，本品为一减少排钾的利尿药。可增加钠、氯的排泄，减少钾的排泄而利尿。临床可用于肝硬变、心力衰竭及慢性肾炎等引起的水肿。

用法和用量：口服：每次5mg~10mg，**每日**2**次。**

体内过程：

本品在胃肠道吸收不完全，口服3~4**小时血药浓度可达峰值，在尿中以原形物排出，少量从胆汁排出，半衰期约为**6**小时，口服后**2**小时起效，作用约**24**小时。**

不良反应和注意：

服后可有胃肠道反应及感觉异常，渴感、头晕、皮疹、乏力、肌痛及视觉变化等，也可有直立性低血压、血尿氮浓度升高等。

制剂和规格：片剂：5mg/**片。**

◎氨苯蝶啶

药剂名称：氨苯蝶啶

别 名 ： 三 氨 蝶 啶 、 Triamterene 、 Dyrenium 、 Urocaudol、Pterofon

性状：

本品为黄色结晶性粉末，无臭或几乎无臭、无味，不溶于水、乙醇、氯仿或乙醚，极微溶于冰醋酸。

药理和应用：

本品作用部位、药理和应用与螺内酯相同。但本品不是醛固酮拮抗剂。与其它利尿药合用时，能显著提高各自的利尿作用并能减轻不良反应。本品服后1**小时即产生利尿作用，**4**～**6**小时达高峰，药效可持续**12**～**16**小时。用于治疗心力衰竭、肝硬化腹水、慢性肾炎和其它原因引起的顽固性水肿。服药后尿常呈淡兰色荧光。**

用法和用量：口服：每次50mg～100mg**，每日**3**次，**7**天为一疗程。**

不良反应和注意：

高血钾患者和严重肾功能不全、肝功能不全者禁用。服后偶有恶心、呕吐、嗜睡、腹泻、乏力、口干、皮疹等，应随时调整剂量。

制剂和规格：片剂：50mg/**片。**

◎布美他尼

药剂名称：布美他尼

别名：丁尿胺、丁苯氧酸、Bumetanide

性状：为白色结晶或结晶性粉末，无臭、味微苦。可溶于乙醇，微溶于氯仿，不溶于水。

药理和应用：

本品为髓袢利尿药，其作用部位、作用机制、电解质丢失和作用特点均与呋喃苯胺酸、利尿酸相似。具有高效、速效、短效和低毒的特点。临床上主要作为呋喃苯胺酸的代用品，用于各种顽固性水肿及急性肺水肿。对急慢性肾功能衰竭患者尤为适宜，这是因为本品除具有呋喃苯胺酸促进肾血流量和肾小球滤过率作用外，还由于本品在尿液中所需的摩尔浓度较呋喃苯胺酸低得多，故肾衰时，本品的利尿作用的减弱程度远低于呋喃苯胺酸。

用法和用量：

需要全本请访问 www.ertongbook.com