中华医学全集

国家基本药物大全

(一)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

其他用药.....1

◎亚甲蓝.....1

口腔清洁剂及牙科辅助.....2

◎氯己啶.....2

口腔科及麻用药.....4

◎丁卡因.....4

◎普鲁卡因.....5

牙周及粘模用药.....6

◎碘化油.....6

呼 吸 类 药.....1

◎多沙普仑.....1

◎二甲弗林.....2

◎洛贝林.....3

◎尼可刹米.....4

平喘药.....6

◎氨茶碱.....6

◎倍氯米松.....9

◎丙卡特罗.....10

◎茶碱.....12
◎二羟丙茶碱.....13
◎复方茶碱.....14
◎克仑特罗.....15
◎氯丙那林（氯喘）.....16
◎曲尼司特.....18
◎去氧羟嗪.....19
◎色甘酸钠.....20
◎沙丁胺醇.....21
◎特布他林.....23
◎酮替芬.....25
◎异丙托溴铵.....26

祛痰药.....28

◎A-糜蛋白酶.....28
◎氯化铵.....29
◎羧甲司坦.....30
◎溴已新.....31
◎乙酰半胱氨酸.....33

镇咳痰.....35

◎阿桔片.....35
◎百咳灵.....36
◎苯丙哌林.....37
◎二氧丙嗪.....38
◎福尔马定.....39

◎复方甘草合剂.....40
◎可待因.....41
◎氯哌斯汀.....43
◎喷托维林.....44
◎右美沙芬.....45
其他妇女科用药.....1
◎巴曲酶.....1
◎氟芬那酸.....2
◎钙尔奇 D.....3
◎谷维素.....4
◎胼屈嗪.....5
◎聚甲酚磺醛.....7
◎维生素 E.....7

子宫收缩药及引产药.....8

◎利托君.....8
◎麦角新碱.....10
◎沙丁胺醇.....11
◎缩宫素.....12

抗感染药.....13

◎高锰酸钾.....13

◎克林霉素.....14
◎克霉唑.....14
◎氯己定.....15
◎咪康唑.....16

◎伊曲康唑.....16
◎制霉素.....17

促性腺激素.....18

◎达那唑.....18
◎甲睾酮.....20
◎氯米芬.....21
◎尿促性素.....22
◎绒促性素.....24
◎替勃龙.....25

孕激素.....26

◎醋酸甲地孕酮.....26
◎醋酸甲羟孕酮.....28
◎黄体酮.....29
◎己酸羟孕酮.....31
◎普拉睾酮钠.....33
◎炔诺酮.....34

雌性激素.....36

◎苯甲酸雌二醇.....36
◎雌二醇.....37
◎己烯雌酚.....38
◎尼尔雌醇.....41

促白血胞生成素.....44

◎肌苷.....44

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎粒细胞集落刺激因子 45

抗药血药 46

◎醋硝香豆素 46
◎低分子肝素 47
◎肝素钙 49
◎华法林钠 50
◎链激酶 52
◎尿激酶 54
◎噻氯匹定 55
◎双嘧达莫 57

抗贫血药 58

◎丙酸睾酮 58
◎富马酸亚铁 59
◎红细胞生成素 60
◎抗淋巴细胞球蛋白 62
◎硫酸亚铁 FERROUS SULFATE 63
◎葡萄糖酸亚铁 64
◎山梨醇铁 65
◎司坦唑醇 67
◎亚叶酸钙 68
◎叶酸 69

止血药 71

◎氨甲环酸 71

◎抗血友病球蛋白（因子Ⅷ）……72
◎凝血酶原复合物（因子Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ）……74
◎维生素 K1……75
◎亚硫酸氢钠甲萘醌……77
◎抑肽酶……79
◎鱼精蛋白……80

血容量扩充剂……81

◎低分子羟乙基淀粉……81
◎羟乙基淀粉……82
◎人血白蛋白……83
◎右旋糖酐 40……84
◎右旋糖酐 70……86

他心血管类药……89

◎阿米洛利……89
◎阿司匹林……90
◎阿托品……92
◎氨苯蝶啶……92
◎苯妥英钠……94
◎布美他尼……95
◎呋塞米……97
◎管通……98
◎利多卡因……101
◎硫酸镁……102
◎氯化钾……104

◎螺内酯……105
◎门冬氨酸钾镁……106
◎氢氯噻嗪……108
◎三磷腺苷……109
◎山莨菪碱……110
◎罂粟碱……112

抗休克药……113

◎苯福林……113
◎多巴胺……115
◎多巴酚丁胺……117
◎甲氧明……119
◎间羟胺……120
◎肾上腺素……122
◎肾上腺素……124
◎异丙肾上腺素……126

抗心力衰竭药……128

◎β-甲基地高辛……128
◎氨力农……129
◎地高辛……131
◎毒毛花甙 K……133
◎毛花甙 C……134
◎去乙酰毛花甙……135
◎洋地黄毒甙……137

抗心律失常药……139

◎阿替洛尔.....139
◎安搏律定.....141
◎胺碘酮.....142
◎丙吡胺.....145
◎奎尼丁.....146
◎美托洛尔.....149
◎美西律.....150
◎普鲁卡因胺.....152
◎普罗帕酮.....154
◎普萘洛尔.....156
◎双氢奎尼丁.....157
◎维拉帕米.....159
◎溴苄铵托西酸盐.....160
◎乙吗噻嗪.....162

抗心绞痛药.....164

◎单硝酸异山梨酯.....164
◎地尔硫.....166
◎戊四硝酯.....167
◎硝苯地平.....169
◎硝酸甘油.....171
◎硝酸异山梨酯.....173

抗血小板药.....175

◎双嘧达莫.....175

抗高血压药.....176

◎二氮嗪……176
◎酚苄明……178
◎酚妥拉明……179
◎甲基多巴……181
◎卡托普利……183
◎可乐定……185
◎利血平……187
◎米诺地尔……188
◎尼群地平……190
◎哌唑嗪……192
◎双肼屈嗪……193
◎乌拉地尔……195
◎硝普钠……197
◎依那普利……198
◎吲达帕胺……200

调血脂药……202

◎阿西莫司……202
◎非诺贝特……203
◎吉非贝齐……205
◎洛伐他汀……206

口 腔 类 药

需要全本请访问 www.ertongbook.com

其他用药

◎亚甲蓝

药剂名称： 亚甲蓝

别名： 美蓝、甲烯蓝、Methylthionium.chloride、Methylene-Blue

性状：为暗绿色并带铜样光泽的结晶或结晶性粉末，无臭。能溶于水、醇，并呈蓝色。

药理和应用：

本品为一种氧化还原剂，具有抗炎、抗菌及解毒等作用。除此以外亚甲蓝医疗上还有其他的一些用途：1.**局部止痛作用：试验表明亚甲蓝与感觉神经纤维亲和性很强，其溶液加入葡萄糖后这种新和力则进一步加强，而产生较明显的局部止痛作用。**2.**手术标志的揭示剂：本品对组织除有微弱的防腐作用外，并可用为手术标志的指示剂。将其与**1%**荧光素合用于**

则组织缺损处呈蓝色，其周组织呈绿色，而便于局部手术之进行。3.本品尤适用于口咽部鳞状上皮细胞的标物，用1%亚甲蓝溶液3ml在经气管抽吸标本前对患者行口咽部喷雾后，抽取标本，用显微镜检查，即可鉴别口咽部分泌物的污染。微量的口咽污染都可被发现，而便于采取治疗措施。4.修复末梢神经髓质：亚甲蓝和神经组织有较强的亲和力，用0.2%浓度局部注射后，可将病损的末梢神经髓质破坏，使产生新的健康的髓质。

制剂和规格： 注射液：20mg/2ml。

口腔清洁剂及牙科辅助

◎氯己啶

药剂名称： 氯己啶

别名： 洗必泰、双氯苯双胍己烷、Chlorhexidine、

Hibitane

性状： 为白色或几乎白色结晶性粉末，无臭，有苦味。略溶于水、乙醇。

药理和应用：

本品有很强的抑菌、杀菌作用，革兰氏阳性和阴性菌的抗菌作用均比新洁尔灭消毒伤作用更强，即使在有血清、血液等存在时仍有效。局部刺激性及过敏反应都很少见。洗必泰葡萄糖酸盐Chlorhexidine Gluconate与洗必泰醋酸盐有着相同的杀菌作用。葡萄糖酸洗必泰含漱剂可用于牙龈炎、牙出血、牙周炎、牙槽脓肿、感染性口腔炎等口腔疾病的防治。

用法和用量：

用于口腔含漱消炎：可以将较浓的制品稀释成0.02～0.03%或其它适宜的浓度使用。

制剂和规格： 溶液：10g/200ml。

口腔科及麻用药

◎丁卡因

药剂名称： 丁卡因

别名： 地卡因，潘托卡因、Tetracaine、Dicaine,Pantocaine

性状： 其盐酸盐为白色或类白色结晶性倭末，有吸湿性，味苦而麻。易溶于水。

药理和应用：

本品局麻作用比普鲁卡因强，毒性亦较大，能透过粘膜。主要用于粘膜麻醉。用药后1～3**分钟起效，可维持**2～3**小时。又用于粘膜表面麻醉、传导麻醉、硬膜外麻醉等。**

用法和用量：

表面麻醉：0.5～2%**溶液。阻滞麻醉：**0.2～0.3%**溶液，极量**0.1g**。硬膜外麻醉：**0.3%**溶液，极量**0.1g**。**

制剂和规格： 注射液：50mg/5ml。

◎普鲁卡因

药剂名称： 普鲁卡因

别名： 奴佛卡因、Procaine、Novocaine

性状：

其盐酸盐为无色、无臭小针状或小叶状结晶，味微苦，舌尝之有钝麻感。易溶于水，略溶于乙醇，微溶于氯仿。

药理和应用：

局麻药。本品能使细胞膜稳定，降低其对离子的通透性，使神经冲动达到时，钠、钾离子不能进出细胞膜产生去极化和动作电位，从而产生局麻作用。本品对粘膜的穿透力差，不适于表面麻醉，但毒性小，效果确实，订用于浸润麻醉。亦可用阻滞麻醉，硬膜外麻醉等。

用法和用量： 口腔科用其3～4%溶液，按盐酸盐计

算，每小时不超过0.75g。

制剂和规格： 注射液：25mg/10ml。

牙周及粘模用药

◎碘化油

药剂名称： 碘化油

别名： Iodized Oil

药理和应用：

本品为临床常用的一种诊断用药，也是口腔科常备的造影剂。如用于涎腺X**光片造影检查以及结膜试验等。眼科用的一般为含量**40%**的碘化油注射剂。使用本品的不良反应并不严重，但应特别注意的是过敏反应，所以在用前需对患者作碘的过敏试验。以防不测。**

需要全本请访问 www.ertongbook.com