中华医学全集

国家基本药物大全

(二)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

其他抗过敏药及抗变态 7

◎倍氯米松 7
◎酮替芬 8

抗组胺药 10

◎阿司咪唑 10
◎苯海拉明 11
◎茶苯海明 13
◎氯苯那敏 14
◎氯雷他定 15
◎马来那敏 16
◎曲吡那敏 17
◎去氯羟嗪 18
◎赛庚啶 19
◎特非那定 20
◎西替利嗪 22
◎异丙嗪 23

其他抗寄生虫类药 26

◎吡喹酮 26
◎硫氯酚 28

◎乙胺嗪.....29
抗疟疾病药.....32
◎伯氨喹.....32
◎磺胺多辛.....33
◎奎宁.....34
◎咯萘啶.....36
◎氯喹.....38
◎哌喹.....41
◎青蒿琥酯.....42
◎乙胺嘧啶.....43
抗肠道蠕虫病药.....45
◎阿苯达唑.....45
◎甲苯咪唑.....46
◎氯硝柳胺.....48
◎哌嗪.....49
◎噻嘧啶.....51
◎左旋咪唑.....52
抗阿米巴虫病药.....54
◎巴龙霉素.....54
◎甲硝唑.....56
◎双碘喹啉.....58
◎依米丁.....59

抗黑热病药.....61

◎喷他脒.....61
◎葡萄糖酸锑钠.....63

抗微生药物.....64

◎吡哌酸.....64
◎复方磺胺甲基噁唑.....66
◎环丙沙星.....67
◎磺胺嘧啶.....69
◎甲氧苄啶（甲氧苄氨嘧啶）.....71
◎诺氟沙量.....73
◎小檗碱.....75
◎氧氟沙星.....76
◎阿糖腺苷.....77
◎阿昔洛韦.....79
◎鬼臼毒素.....81
◎利巴韦林.....81
◎二硫化硒.....83
◎氟胞嘧啶.....84
◎氟康唑.....86
◎灰黄霉素.....88
◎克霉唑.....89
◎联苯苄唑.....90
◎两性霉素 B.....91

◎咪康唑.....93
◎十一烯酸.....95
◎酮康唑.....96
◎酮康唑.....97
◎制霉素.....98
◎吡嗪酰胺.....99
◎丙硫异烟胺.....101
◎对氨基水杨酸钠.....103
◎利福喷丁.....104
◎利福平.....106
◎链霉素.....108
◎乙胺丁醇.....110
◎异烟肼.....112
◎氨苯砜.....115
◎醋氨苯砜.....117

抗生素.....119

◎氯法剂明.....119
◎多粘菌素 E.....120
◎克林霉素.....122
◎磷霉素.....124
◎去甲万古霉素.....126
◎多西环素（脱氧土霉素）.....127
◎四环素.....129
◎土霉素.....131

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎红霉素.....132
◎琥乙红霉素.....135
◎麦白霉素.....136
◎头孢氨苄.....138
◎头孢呋辛.....139
◎头孢拉啶.....141
◎头孢噻肟.....143
◎头孢他啶.....145
◎头孢唑啉.....147
◎大观霉素.....148
◎丁胺卡那霉素.....150
◎庆大霉素.....151
◎妥布霉素.....153
◎氯霉素.....155
◎阿莫西林.....158
◎阿莫西林--克拉维酸钾联合制剂.....159
◎氨苄西林.....161
◎氨苄西林--舒巴坦联合制剂.....163
◎苯唑西林.....165
◎苄星青霉素.....167
◎氯唑西林.....169
◎哌拉西林.....171
◎普鲁卡因青霉素.....172
◎青霉素.....174
◎青霉素 V.....177

抗变态反应药

其他抗过繁药及抗变态

◎倍氯米松

药剂名称：倍氯米松

别名： Beclometasone

主要成分和含量：

其每瓶含丙酸倍氯米松14mg，气雾剂，可供喷药200次，每喷次50～70μg即可。

药理和应用：

本品为外用强效糖皮质激素类药，具有抗炎、抗过敏和止痒等作用。能抑制支气管渗出物，消除支气管粘膜肿胀，解除支气管痉挛。气雾吸入后直接作用于呼吸道而发挥平喘作用。本品每日200～400μg即能有效地控制哮喘发作。一次用经可发挥平喘作用4～6小时。

用法和用量：

少数患者用后可发生声音嘶哑和口腔咽喉部念球菌感染，每次用药后漱口，不使药液残留于咽喉部可减少发病率。

不良反应和注意：

少数患者用后可发生声音嘶哑和口腔咽喉部念球菌感染，每次用药后漱口，不使药液残留于咽喉部可减少发病率。

◎酮替芬

药剂名称： **酮替芬**

别名： **甲哌噻庚酮、噻哌酮、**Ketotifen、Zaditen、Zasten

性状： **本品为一口服强效过敏介质微黄色结晶性粉末，无臭、味苦。可溶于水或乙醇。**

药理和应用：

本品为一口服强效过敏介质阻释剂，兼有强大的组胺H1受体拮抗作用，其作用强度较扑尔敏约强10倍，此外它还能拮抗5-羟色胺和过敏的慢反应物质的作用。本品对外源泉性、内源泉性和混合性哮喘有预防发作效果。临床主要用于各种类型的支气管哮喘。

用法和用量： 口服：每次1mg，每日2次

不良反应和注意： 有嗜睡及乏力、胃肠道反应等。反应严重时可减量服用。

配伍禁忌：

乙醇及镇静催眠药可增强其中枢抑制作用。与口服降血糖药合用时，少数糖尿病患者可见血小板减少，故二者不宜合用。

制剂和规格： 片剂、胶囊剂：1mg/片（粒）

抗组胺药

◎阿司咪唑

药剂名称： 阿司咪唑

别名： 息斯敏、Astemizole、Hismanal

药理和应用：

本品因其难以通过血脑屏障，因此是一种没有中枢镇静和抗胆碱能作用的强效及长效的组织胺H1受体拮抗剂。临床主要用于季节性或常年性过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、荨麻疹、皮肤瘙痒及过敏性皮炎等。

用法和用量：

口服：6～12岁儿童，每日5mg,6岁以下儿童,每日0.2mg/kg,成人每日10mg,于空腹服用或进食前1小时有。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

体内过程：

本品口服吸收迅速，给药后0.5～1**小时血药浓度达峰值，肝、肺、肾脏浓度较高，肌肉、脂肪内浓度低。不易通过血脑屏障，在服药**4～8**小时内原型药物达最高组织浓度， 血药浓度呈双相下降。在肝脏代谢，主要经胆汁从粪便排泄。**

不良反应和注意： 长期服用可增加体重。超剂量服用（200mg**以上）有时会引起心律失常。**

制剂和规格： 片剂：10mg/**片。 混悬液：**0.1g/100ml

◎苯海拉明

药剂名称： 苯海拉明

别名： 苯那君、Diphenhydramine、Benadryl

性状： 其盐酸盐为白色结晶性粉末，有特臭、味苦。可溶于水、乙醇。

药理和应用：

为组胺H1拮抗剂，能对抗或减弱组胺对血管、胃肠和支气管平滑肌的作用。对中枢神经系统有较强的抑制作用。临床适用于皮肤粘膜的过敏性疾病，也可用于乘车、船引起的恶心、呕吐等。

用法和用量：

口服：每次25-50mg，每日2-3次，饭后服。肌注；每次25mg，每日1-3次。极量每次0.1g，每日0.3g。

不良反应和注意：

常见的有关晕、头痛、嗜睡、口干、恶心、乏力等不良反应，停药或减量后可自行消失。偶可引起皮疹，粒细胞减少，长期应用（6个月以上）可引起贫血，从事危险工作时不宜用。

制剂和规格： 片剂：25mg/片。注射液：20mg/1ml。

◎茶苯海明

茶苯海明

别名： 乘晕宁、Dimenhydrinate、Theohydramine,Dramamine

分子式

主要成分和含量：

性状： 为白色结晶性粉末，无臭，味苦麻。易溶于乙醇、氯仿。微溶于水、乙醚。

药理和应用： 本品为苯海拉明与氨茶碱的复盐。其主要成份苯海拉明为组胺H1受体拮抗剂。适用于皮肤粘膜变态反应性疾病。其中对荨麻疹、枯草热、过敏性鼻炎有较好的疗效。

用法和用量： 口服：用于过敏性鼻炎每次25～50mg，每日２~３次。用于预防晕动病，每次50～100mg。可在每4小时服1次，第一次可于旅行前半小时服。每日总量不可超过400mg。

体内过程：

不良反应和注意：可有嗜睡、头晕、口干、恶心等不良反应。偶可发生皮疹和粒细胞减少。也可发生光敏反应。驾驶员及高空作业者不宜使用。

配伍禁忌：本品与碘化物及苯巴比妥钠为配伍禁忌。

制剂和规格：片剂：25mg/片，50mg/片。

◎氯苯那敏

药剂名称： 氯苯那敏

别名： 扑尔敏、氯屈米通、Chlorphenamine

性状： 马来酸盐为白色结晶性粉末，无臭、味苦。易溶于水、乙醇

药理和应用：

本品抗组胺作用较强，用量少，副作用少。可用于各种皮肤、粘膜过敏病、虫咬、药物过敏等。因中

枢抑制作用弱，适用于小儿。尚可与APC配伍用于治疗感冒。

用法和用量： 口服：每次4mg，每日3次。小儿，每日0.35mg/kg，分3～4次服。

不良反应和注意： 服用后可有轻度眩晕、口干、恶心，个别小儿可有幻觉、不安。

制剂和规格： 片剂：2mg/片、4mg/片

◎氯雷他定

药剂名称： 氯雷他定

别名： Loratadine、Claritin、Clarityne

性状： 为白色结晶或结晶性粉末，熔点128～130℃。

药理和应用：

本品被称为是一种长效无中枢作用的组胺H1受体拮抗剂，有很强的抗组胺作用，不易透过血脑屏障。临床可用于季节性或全年性过敏性鼻炎、急性鼻炎和

自然性荨麻疹等。

用法和用量： **口服：每次**10mg，**每日**1**次。**

不良反应和注意：

服用后少数人可有眩晕、乏力、头痛、瘙痒、神经质、胃炎、口干、嗜睡等。老年人、孕妇和12**岁以下儿童不宜用。**

制剂和规格： **片剂：**10mg/**片**

◎马来那敏

药剂名称： **马来那敏**

别名： **扑尔敏、氯苯吡丙胺，氯苯那每、**

Chlorphenaminme Maleate、Chlorpheniramine

性状： **其马来酸盐为白色结晶性粉末，无臭，味苦。易溶于水、乙醇。**

药理和应用：

为组胺H1**受体拮抗剂。其特点是抗组胺作用较**

需要全本请访问 www.ertongbook.com