*中华医学全集*

# 国家基本药物大全

# (三)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

# 目录

**慢作用抗风湿药**.....**2**

◎环孢素.....2
◎环磷酰胺.....3
◎甲氨喋呤.....4
◎金诺芬.....5
◎雷公藤多甙.....6
◎硫唑嘌呤.....7
◎柳氮磺吡啶.....9
◎青霉胺.....10
◎双氯芬酸.....11

**抗痛风药**.....**12**

◎苯溴马隆.....12
◎别嘌醇.....13
◎丙磺舒.....15
◎秋水仙碱.....16

**解热止痛抗炎药**.....**17**

◎阿司匹林.....17
◎吡罗昔康.....19
◎布洛芬.....20
◎对乙酰氨基酚.....21

◎复方阿司匹林.....23
◎复方盐酸苯丙醇胺.....23
◎萘普生.....24
◎舒林酸.....26
◎索密痛.....27
◎吲哚美辛.....27

**镇痛药.....29**

◎安痛定.....29
◎氨酚待因.....30
◎苯噻啶.....32
◎布桂嗪.....33
◎地塞米松棕榈酸酯.....34
◎芬太尼.....35
◎吗啡.....36
◎麦角胺咖啡因.....38
◎纳洛酮.....39
◎哌替啶.....40
◎强痛定.....42
◎曲马多.....44
◎去痛片.....45
◎四氢帕马丁.....46
◎吲哚美辛.....47

**其他节育药.....51**

◎卡前列甲酯.....51

◎米非司酮.....52
◎米索前列醇.....54
◎壬苯醇醚.....54
◎天花粉蛋白.....55
◎依沙吖啶.....57

**短效避孕药.....59**

◎复方甲地孕酮.....59
◎复方炔诺酮.....60
◎复方炔诺孕酮（复方甲基炔诺孕酮）.....62
◎复方左旋炔诺孕酮.....63
◎复方左旋炔诺孕酮三相片.....64
◎炔雌醇.....65
◎炔诺酮探亲片.....66
◎左炔诺孕酮.....67

**长效避孕药.....68**

◎复方长效炔诺孕酮.....68
◎复方长效左旋炔诺孕酮.....69
◎复方庚炔诺酮.....70
◎左旋炔诺孕酮埋植剂.....71
◎复方电解质葡萄糖-M3B.....74
◎复方电解质葡萄糖-R4A.....75
◎复合磷酸氢钾.....76
◎腹膜透析液.....77
◎甘油磷酸钠.....79

◎谷氨酸钾.....80
◎谷氨酸钠.....81
◎口服补液盐.....83
◎磷酸氢钙.....84
◎硫酸锌.....85
◎氯化钾.....87
◎氯化钠注射液.....88
◎浓氯化钠注射液.....90
◎葡萄糖.....91
◎葡萄糖氯化钠注射液.....92
◎葡萄糖酸钙.....93
◎乳酸钙.....95
◎乳酸钠林格注射液.....96
◎乳酸钠葡萄糖注射液.....97

**全身麻醉药.....100**

◎地西泮.....100
◎氟烷.....100
◎硫喷妥钠.....102
◎氯胺酮.....104
◎咪达唑仑.....106
◎七氟烷.....107
◎羟丁酸钠.....108
◎氧化亚氮.....109
◎依托咪酯.....111
◎异丙酚.....112



需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎异氟烷.....114

**全身作骨骼肌松驰药.....115**

◎苯磺酸阿曲库钠铵.....115
◎氯化琥珀胆碱.....116
◎哌库溴铵.....118
◎泮库溴铵.....119
◎维库溴铵.....120
◎新斯的明.....122

**其他.....123**

◎艾司洛尔.....123
◎二氢埃托啡.....125
◎氟马西尼.....126
◎氟哌利多.....127
◎麻黄碱.....129
◎钠石灰.....131
◎乌拉地尔.....131

**局部麻醉药.....133**

◎布比卡因.....133
◎丁卡因.....134
◎利多卡因.....136
◎普鲁卡因.....137

# 解热镇痛抗风湿抗炎药

# 慢作用抗风湿药

## ◎环孢素

**药剂名称： 环孢素**

**别名：山地明、环孢毒素**A、Ciclosporin、Sandimmun、Sandoz

**性状： 是从霉菌的代谢产物中提取出一种免疫抑制剂。**

**药理和应用：**

**临床主要用于抑制器官和组织移植后的排异反应，此外也用于自身免疫性疾病的治疗，如对**I**型糖尿病、牛皮癣、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等均有肯定的疗效。**

**用法和用量：**

**口服或肌注：开始每日**5mg～10mg/kg**，维持量可**

**减至每日**3mg/kg。**胶囊剂**：0.25g/**粒。注射液**0.25g/5ml。**口服溶液：**5g/50ml。

**不良反应和注意：** **肾功能不全者慎用。**

## ◎环磷酰胺

**药剂名称：** **环磷酰胺**

**别名：** **环磷氮芥、**Cyclophos Phamide

**性状：** **为一常用的烷化剂类免疫抑制剂，其免疫作用强而持久。**

**药理和应用：**

**临床主要用为抗肿瘤药物，也可用于类风湿性关节炎的治疗。但并非首选药，仅用于常规药物无效或肾上腺皮质激素类药物减量或停药有困难的病例，且患者须无活动性感染存在者。用于类风湿性关节炎的治疗需大剂量给药。**

**用法和用量：** **每日**1mg/kg**以上，疗程应以**3～4**个月为宜。**

# ◎甲氨喋呤

**药剂名称：** 甲氨喋呤

**别名：** 氨甲叶酸、Methotrexate

**性状：** 为抗叶酸类抗代谢药物。

**药理和应用：**

临床主要用于抗肿瘤。因本品具有很强的免疫抑制作用，对体液免疫和细胞免疫均具有较强的免疫抑制作用，能抑制初次免疫反应和再次免疫反应，对迟发型过敏反应、移植物抗宿主反应、自身免疫性疾病等亦有较好抑制作用，为此本品临床可用于防治自身免疫性疾病，如类风湿性关节炎、皮肌炎、红斑狼疮，牛皮癣等。

**用法和用量：**

口服：每次2mg～5mg，分2～3次给药，7～14日为一疗程。静注：每次25mg～50mg，每周1次。

**不良反应和注意：**

用药后多饮水以加快药物经肾排泄，以预防肾脏毒性发生。肝、肾、骨髓功能不良者慎用，孕妇禁用

**制剂和规格：** 本品片剂：每片2.5mg或5mg。注射剂：每支10mg、50mg、100mg。

## ◎金诺芬

**药剂名称：** 金诺芬

**别名：** 醋硫葡金、瑞得、Auranofin、Ridaura（Tab）

**药理和应用：**

本品为含金的口服抗风湿药，疗效较金注射液低，但毒性明显减少。它有抑制IgE引起的组胺释放、减少患者的类风湿因子、恢复正常免疫球蛋白浓度的作用，本品显效较慢，适用于成年人的类风湿关节炎

**用法和用量：**

口服：每日6mg，1次或分次服，饭后服，如服用4～6个月后疗效不佳，可将每日剂量提高到9mg。若服用3个月后仍不见效，应停药。



需要全本请访问：www.ertongbook.com

**不良反应和注意：**

**本品主要可有胃肠道反应，还可有皮疹、瘙痒、口腔发炎等。少数患者在治疗早期会有轻度贫血或短时的白细胞和血小板减少。服药前和服药期间应注意血象和尿常规，发现异常应停药。有严重活动性肝炎、进行性肾病或有骨髓中毒史者及注射金化合物会引起小肠结肠炎、肺纤维化变化，表皮脱落性皮炎患者禁用。**

**制剂和规格：** **片剂、胶囊剂：**3mg/**片(粒)(含金**0.87mg)**。**

# ◎雷公藤多甙

**药剂名称：** **雷公藤多甙**

**别名：** Tripterygium Glucosides

**性状：**

**本品为卫矛科植物雷公藤根（去皮）经提取精制而成的片剂。具有较好的抗炎和抑制免疫作用，其作**

用在于能降低毛细血管通透性，抑制炎症浸润渗出，抑制或对抗各类炎症介质，试验表明本品对细胞免疫有抑制作用，对体液免疫也有抑制作用。

**药理和应用：**

临床可用于治疗类风湿性关节炎、红斑狼疮、慢性肾炎、麻风病、硬皮病、过敏性皮炎、牛皮癣及病毒性肝炎等。

**用法和用量：** 口服：每次0.5mg/kg，每日3次。

**不良反应和注意：**

服后可有恶心、厌食、白细胞及血小板减少、月经紊乱、精子减少等，停药后可恢复正常。孕妇忌用，有严重心血管疾患者及小儿慎用。

**制剂和规格：** 本品片剂，每片含雷公藤多甙10mg

## ◎硫唑嘌呤

**药剂名称：** 硫唑嘌呤

**别名：** 依木兰、Azathioprine、Imuran、AZP

**性状：** 为淡黄色轻质结晶性粉末，无臭、味微苦。易溶于衡氨溶液，几乎不溶于水。

**药理和应用：**

为抗代谢类嘌呤拮抗剂，抗肿瘤及免疫抑制药。其免疫抑制作用主要是抑制脱氧核糖核酸的合成。用于自身免疫性疾病如红斑狼疮、牛皮癣等。本品单用或与皮质激素类合用于类风湿性关节炎也有较好的疗效，用药后不仅关节痛、关节胀等症状好转，而且一些实验室检查如类风湿因子试验、IR试验、Waale-Rose反应、抗核因子和免疫球蛋白等均有所改善。

**用法和用量：**

用于类风湿性关节炎，口服：每日50mg，持续用药3～4个月，以较长期用药为宜。用于系统性红斑狼疮，常用量为每日2mg～2.5mg/kg，维持量为每日50mg。

**不良反应和注意：**

本品不良反应发生率较低，主要有恶心、呕吐、腹泻、厌食、口腔损伤、皮疹、药热、脱发等，少数可有黄疸、SGPT升高，停药或减量后可消失，并可有骨髓抑制等。肝、肾功能不良时慎用，孕妇禁用。

**制剂和规格：** 片剂：100mg/片

## ◎柳氮磺吡啶

**药剂名称：** 柳氮磺吡啶

**别名：** 水杨酰偶氮磺胺吡啶、Salfasalazine

**药理和应用：**

为磺胺类药。本品内服后在肠微生物作用下分解成5-氨基水杨酸和磺胺吡啶而起抗菌、消炎及免疫抑制作用，故可用于包括类风湿关节炎等的自身免疫性疾患。

**用法和用量：** 口服：每日2g～4g，分2～4次服用，并酌情增减剂量。

**不良反应和注意：**

服药期间应检查血象。肝、肾病患者慎用。本品可影响精子活力而致男性不育症应注意。

## ◎青霉胺

**药剂名称：** 青霉胺

**别名：** Penicillamine

**性状：**

本品主要用于铜、汞等的金属解毒药，因本品具有能抑制胶原纤维合成，抑制T、B淋巴细胞，分解巨球蛋白及类风湿因子等作用。

**药理和应用：**

故临床还可用于类风湿关节炎及与自身免疫有关的某些慢性疾患，如关节综合症、硬皮病、慢性活动性肝炎及特发性肺纤维化等。

**用法和用量：** 口服：每次0.5g，每日3～4次，可连服6个月以上，宜空腹服。

**不良反应和注意：**

**本品与青霉素有交叉过敏反应，用药前应作过敏试验。肾功能不全者慎用。**

**制剂和规格：** **本品制剂为糖衣片，每片含青霉胺** 0.125g。

## ◎双氯芬酸

**药剂名称：** **双氯芬酸**

**别名：** **双氯灭痛、**Diclofenac

**性状：**

**其钠盐为无色结晶性粉末，有刺鼻感与引湿性，易溶于乙醇，略溶于水，不溶于氯仿。**

**药理和应用：**

**为亚酸类强效抗炎解热镇痛药。其作用与水杨酸相似，以抑制前列腺素合成酶，其消炎、镇痛及解热作用强于乙酰水杨酸、吲哚美辛。其不良反应较少，长期应用无蓄积性。临床用于风湿性关节炎、粘连性**



需要全本请访问 www.ertongbook.com