中华医学全集

国家基本药物大全

(四)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

其他皮肤病治疗药.....2

◎氨溶液.....2
◎二氧化钛.....3
◎氟尿嘧啶.....3
◎甲氧沙林.....4
◎聚肌胞.....5
◎雷公藤多甙片.....6
◎尿囊素.....7
◎尿素.....8
◎葡萄糖酸钙.....9
◎沙利度胺.....10
◎维 A 酸.....11
◎乌洛托品.....12

抗寄生虫药.....14

◎丙体-六六六.....14
◎克罗米通.....14
◎硫代硫酸钠.....16
◎升华硫.....17

抗微生物药（抗细菌药）.....18

◎二硫化硒.....18

◎过氧苯甲酰.....19
◎灰黄霉素.....20
◎甲紫.....21
◎克霉唑.....22
◎联苯苄唑.....23
◎十一烯酸.....24
◎酮康唑.....25
◎头孢曲松.....25
◎新霉素.....26
◎依沙吖啶.....27
◎制霉素.....28

抗病毒药.....29

◎阿糖腺苷.....29
◎阿昔洛韦.....30
◎鬼臼毒素.....32
◎利巴韦林.....33

抗组胺药.....34

◎阿司咪唑.....34
◎苯海拉明.....36
◎苯海拉明.....37
◎茶苯海明.....38
◎氯苯那敏.....40
◎氯雷他定.....41
◎马来那敏.....42

◎曲吡那敏.....43
◎去氯羟嗪.....44
◎赛庚啶.....45
◎特非那定.....46
◎特非那定.....47
◎西替利嗪.....48
◎异丙嗪.....49

收敛保护剂.....51

◎炉甘石.....51

止痒药.....52

◎樟脑.....52

消洁消毒药.....53

◎硼酸.....53

皮质类固醇药.....54

◎倍氯米松.....54
◎地塞米松.....55
◎氟轻松.....55
◎哈西奈德.....57
◎甲泼尼龙.....58
◎氯倍他索.....59
◎氢化可的松.....60
◎曲安奈德.....61

角质促成剂.....62

◎地恩酚（蒽林）.....62
◎黑豆馏油.....63
◎糠馏油.....64
◎煤焦油.....65
◎鱼石脂.....65

其他眼病用药.....68

◎白内停.....68
◎地塞米松.....69
◎可的松.....70
◎硫酸锌.....70
◎氯化氨基汞.....71
◎氢化可的松.....72
◎色甘酸钠.....72
◎妥拉唑啉（妥拉苏林）.....73

抗感染用药.....74

◎度米芬.....74
◎克霉唑.....75
◎氯己啶.....76
◎溶菌酶.....76
◎氧氟沙星.....77

抗青光眼用药.....78

◎可乐定.....78

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎噻吗洛尔.....79
◎双氯非那胺.....80
◎乙酰唑胺.....81

散瞳用药.....83

◎东莨菪碱.....83
◎复方托吡卡胺.....83
◎后马托品.....84

辅助用药.....85

◎艾司洛尔.....85
◎苯丙醇.....87
◎二氢埃托啡.....88
◎氟马西尼.....89
◎复合支链氨基酸.....90
◎谷氨酸钾.....92
◎谷氨酸钠.....92
◎核糖核酸.....94
◎精氨酸.....94
◎联苯双酯.....96
◎氯己啶.....97
◎麻黄碱.....98
◎钠石灰.....100
◎葡醛内酯.....100
◎去氢胆酸.....101
◎乳果糖.....103

◎水飞蓟素.....104
◎乌拉地尔.....105
◎熊去氧胆酸.....106
◎鱼肝油酸钠.....108

中枢神经兴奋药.....111

◎胞磷胆碱.....111
◎甲氯花酯.....112

抗癫痫药.....114

◎苯妥英钠.....114
◎丙戊酸钠.....115
◎卡马西平.....117
◎扑米酮.....119

抗震颤麻痹药.....120

◎苯海索.....120
◎多巴丝肼.....121
◎金刚烷胺.....123
◎卡比多巴.....124
◎卡比多巴-左旋多巴.....125
◎溴隐亭.....127

植物神经及神经肌内接.....128

◎甲基硫酸新斯的明.....128
◎溴吡斯的明.....130
◎溴新斯的明.....131

◎依酚氯铵.....132

肝豆状核变状治疗药.....134

◎硫酸锌.....134
◎青霉胺.....135

脑血管病治疗药及降颅.....137

◎20%甘露醇.....137
◎阿米三嗪-萝巴新联合制剂.....138
◎吡拉西坦.....140
◎吡罗昔康.....141
◎二氢麦角碱.....142
◎氟桂利嗪.....143
◎甘油果糖输液.....145
◎桂利嗪.....146
◎培他司汀.....147
◎羟乙基淀粉.....149
◎噻氯匹啶.....150
◎罂粟碱.....151
◎右旋糖酐 40.....153
◎藻酸双酯钠.....154

镇痛药.....156

◎安痛定.....156
◎氨酚待因.....157
◎苯噻啶.....158

◎布桂嗪.....159
◎地塞米松棕榈酸酯.....160
◎芬太尼.....161
◎吗啡.....163
◎吗啡.....164
◎麦角胺咖啡因.....166
◎纳洛酮.....167
◎哌替啶.....168
◎强痛定.....170
◎曲马多.....172
◎去痛片.....173
◎四氢帕马丁.....174
◎四氢帕马丁.....175
◎吲哚美辛.....176

镇静催眠药.....178

◎苯巴比妥.....178
◎异戊巴比妥.....180

皮 肤 类 药

其他皮肤病治疗药

◎氨溶液

药剂名称： 氨溶液

别名： 阿莫尼亚水、Ammonium Soiltion、Aquas Ammonium

性状： 为无色透明具强烈特臭的挥发笥液体，呈强碱性反应。可以与水或乙醇任意混合。

药理和应用：

本品的稀溶液吸入或内服后，可刺激呼吸道或胃粘膜反向性地兴奋呼吸和循环中枢，在昏迷、醉酒、中枢抑制、药物中毒时作急救用，有催醒作用。局部应用有止痒、止痛及消毒防腐作用，也用于治疗昆虫螫伤。

用法和用量：催醒 :吸入用9.5-10.5%(g/ml)的稀溶液。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

昆虫螫伤：用25%**的浓溶液局部涂搽。**

制剂和规格： 虫咬水：浓氨水100ml**，薄荷脑**15g**，乙醇加至**1000ml**。**

◎二氧化钛

药剂名称： 二氧化钛

别名： 钛白粉、Titanium Dioxide

性状： 本品具有吸收紫外线作用及收敛止痒作用。

药理和应用：

共内含本品5%**的霜剂外用，涂擦可用于光敏感性皮肤病，如日光性皮炎、日光性湿疹、晒斑等。也可用于皮肤瘙痒症。**

◎氟尿嘧啶

药剂名称： 氟尿嘧啶

别名： Fluorouracil

药理和应用：

氟尿嘧啶（5-FU）为一抗嘧啶类抗代谢药，全身用药可治疗多种癌症。软膏局部涂搽，可治疗皮肤癌、癣等。

用法和用量：可用内含5-10%的软膏或霜剂，局部涂搽至出现毒性反应为止。

◎甲氧沙林

药剂名称：甲氧沙林

别名：甲氧补骨脂素、花椒毒素、肝乐仙、Methoxsalen、Methoxypsoralen、MOP

性状：为白色或淡黄色针状结晶性粉末，无臭，无味。易溶于乙醇、丙酮、氯仿，不溶于水

药理和应用：本品有增加皮肤黑色素的作用。临床用于治疗白殿风，也可用于牛皮癣。

用法和用量：

治疗白癜风：用其0.1-1%**溶液，局部涂搽。治疗**

牛皮癣，口服：每次30-50mg，2**小时后全身照黑光**15-30**分钟，照距**7-17**厘米，每次或隔日**1**次，基本治愈后，继续巩固治疗，可每周**1-2**次，最后减至**1**个月**1**次。局部涂布：**1**小时后按上法照射。**

不良反应和注意：

紫外线照射后有红肿、起水泡者应暂停使用，等恢复后再用。个别患者有头晕、头痛、恶心、皮肤瘙痒等不良反应，并可影响骨髓造血系统。

制剂和规格：片剂：100mg/**片。溶液：**0.1-1%/100ml**。**

◎聚肌胞

药剂名称：聚肌胞

别名：聚肌胞苷酸、Poly I:C

性状：为干扰素诱导剂。

药理和应用：可试用于治疗单纯疱疹、带状疱疹、扁平癣、寻常癣等有一定的治疗作用。

用法和用量：

肌注给药一次1-2mg，每周2-3次。必要时可局部注射，一日2-3次。也可局部外用涂擦，每日数次。注射给药可引起发热，如热度1-2日不退应停药。

◎雷公藤多甙片

药剂名称： 雷公藤多甙片

别名： Glucosidorum Tripterygll Totorum

药理和应用：

本品为卫柔科植物雷公藤根（去皮）经提取有效成分而压制成的片剂。为抗炎、免疫抑制剂，其抗炎作用为降低毛细血管通透性，抑制炎症浸润渗出，抑制或对抗各类炎症介质。试验表明本品对细胞免疫有抑制作用，对体液免疫也有抑制作用，并有一定的抗肿瘤、杀虫抗菌及抗生育作用。临床可用于治疗类风湿性关节炎、红斑狼疮、麻疯反应、硬皮病、过敏性皮炎、接触性皮炎、牛皮癣等，也用于病毒性肝炎及慢性肾炎等

用法和用量： 口服：每次0.5mg/kg，每日3次，饭后服。

不良反应和注意：

服后可有胃肠不适、厌食、白细胞及血小板减少、朋经紊乱、精子减少等，停药后可恢复正常。孕妇忌用，有严重心血管病患者及小儿慎用。

制剂和规格： 片剂：10mg/片。

◎尿囊素

药剂名称： 尿囊素

别名： Allantoin

性状： 本品为白色或类白色结晶性粉末。无臭、无味、可溶于热水，不溶于乙醇等有机溶媒。

药理和应用：

为咪唑类抗溃疡药，具有促进细胞增生，修复上皮组织等的作用。口服片剂用于胃炎、胃及十二指肠溃疡。外用其霜剂可用于皮肤化脓性创伤等。

◎尿素

药剂名称： 尿素

别名： Urea

主要成分和含量：

由尿素15g、甘油151ml、单硬脂酸甘油酯12g、蜂蜡2.5g，硼砂1.8g，液体石蜡40ml、凡士林5g及香精适量加水至100ml制成的尿素乳膏局部应用，能增加角质和水的结合，使皮肤软化，以防止手足皲裂疗效甚佳。

药理和应用：

局部应用，能增加角质和水的结合，使皮肤软化，以防止手足皲裂疗效甚佳。亦可用于鱼鳞病。

用法和用量：

将患处洗净擦干后，涂药并揉擦，每日数次。皲裂严重者，可用温水浸泡20分钟，用小刀削去皲裂两侧角质增厚部分，然后再涂药膏。

需要全本请访问 www.ertongbook.com