中华医学全集

国家基本药物大全

（五）

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

利尿药.....**2**

◎阿米洛利.....2
◎氨苯蝶啶.....3
◎布美他尼.....4
◎呋塞米.....7
◎螺内酯.....8
◎氢氯噻嗪.....10

前列腺素调节约.....**11**

◎非那甾胺.....11

尿路平滑机松弛药.....**12**

◎黄酮哌酯.....12
◎特拉唑嗪.....13

脱水药.....**14**

◎甘露醇.....14

其他消化类药.....**18**

◎安达美.....18
◎垂体后叶素.....19
◎东莨菪碱.....20
◎二甲硅油.....21

◎复合氨基酸.....22
◎口服补液盐.....24
◎凝血酶.....25
◎水乐维他.....26
◎维他利匹特.....27
◎英脱利匹特.....28

止泻药.....30

◎地芬诺酯（苯乙哌啶）.....30
◎复方樟脑酊.....32
◎洛派丁胺.....32

泻药.....35

◎蓖麻油.....35
◎地芬诺酯（苯乙哌啶）.....36
◎酚酞.....37
◎复方樟脑酊.....38
◎甘油.....39
◎开塞露.....40
◎洛派丁胺.....41
◎液体石蜡.....43

肝胆疾病辅助用药.....44

◎苯丙醇.....44
◎复合支链氨基酸.....46
◎谷氨酸钾.....47

◎谷氨酸钠.....48
◎核糖核酸.....49
◎精氨酸.....50
◎联苯双酯.....51
◎葡醛内酯.....52
◎去氢胆酸.....53
◎乳果糖.....54
◎水飞蓟素.....56
◎熊去氧胆酸.....57
◎鱼肝油酸钠.....59

肠道用药.....59

◎柳氮磺胺吡啶.....59

胃肠解痉及胃动力药.....61

◎阿朴吗啡.....61
◎阿托品.....62
◎颠茄.....65
◎丁溴东莨菪碱.....66
◎多潘立酮.....68
◎甲氧氯普胺.....69
◎山莨菪碱.....71
◎溴丙胺太林.....72

酶及菌帛剂.....73

◎多酶片.....73

◎干酵母.....74
◎乳酶生.....75
◎胃蛋白酶.....76
◎胰酶.....77

下丘脑垂体激素.....80

◎垂体后叶素.....80
◎促皮质素.....81
◎促性腺激素释放激素激动剂.....83
◎加压素.....83
◎尿促性素.....85
◎绒促性素.....86
◎生长激素.....88

影响古代谢药.....89

◎骨化三醇.....89
◎降钙素.....90
◎碳酸钙.....91
◎维生素 D2.....92
◎维生素 D3.....93

甲状腺激素及抗甲状腺.....94

◎丙硫氧嘧啶.....94
◎复方碘口服溶液.....95
◎甲巯咪唑.....96
◎甲状腺片.....97

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎左旋甲状腺素.....99

肾上腺激素.....100

◎氨鲁米特.....100
◎倍氯米松.....101
◎地塞米松.....103
◎甲泼尼龙.....104
◎可的松.....105
◎泼尼松.....106
◎泼尼松龙.....107
◎氢化可的松.....108
◎去氧皮质酮.....110

肾上腺素能阻滞剂.....112

◎酚苄明.....112
◎酚妥拉明.....113

降血糖药及胰岛素.....115

◎苯乙双胍.....115
◎二甲双胍.....117
◎格列本脲.....118
◎格列吡嗪.....119
◎格列喹酮.....121
◎格列齐特.....122
◎胰岛素.....123

雄激素及同化激素.....125

◎苯丙酸诺龙.....125
◎丙酸睾酮.....126
◎十一酸睾酮.....128

烧伤药.....129

◎磺胺嘧啶锌.....129
◎磺胺嘧啶银.....130

疫苗、菌苗毒素及血.....133

◎多价精制气性坏疽抗毒素.....133
◎精制白喉抗毒素.....134
◎精制抗蝮蛇毒血清.....135
◎精制抗狂犬病血清.....136
◎精制抗炭疽血清.....137
◎精制破伤风抗毒素.....138
◎精制肉毒抗毒素.....139

疫苗类.....140

◎A 群脑膜炎球菌多糖菌苗.....140
◎冻干黄热病活疫苗.....141
◎冻干卡介苗.....142
◎冻干流行性腮腺炎活疫苗.....144
◎冻干流行性乙型脑炎活疫苗.....145
◎冻干麻疹活疫苗.....145
◎冻干人用布氏菌病活菌苗.....147
◎冻干鼠疫活菌苗.....148

◎钩端螺旋体菌苗.....149
◎脊髓灰质炎活疫苗.....151
◎流行性乙型脑炎灭活疫苗.....154
◎人用狂犬病疫苗.....156
◎森林脑炎疫苗.....157
◎伤寒副伤寒甲乙菌苗.....158
◎伤寒菌苗.....159
◎炭疽活菌苗.....160

类毒素类.....162

◎吸附百日咳菌苗、白喉、破伤风类毒素混合制剂.....162
◎乙型肝炎血源疫苗.....163
◎吸附精制白喉、破伤风二联类毒素.....164
◎吸附精制白喉类毒素.....165
◎吸附精制破伤风类毒素.....167

细胞精子类.....168

◎冻干精制人白细胞干扰素.....168
◎基因工程干扰素 A1 169
◎基因工程干扰素 A-2A.....170
◎基因工程干扰素 A-2B.....172

血液制品.....174

◎破伤风免疫球蛋白.....174
◎人胎盘丙种球蛋白.....175
◎人血丙种球蛋白.....176

◎乙型肝炎免疫球蛋白.....177

沁尿系统用药

利尿药

◎阿米洛利

药剂名称： 阿米洛利

别名： 胍酰吡嗪、氨氯吡咪、Amloride、Amipramiaide

性状： 其盐酸盐为淡黄色粉末，无臭或几乎无臭。溶于水、乙醇，几乎不溶于氯仿，乙醚。

药理和应用：

为利尿剂，与氨苯蝶啶相似，作用于远曲小管、降低氢离子的分泌及钾、钠交换，本品为一减少排钾的利尿药。可增加钠、氯的排泄，减少钾的排泄而利尿。临床可用于肝硬变、心力衰竭及慢性肾炎等引起的水肿。

用法和用量： 口服：每次5mg～10mg，每日2次。

体内过程：

需要全本请访问 www.ertongbook.com

本品在胃肠道吸收不完全，口服3～4小时血药浓度可达峰值，在尿中以原形物排出，少量从胆汁排出，半衰期约为6小时，口服后2小时起效，作用约24小时。

不良反应和注意：

服后可有胃肠道反应及感觉异常，渴感、头晕、皮疹、乏力、肌痛及视觉变化等，也可有直立性低血压、血尿氮浓度升高等。

制剂和规格： 片剂：5mg/片。

◎氨苯蝶啶

药剂名称： 氨苯蝶啶

别名： 三氨蝶啶、Triamterene、Dyrenium、Urocaudol、Pterofon

性状：

本品为黄色结晶性粉末，无臭或几乎无臭、无味，不溶于水、乙醇、氯仿或乙醚，极微溶于冰醋酸。

药理和应用：

本品作用部位、药理和应用与螺内酯相同。但本品不是醛固酮拮抗剂。与其它利尿药合用时，能显著提高各自的利尿作用并能减轻不良反应。本品服后1小时即产生利尿作用，4～6小时达高峰，药效可持续12～16小时。用于治疗心力衰竭、肝硬化腹水、慢性肾炎和其它原因引起的顽固性水肿。服药后尿常呈淡兰色荧光。

用法和用量： 口服：每次50mg～100mg，每日3次，7天为一疗程。

不良反应和注意：

高血钾患者和严重肾功能不全、肝功能不全者禁用。服后偶有恶心、呕吐、嗜睡、腹泻、乏力、口干、皮疹等，应随时调整剂量。

制剂和规格： 片剂：50mg/片。

◎布美他尼

药剂名称： 布美他尼

别名： 丁尿胺、丁苯氧酸、Bumetanide

性状： 为白色结晶或结晶性粉末，无臭、味微苦。可溶于乙醇，微溶于氯仿，不溶于水。

药理和应用：

本品为髓袢利尿药，其作用部位、作用机制、电解质丢失和作用特点均与呋喃苯胺酸、利尿酸相似。具有高效、速效、短效和低毒的特点。临床上主要作为呋喃苯胺酸的代用品，用于各种顽固性水肿及急性肺水肿。对急慢性肾功能衰竭患者尤为适宜，这是因为本品除具有呋喃苯胺酸促进肾血流量和肾小球滤过率作用外，还由于本品在尿液中所需的摩尔浓度较呋喃苯胺酸低得多，故肾衰时，本品的利尿作用的减弱程度远低于呋喃苯胺酸。

用法和用量：

口服：每次0.5mg～1mg，每日1～3次。静注：每次0.5mg～1mg。

体内过程：

口服后30**分钟起效，**1～2**小时血药浓度达高峰，作用持续**3～6**小时；静注后约**5**分钟开始利尿，**0.5～1**小时达高峰，作用持续**2～3**小时。本品口服吸收迅速且较完全，生物利用度约**80%；Vd0.15L/kg；血浆蛋白结合率为**95%；主要经肾以原形排除，肾小管分泌在药物消除中占重要地位，**24**小时内可排出服用剂量的**65%。肾功能衰竭时本品仍能从循环中迅速移出。

不良反应和注意：

不良反应同呋喃苯胺酸。长期或大量应用本品者应定期检查电解质。肾功能不全患者使用大剂量时可能发生皮肤、粘膜及肌肉痛，大多数持续1～3小时后可自行消失。如疼痛剧烈或持续较久，应停药。少数人可有短暂的中性粒细胞降低，血小板减少；偶有恶心、呕吐、男子乳房发育、皮疹等。

制剂和规格： **片剂：**1mg/**片**,**注射液：**0.5mg/2ml

◎呋塞米

药剂名称： 呋塞米

别名： 速尿、呋喃苯膜酸、Furosemide、Lasix

性状： 为白色或类白色结晶性粉末，无臭、无味。溶于丙酮，略溶于乙醇，不溶于水。

药理和应用：

本品为强效利尿药，利尿作用强、起效快、维持时间短为其特点。主要作用于髓袢升支髓质部和皮质部，抑制Cl-、Na+主动重吸收，增加Cl-、Na+、K+的排泄而利尿。临床主要用于心、肝、肾性水肿、肝硬化腹水、机能障碍及血管障碍所引起的周围性水肿，尤其适用于急需消除水肿的紧急情况，如急性肺水肿，脑水肿及高血压危象等，本品不宜作常规利尿药使用。

用法和用量：

口服：每次20～40mg，每日2～3次。肌注或静注：

每次0～40mg，隔日1次。

不良反应和注意：

品可有恶心、腹泻、药疹、眩晕、视力模糊等不良反应。长期用药可引起低血钾症，应注意检查血中电解质浓度。孕妇、低钾血症、超量服用洋地黄、肝昏迷患者禁用。严重肾功能不全、糖尿病、痛风等患者及小儿慎用。

制剂和规格： 片剂：20mg/片。注射液：20mg/2ml

◎螺内酯

药剂名称： 螺内酯

别名： 安体舒通、螺旋内酯固醇、Spironolactone、Antisterone、ALDACTONE

性状：

为白色或类白色细微结晶性粉末，有轻微的硫醇臭、味微苦。易溶于氯仿、苯，溶于乙醇，不溶于水。

药理和应用：

需要全本请访问 www.ertongbook.com