中华医学全集

国家基本药物大全

(六)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

催眠药.....**2**

◎苯巴比妥.....2
◎异戊巴比妥.....3
◎异戊巴比妥.....5

其他药.....**6**

◎白内停.....6
◎地塞米松.....7
◎可的松.....8
◎硫酸锌.....9
◎氯化氨基汞.....9
◎氢化可的松.....10
◎色甘酸钠.....11
◎妥拉唑啉（妥拉苏林）.....11

抗情感障碍药.....**13**

◎阿米替林.....13
◎多塞平.....15
氯米帕明.....17
◎马普替林.....19
◎咪色林.....21
◎米帕明.....22

◎哌醋甲酯.....25
◎匹莫林.....27
◎碳酸锂.....29

抗焦虑药.....31

◎阿普唑呛.....31
◎艾司唑仑.....33
◎奥沙西泮.....35
◎地西泮.....36
◎氟西泮.....39
◎劳拉西泮.....41
◎氯硝西泮.....42
◎羟嗪.....44
◎三唑仑.....45
◎硝西泮.....47

抗精神病药.....49

◎奋乃静.....49
◎　　氟奋乃静啶.....50
◎氟奋乃静癸酸酯.....52

长效抗精神药.....53

◎氟哌啶醇.....53
◎氟哌啶醇癸酸酯.....56
◎硫利达嗪.....58
◎氯丙嗪.....59

◎氯氮平.....62
◎氯普噻吨.....63
◎氯噻吨癸酸酯.....65
◎哌泊塞嗪棕榈酸酯.....66
◎三氟拉嗪.....68
◎舒必利.....69
◎五氟利多.....71
◎氟哌啶醇癸酸酯.....73
◎氯噻吨癸酸酯.....75
◎哌泊塞嗪棕榈酸酯.....76
◎五氟利多.....77

氨基酸类.....81

◎谷胱甘肽.....81
◎精氨酸.....82
◎静脉注射复方氨基酸.....83
◎静脉注射复方氨基酸（14S）.....84
◎静脉注射复方氨基酸（15HBC）.....85
◎静脉注射复方氨基酸（17）.....87
◎静脉注射复方氨基酸（18F）.....88
◎静脉注射复方氨基酸（3H）.....89
◎静脉注射复方氨基酸（小儿输液用）.....90
◎静脉注射复方肾病用氨基酸.....92

维生素类.....93

◎复方维生素 B.....93

◎复方维生素 B.....94
◎干酵母.....94
◎骨化三醇.....95
◎甲萘氢醌.....97
◎静脉多种维生素（水乐维他）.....97
◎维生素 A.....99
◎维生素 AD.....100
◎维生素 B1.....101
◎维生素 B12.....102
◎维生素 B2.....104
◎维生素 D3.....105
◎维生素 E.....106
◎腺苷钴胺.....107
◎亚硫酸氢钠甲萘醌.....108
◎烟酰胺.....109

肠内营养制剂.....111

◎肠内营养剂（爱伦多）.....111
◎肠内营养剂（商品名：氨素）.....112
◎肠内营养剂（商品名：维多粉）.....113

脂肪乳类.....114

◎脂肪乳（长、中长链）.....114

局部治疗及其他药.....117

◎玻璃酸酶.....117

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎地芬尼多.....118
◎复方硼砂漱口片.....119
◎鱼肝油.....120
◎鱼肝油酸钠.....121

抗感染用药.....123

◎度米芬.....123
◎克霉唑.....124
◎氯己啶.....125
◎溶菌酶.....126
◎氧氟沙星.....128

抗组胺药.....129

◎阿司咪唑.....129
◎苯海拉明.....130
◎苯海拉明.....132
◎茶苯海明.....133
◎氯苯那敏.....135
◎氯雷他定.....136
◎马来那敏.....137
◎曲吡那敏.....138
◎去氯羟嗪.....140
◎赛庚啶.....141
◎特非那定.....142
◎西替利嗪.....143
◎异丙嗪.....144

消毒防腐药.....146

◎苯扎溴铵.....146
◎碘酊.....148
◎度米芬.....149
◎高锰酸钾.....150
◎过氧化氢溶液.....152
◎过氧乙酸.....153
◎含氯石灰.....155
◎甲醛溶液.....156
◎氯己定.....158
◎硼酸.....160
◎戊二醛.....161
◎依沙吖啶.....162
◎乙醇.....163

其他抗肿瘤药.....167

◎丙卡巴肼.....167
◎恩丹西酮.....170
◎干扰素.....171
◎环胞菌素 A.....172
◎卡铂.....173
◎美司钠.....174
◎米托蒽醌.....175
◎顺铂.....176
◎左旋门冬酰氨酶.....180

抗代谢药.....182

◎阿糖胞苷.....182
◎氟尿嘧啶.....184
◎甲氨蝶呤.....186
◎羟基脲.....188
◎巯嘌呤.....189
◎替加氟.....191

抗肿瘤抗生素.....193

◎阿克拉霉素 A.....193
◎阿霉素.....195
◎放线菌素 D.....197
◎平阳霉素.....198
◎柔红霉素.....200
◎丝裂霉素.....201

抗肿瘤植物药.....203

◎长春碱.....203
◎长春新碱（醛基长春碱）.....205
◎高三尖杉酯碱.....206
◎羟喜树碱.....207
◎替尼泊甙.....209
◎依托泊甙.....210

抗肿瘤激素类药.....212

◎氨鲁米特.....212

◎甲羟孕酮醋酸酯.....214
◎他莫昔芬.....215

烷化剂.....216

◎白消安.....216
◎苯丁酸氮芥.....218
◎氮芥.....220
◎甘磷酰芥.....221
◎环磷酰胺.....222
◎甲酰溶肉瘤素.....224
◎卡莫司汀.....225
◎六甲嘧胺.....226
◎洛莫司汀.....228
◎美法仑.....229
◎塞替哌.....231
◎司莫司汀.....232
◎消卡芥.....233
◎异环磷酰胺.....234

精 神 类 药

催眠药

◎苯巴比妥

药剂名称： 苯巴比妥

别名： 鲁米那、Phenobarbital、Luminal

性状：

为白色有光泽的结晶性粉末，无臭，味微苦。可溶于乙醚或乙醇，略溶于氯仿，极微溶于水。

药理和应用：

为巴比妥类长效镇静催眠药。它被认为能直接阻断脑干网状结构上行激活系统，使大脑皮层细胞产生抑制过程。具有较强的镇静、催眠、抗惊厥及抗癫痫作用。临床可用于失眠、焦虑、烦躁、高血压、甲亢、高热和破伤风及脑炎引起的惊厥等。也用于麻醉前给药。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

用法和用量：

口服：一般每次15-30mg**，每日**3**次。用于侉催眠前服**60mg**。肌注：一般每次**100-200mg**，极量每日**500mg**。（注射用是按钠盐计算）**

不良反应和注意：

可有嗜睡、头晕、乏力、皮疹、发热、关节肌肉痉痛等不良反应。久用可产生耐受笥和依赖性。多次过量连用可蓄积中毒。肝、肾、肺功能不合者慎用。严重肺功能不全及支气管哮喘患者禁用。

配伍禁忌：

注射剂不可与酸性药物配伍。本品有酶促作用，可加速洋地黄毒甙，地高辛等代谢，使其作用减弱。

制剂和规格： **片剂：**30mg/**片，**100mg/**片。注射剂：**50mg/**瓶，**100mg/**瓶（钠盐）。**

◎异戊巴比妥

药剂名称：异戊巴比妥

别名： 速可眠、速可巴比妥、Secobarbital、Sconal

性状：

为白色粉末，无臭，味苦。有吸湿性。极易溶于水，乙醇；难溶于乙醚和氯仿。水溶液不稳定，放置中渐渐分解。

药理和应用：

为短效巴比妥类催眠药，催眠作用出现快，服药后15～20分钟即入睡，持续时间亦短。临床用于不易入睡的病人。也可用于紧张、焦虑不安、过度兴奋、麻醉前和术前的镇静及脑电图检查的睡眠诱发试验。

用法和用量：

口服：镇静，每次50mg，每日3次。催眠，100～200mg，睡前服。麻醉前给药，每次200～300mg，术前1～2小时服。

体内过程：

口服15～20分钟发生作用，维持6～8小时。T1/2为19～34小时。主要在肝脏代谢，经肾脏排泄。

不良反应和注意：

连续应用易产生耐受性，应用1～2周催眠作用明显减低。久用可产生依赖性。

制剂和规格： 胶囊剂：100mg/粒。

◎异戊巴比妥

药剂名称： 异戊巴比妥

别名： 阿米妥、Amobarbital

性状： 为白色结晶性粉末，无臭，味苦。易溶于乙醇或乙醚，可溶于氯仿。极微溶于水。

药理和应用：

巴比妥类中效催眠药。有着较好的镇静催眠、抗惊厥作用。临床可用于失眠、焦虑、烦躁及多种原因引起的惊厥等。其注射剂主要用于抗惊厥。

用法和用量： 肌注或缓慢静注：每次250mg，极量每次500mg，每日1g（均按钠盐计算）。

不良反应和注意： 久用可产生耐受性和依赖性。肝

功严重不全者禁用。

制剂和规格： **注射剂：**250mg/**瓶（钠盐）。**

其他药

◎白内停

药剂名称： **白内停**

别名： **卡他林眼药水、**Bernetinum Natricum、Catalin，Ophthalmie Solution

性状：

本品能抑制芳香氨基酸异常代谢生成的酯类物质，防止晶体内不溶性蛋白质的形成，抑制白内障病等的发展。

药理和应用：

临床适用于初期老年性白内障。也用于防止老年性白内障和糖尿病引起的白内障恶化、外伤性和先天

性白内障以及色素性视网膜炎等。

用法和用量： 取一片卡他林溶于15ml的溶剂中，滴眼：每次1～2滴，每日3～5次

不良反应和注意：

用后偶可有弥漫性表层角膜炎、眼睑缘炎、结膜充血、刺激感、瘙痒等。如出现以上症状应停止应用。

◎地塞米松

药剂名称： 地塞米松

别名： Dexamethasone

性状： 地塞米松滴眼剂，内含磷酸地塞米松0.1%，为肾上腺皮质激素类眼科用药。

药理和应用：

可用于眼部过敏性疾病及各种非化脓性炎症。因本品渗透性较强，故尤适用于虹膜、睫状体等炎症。

不良反应和注意：

如用于感染性炎症，必须与抗菌药合用。不可长

期使用，因可致青光眼和白内障。

◎可的松

药剂名称： 可的松

别名： Cortisone

性状：

可的松滴眼剂，为每ml内含醋酸可的松5mg，吐温-80 0.8mg，硼酸20mg，硝酸苯汞0.02mg，羟甲基纤维素钠2mg的澄明水溶液。其眼膏为每g内含醋酸可的松2.5mg～10mg的膏剂。

药理和应用：

可的松局部用于眼科具有抑制炎性反应，组织敏感及上皮生长等作用。临床可用于角膜炎、巩膜炎、虹膜炎、疮疹性眼炎，交感性眼炎及白内障术后等。

不良反应和注意： 树枝状角膜炎患者慎用。

需要全本请访问 www.ertongbook.com