

最新中医药管理规范实务全书

国家基本药物生产标准 (四)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:
吉林摄影出版社, 2005.1
ISBN 7-80606-771-X
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家基本药物生产标准(四)

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

目 录

抗组胺药.....	1
◎阿司咪唑.....	1
◎苯海拉明.....	2
◎苯海拉明.....	3
◎茶苯海明.....	4
◎氯苯那敏.....	6
◎氯雷他定.....	6
◎马来那敏.....	8
◎曲吡那敏.....	9
◎去氯羟嗪.....	10
◎赛庚啶.....	11
◎特非那定.....	12
◎特非那定.....	13
◎西替利嗪.....	14
◎异丙嗪.....	15
收敛保护剂.....	16
◎炉甘石.....	16
止痒药.....	17

◎樟脑.....	17
消洁消毒药.....	17
◎硼酸.....	17
皮质类固醇药.....	18
◎倍氯米松.....	18
◎地塞米松.....	19
◎氟轻松.....	20
◎哈西奈德.....	21
◎甲泼尼龙.....	22
◎氯倍他索.....	23
◎氢化可的松.....	24
◎曲安奈德.....	25
角质促成剂.....	26
◎地恩酚(蒽林).....	26
◎黑豆馏油.....	27
◎糠馏油.....	28
◎煤焦油.....	28
◎鱼石脂.....	29
其他眼病用药.....	32

◎白内停.....	32
◎地塞米松.....	33
◎可的松.....	33
◎硫酸锌.....	34
◎氯化氨基汞.....	35
◎氢化可的松.....	35
◎色甘酸钠.....	36
◎妥拉唑啉(妥拉苏林).....	36
抗感染用药.....	38
◎度米芬.....	38
◎克霉唑.....	38
◎氯己啶.....	39
◎溶菌酶.....	39
◎氧氟沙星.....	40
抗青光眼用药.....	41
◎可乐定.....	41
◎噻吗洛尔.....	42
◎双氯非那胺.....	43
◎乙酰唑胺.....	44

散瞳用药	45
○东莨菪碱	45
○复方托吡卡胺	46
○后马托品	47
辅助用药	47
○艾司洛尔	47
○苯丙醇	49
○二氢埃托啡	50
○氟马西尼	51
○复合支链氨基酸	52
○谷氨酸钾	54
○谷氨酸钠	54
○核糖核酸	55
○精氨酸	56
○联苯双酯	57
○氯己啶	58
○麻黄碱	59
○钠石灰	61
○葡醛内酯	62
○去氢胆酸	63

◎乳果糖.....	64
◎水飞蓟素.....	65
◎乌拉地尔.....	66
◎熊去氧胆酸.....	67
◎鱼肝油酸钠.....	69
中枢神经兴奋药.....	71
◎胞磷胆碱.....	71
◎甲氯花酯.....	72
抗癫痫药.....	73
◎苯妥英钠.....	73
◎丙戊酸钠.....	75
◎卡马西平.....	76
◎扑米酮.....	78
抗震颤麻痹药.....	79
◎苯海索.....	79
◎多巴丝肼.....	80
◎金刚烷胺.....	82
◎卡比多巴.....	83
◎卡比多巴-左旋多巴.....	84

○溴隐亭.....	86
植物神经及神经肌内接	87
○甲基硫酸新斯的明.....	87
○溴吡斯的明.....	88
○溴新斯的明.....	89
○依酚氯铵.....	90
肝豆状核变状治疗药	92
○硫酸锌.....	92
○青霉胺.....	93
脑血管病治疗药及降颅	95
○20%甘露醇	95
○阿米三嗪-萝巴新联合制剂	96
○吡拉西坦.....	97
○吡罗昔康.....	98
○二氢麦角碱.....	99
○氟桂利嗪.....	101
○甘油果糖输液.....	102
○桂利嗪.....	103
○培他司汀.....	105

○羟乙基淀粉.....	106
○噻氯匹啶.....	107
○罂粟碱.....	109
○右旋糖酐 40.....	110
○藻酸双酯钠.....	111
镇痛药.....	113
○安痛定.....	113
○氨酚待因.....	114
○苯噻啶.....	115
○布桂嗪.....	116
○地塞米松棕榈酸酯.....	117
○芬太尼.....	117
○吗啡.....	119
○吗啡.....	121
○麦角胺咖啡因.....	122
○纳洛酮.....	124
○哌替啶.....	125
○强痛定.....	127
○曲马多.....	128
○去痛片.....	129

◎四氢帕马丁.....	130
◎四氢帕马丁.....	131
◎吲哚美辛.....	132
镇静催眠药.....	134
◎苯巴比妥.....	134
◎异戊巴比妥.....	136
泌尿系统用药.....	137
利尿药.....	137
◎阿米洛利.....	137
◎氨苯蝶啶.....	138
◎布美他尼.....	139
◎呋塞米.....	141
◎螺内酯.....	143
◎氢氯噻嗪.....	144
前列腺素调节约.....	146
◎非那甞胺.....	146
尿路平滑肌松弛药.....	146
◎黄酮哌酯.....	146

◎特拉唑嗪.....	147
脱水药.....	149
◎甘露醇.....	149
消化类药.....	150
其他消化类药.....	150
◎安达美.....	150
◎垂体后叶素.....	151
◎东莨菪碱.....	152
◎二甲硅油.....	153
◎复合氨基酸.....	154
◎口服补液盐.....	156
◎凝血酶.....	156
◎水乐维他.....	158
◎维他利匹特.....	159
◎英脱利匹特.....	160
止泻药.....	162
◎地芬诺酯(苯乙哌啶).....	162
◎复方樟脑酊.....	163
◎洛派丁胺.....	164

泻药.....	166
○蓖麻油.....	166
○地芬诺酯(苯乙哌啶).....	167
○酚酞.....	168
○复方樟脑酊.....	169
○甘油.....	170
○开塞露.....	171
○洛派丁胺.....	172
○液体石蜡.....	174
肝胆疾病辅助用药	175
○苯丙醇.....	175
○复合支链氨基酸.....	176
○谷氨酸钾.....	177
○谷氨酸钠.....	178
○核糖核酸.....	179
○精氨酸.....	180
○联苯双酯.....	181
○葡醛内酯.....	182
○去氢胆酸.....	183
○乳果糖.....	184

◎水飞蓟素.....	185
◎熊去氧胆酸.....	186
◎鱼肝油酸钠.....	188
肠道用药.....	189
◎柳氮磺胺吡啶.....	189
胃肠解痉及胃动力药.....	190
◎阿朴吗啡.....	190
◎阿托品.....	191
◎颠茄.....	194
◎丁溴东莨菪碱.....	195
◎多潘立酮.....	196

抗组胺药

◎阿司咪唑

药剂名称：阿司咪唑

别名：息斯敏、Astemizole、Hismanal

药理和应用：

本品因其难以通过血脑屏障，因此是一种没有中枢镇静和抗胆碱能作用的强效及长效的组织胺H₁受体拮抗剂。临床主要用于季节性或常年性过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、荨麻疹、皮肤瘙痒及过敏性皮炎等。

用法和用量：

口服：6~12岁儿童，每日5mg,6岁以下儿童,每日0.2mg/kg,成人每日10mg,于空腹服用或进食前1小时有。

体内过程：

本品口服吸收迅速，给药后0.5~1小时血药浓度达峰值，肝、肺、肾脏浓度较高，肌肉、脂肪内浓度

低。不易通过血脑屏障，在服药4~8小时内原型药物达最高组织浓度，血药浓度呈双相下降。在肝脏代谢，主要经胆汁从粪便排泄。

不良反应和注意：长期服用可增加体重。超剂量服用(200mg以上)有时会引起心律失常。

制剂和规格：片剂：10mg/片。混悬液：0.1g/100ml

◎ 苯海拉明

药剂名称：苯海拉明

别名：苯那君、Diphenhydramine、Benadryl

性状：其盐酸盐为白色结晶性粉末，有特臭、味苦。可溶于水、乙醇。

药理和应用：

为组胺H₁拮抗剂，能对抗或减弱组胺对血管、胃肠和支气管平滑肌的作用。对中枢神经系统有较强的抑制作用。临床适用于皮肤粘膜的过敏性疾病，也可用于乘车、船引起的恶心、呕吐等。

用法和用量：

口服：每次25-50mg，每日2-3次，饭后服。肌注：每次25mg，每日1-3次。极量每次0.1g，每日0.3g。

不良反应和注意：

常见的有关晕、头痛、嗜睡、口干、恶心、乏力等不良反应，停药或减量后可自行消失。偶可引起皮疹，粒细胞减少，长期应用(6个月以上)可引起贫血，从事危险工作时不宜用。

制剂和规格：片剂：25mg/片。注射液：20mg/1ml。

◎ 苯海拉明

药剂名称：苯海拉明

别名：苯那君、Diphenhydramine、Benadryl

性状：盐酸盐为白色结晶性粉末，有特殊臭、味苦，可溶于水或乙醇。

药理和应用：

为H1受体拮抗剂，本品能对抗或减弱组胺对血管、胃肠和支气管平滑肌作用，对中枢神经系统有较强的抑制作用。临床适用于皮肤粘膜的过敏性疾病，

此外对乘车、船引起的恶心、呕吐有一定防止作用。其乳膏外用治虫咬、神经性皮炎、瘙痒症等。

用法和用量：

口服：每次25ml，每日3~4次，饭后服。肌注：每次20ml，每日1~2次，极量每次0.1g，每日0.3g

不良反应和注意：

用后有头晕、头痛、嗜睡、口干、恶心、倦乏等不良的反应，偶可引起皮疹、粒细胞减少，长期应用(6个月以上)可引发贫血。

制剂和规格：片剂：25mg/片、50mg/片。注射液：20mg/1ml。20g/支。

◎茶苯海明

药剂名称：茶苯海明

别名：乘晕宁、Dimenhydrinate、Theohydramine、Dramamine

性状：为白色结晶性粉末，无臭，味苦麻。易溶于乙醇、氯仿。微溶于水、乙醚。