国家基准药物实用手册（三）

闫新 编著

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　　录

解热止痛抗炎药 1
阿司匹林 1
吡罗昔康 2
布洛芬 2
对乙酰氨基酚 3
复方阿司匹林 4
复方盐酸苯丙醇胺 4
萘普生 5
舒林酸 6
索密痛 7
吲哚美辛 7
镇痛药 8
安痛定 8
氨酚待因 9
苯噻啶 10
布桂嗪 10
地塞米松棕榈酸酯 11
芬太尼 12
吗啡 13
麦角胺咖啡因 14
纳洛酮 14
哌替啶 15
强痛定 16
曲马多 17
去痛片 18
四氢帕马丁 19

吲哚美辛 19
计划生育类药 21
卡前列甲酯 21
米非司酮 22
米索前列醇 22
壬苯醇醚 23
天花粉蛋白 24
依沙吖啶 25
短效避孕药 26
复方甲地孕酮 26
复方炔诺酮 26
复方炔诺孕酮（复方甲基炔诺孕酮） 27
复方左旋炔诺孕酮 28
复方左旋炔诺孕酮三相片 29
炔雌醇 29
炔诺酮探亲片 30
左炔诺孕酮 31
长效避孕药 31
复方长效炔诺孕酮 31
复方长效左旋炔诺孕酮 32
复方庚炔诺酮 32
左旋炔诺孕酮埋植剂 33
调节水盐、电解质及酸碱药物 34
复方电解质葡萄糖-M3B 34
复方电解质葡萄糖-R4A 35
复合磷酸氢钾 36
腹膜透析液 36
甘油磷酸钠 37

谷氨酸钾 38
谷氨酸钠 39
口服补液盐 40
磷酸氢钙 41
硫酸锌 41
氯化钾 42
氯化钠注射液 43
浓氯化钠注射液 44
葡萄糖 45
葡萄糖氯化钠注射液 45
葡萄糖酸钙 46
乳酸钙 47
乳酸钠林格注射液 48
乳酸钠葡萄糖注射液 49
全身麻醉药 50
地西泮 50
氟烷 50
硫喷妥钠 51
氯胺酮 52
咪达唑仑 54
七氟烷 54
羟丁酸钠 55
氧化亚氮 56
依托咪酯 57
异丙酚 58
异氟烷 59
全身作骨骼肌松驰药 59
苯磺酸阿曲库钠铵 59

氯化琥珀胆碱 60
哌库溴铵 61
泮库溴铵 62
维库溴铵 63
新斯的明 64
艾司洛尔 64
二氢埃托啡 65
氟马西尼 66
氟哌利多 67
麻黄碱 68
钠石灰 69
乌拉地尔 69
局部麻醉药 70
布比卡因 70
丁卡因 71
利多卡因 72
普鲁卡因 73
皮肤病治疗药 74
氨溶液 74
二氧化钛 75
氟尿嘧啶 75
甲氧沙林 75
聚肌胞 76
雷公藤多甙片 77
尿囊素 77
尿素 78
葡萄糖酸钙 78
沙利度胺 79

需要全本请访问 www.ertongbook.com

维 A 酸 80
乌洛托品 81
抗寄生虫药 81
丙体-六六六 81
克罗米通 82
硫代硫酸钠 83
升华硫 83
抗微生物药（抗细菌药） 84
二硫化硒 84
过氧苯甲酰 85
灰黄霉素 85
甲紫 86
克霉唑 87
联苯苄唑 87
十一烯酸 88
酮康唑 88
头孢曲松 89
新霉素 89
依沙吖啶 90
制霉素 90
抗病毒药 91
阿糖腺苷 91
阿昔洛韦 92
鬼臼毒素 93
利巴韦林 93
抗组胺药 94
阿司咪唑 94
苯海拉明 95

苯海拉明 96
茶苯海明 97
氯苯那敏 98
氯雷他定 98
马来那敏 99
曲吡那敏 99
去氯羟嗪 100
赛庚啶 101
特非那定 101
特非那定 102
西替利嗪 103
异丙嗪 103
收敛保护剂 104
炉甘石 104
止痒药 105
樟脑 105
消洁消毒药 105
硼酸 105
皮质类固醇药 106
倍氯米松 106
地塞米松 107
氟轻松 107
哈西奈德 108
甲泼尼龙 109
氯倍他索 109
氢化可的松 110
曲安奈德 110
角质促成剂 111

地恩酚（蒽林）..... 111
黑豆馏油..... 112
糠馏油..... 112
煤焦油..... 113
鱼石脂..... 113
眼科类药..... 114
白内停..... 114
地塞米松..... 115
可的松..... 115
硫酸锌..... 116
氯化氨基汞..... 116
氢化可的松..... 117
色甘酸钠..... 117
妥拉唑啉（妥拉苏林）..... 117
抗感染用药..... 118
度米芬..... 118
克霉唑..... 119
氯己啶..... 119
溶菌酶..... 120
氧氟沙星..... 120
抗青光眼用药..... 121
可乐定..... 121
噻吗洛尔..... 121
双氯非那胺..... 122
乙酰唑胺..... 123
散瞳用药..... 124
东莨菪碱..... 124
复方托吡卡胺..... 124

后马托品 125
辅助用药 125
艾司洛尔 125
苯丙醇 126
二氢埃托啡 127
氟马西尼 128
复合支链氨基酸 129
谷氨酸钾 130
谷氨酸钠 130
核糖核酸 131
精氨酸 131
联苯双酯 132
氯己啶 133
麻黄碱 133
钠石灰 135
葡醛内酯 135
去氢胆酸 136
乳果糖 136
水飞蓟素 137
乌拉地尔 138
熊去氧胆酸 139
鱼肝油酸钠 140

解热止痛抗炎药

阿司匹林

药剂名称：阿司匹林

别名：乙酰水杨酸、醋柳酸、Asirin、AcetylsalicylicAcid

性状：为白色结晶性粉末，无臭、味微酸。易溶于乙醇，微溶于水。

药理和应用：

本品具有较为温和的解热镇痛作用，有较强的抗炎、抗风湿作用，并有促进尿酸排泄作用以及抗血小板聚集作用。临床用于头痛、神经痛、肌肉痛、发热、风湿热、急性风湿性关节炎及类风湿性关节炎、痛风等。现也被用于动脉血栓、预防心肌梗塞等。

用法和用量：

口服：用于解热镇痛，每次 0.3g～0.6g，每日 3 次，或需要时服。用于抗风湿，每次 0.5g～1g，每日 3～5 次，3 个月为一疗程。

体内过程：

本品口服吸收迅速，在酸性环境中促进吸收，服后 2～3 小时血药浓度达高峰，血浆蛋白结合率为 50%～90%，游离型能迅速分布全身各组织，在肝内代谢，绝大部分以结合型仅 10%的以游离型由肾脏排出。

不良反应和注意：

服后可见恶心、呕吐等，大剂量可刺激胃。胃及十二指肠溃疡患者慎用，孕妇不宜用，长期大量服用可引起急性中毒，严重时可致高热、脱水、虚脱、昏迷而危及生命

制剂和规格：片剂：0.3g/片。肠溶片：0.3g/片。

吡罗昔康

药剂名称：吡罗昔康

别名：炎痛喜康、Piroxicam、Feldeen

性状：为黄色针状结晶，无臭、无味，易溶于碱性液，微溶于乙醇，不溶于水。

药理和应用：

为抗炎镇痛药，其作用略强于吲哚美辛，有明显的镇痛、抗炎及一定消肿作用，不良反应较轻。临床主要用于治疗风湿性及类风湿性关节炎等。

用法和用量：

口服：每次 20mg，每日 1 次，饭后服，必要时可加量至每日 30mg，一疗程 1～3 个月不等。

不良反应和注意：

服后偶可有头晕、浮肿、胃部不适、腹泻或便秘、粒细胞减少、再生障碍贫血等，停药一般可消失。长期服用应注意血象及肝、肾功能，孕妇慎用。

制剂和规格：片剂、胶囊剂：20mg/片（粒）。

布洛芬

药剂名称：布洛芬

需要全本请访问 www.ertongbook.com

别名：异丁洛芬、异丁苯丙酸、拔怒风、Ibuprofen、Brufen

性状：为无色结晶固体或白色结晶性粉末。可溶于乙醇、丙酮、氯仿，几乎不溶于水。

药理和应用：

本品具有较强的解热、镇痛和抗炎作用，其作用与阿司匹林、保泰松相似，强于对乙酰氨基酚，且对血象和肾功能无明显影响。临床可用于风湿性关节炎等。

用法和用量：口服：每次 0.2g，每日 3 次，饭时服。

不良反应和注意：

服用后偶可有轻度消化不良、皮疹、胃肠道溃疡及出血、氨基转氨酶升高等。肝功不良及胃、十二指肠溃疡患者不宜用。

制剂和规格：片剂、胶囊剂：0.2g/片（粒）。

对乙酰氨基酚

药剂名称：对乙酰氨基酚

别 名：扑热息痛、醋氨酚、Paracetamol、Acetaminophen

性状：为白色或类白色结晶或结晶性粉末，无臭、味微苦。易溶于乙醇，微溶于水。

药理和应用：

本品为苯胺类解热镇痛药，为非那西丁在体内的活性代谢物。解热、镇痛作用虽较阿司匹林弱，但对胃肠刺激小，常为非那西丁代用品。临床可用于感冒发热、头痛、关节痛及神经痛等。

用法和用量：

口服：每次 0.3g～0.6g，每日 3 次。肌注：每次 0.15g～0.25g。栓剂直肠给药：每次 0.15g～0.6g。

不良反应和注意：

服用后可有恶心、呕吐、厌食等不良反应。偶可引起高铁血红蛋白血症而出现紫绀、以及皮疹等。大剂量服用有损于肝、肾。

制剂和规格：

片剂、胶囊剂：0.3g/片（粒）。糖浆剂：2.4g/100m。栓剂：l0.15g/枚。注谢剂：0.1g/2ml

复方阿司匹林

药剂名称：复方阿司匹林

别名：CompoundAspirin、A、P、C 片

性状：

为每片内含阿司匹林 0.2268g、非那西丁 0.162g（或对乙酰氨基酚 0.162g）、咖啡因 0.035g 的复方制剂。

药理和应用：临床用于解热镇痛

用法和用量：口服：每次 1～2 片，每日 3 次，或需要时服。

复方盐酸苯丙醇胺

药剂名称：复方盐酸苯丙醇胺

别名：

CompoundHydrochloridePhenylpropanolamine 、CompoundHydrochloridePhenylpropanolamine

主要成分和含量：

每片内含盐酸苯丙醇胺 50mg、扑尔敏 4mg。为红、黄、白三色球形小丸。

药理和应用：

为抗感冒药，其三色小丸具有不同的释放速度，具有缓释作用。临床可用于感冒所致的流泪、流涕、喷嚏等，并可缓解鼻粘膜充血、肿胀，从而消除鼻塞症状，对感冒早期症状疗效显著。

用法和用量：口服：每次 1 粒，每 12 小时 1 次

不良反应和注意：

可有口干、鼻干、轻度嗜睡等不良反应。如有发热者应与解热镇痛药合用。

制剂和规格：胶囊剂：10 粒/合

萘普生

药剂名称：萘普生

别名：消痛灵、Naproxen、Naprosyn

性状：为白色或微黄色结晶性粉末，无臭。可溶于乙醇、丙酮及氯仿，几乎不溶于水。

药理和应用：

本品为非甾体消炎镇痛药，系芳香乙酰衍生物。其抗炎、镇痛及解热作用强于保泰松、阿司匹林，且不良反应较低。临床可用于类风湿性关节炎、骨关节炎、痛风、痛经及运动系统如关节、肌肉及腱等的慢性变性疾病等。

用法和用量：

口服：开始每次 0.25g～0.4g，早、晚各服 1 次，维持量每日 375mg～750mg。用于止痛可每次 0.5g，必要

时经 6～8 小时再服 0.25g，日剂量不得超过 1.25g。

体内过程：

本品口服吸收迅速而完全，每次给药后 2～4 小时血药浓度达峰值。约 95%从尿中以原形或代谢物排出，其排出的速度与血浆中的消失速度一致，一般疼痛服药后 1 小时可缓解，镇痛作用可持续 7 小时以上。

不良反应和注意：

服后耐受良好，偶可有恶心、呕吐、消化不良、便秘、胃肠道出血、失眠或嗜睡、头痛、耳鸣、皮疹、视觉障碍等。对本品及对阿司匹林过敏者禁用，有消化道溃疡史者慎用。

制剂和规格：片剂、胶囊剂：0.25g/片（粒）。栓剂：0.5g/枚

舒林酸

药剂名称：舒林酸

别名：Sulindac、Clinoril

药理和应用：

为抗炎、镇痛、抗风湿药。临床可用于风湿性、类风湿性关节炎及急性痛风等。

用法和用量：口服：一日 0.15g～2g，分次服。

不良反应和注意：服后主要不良反应可有胃肠道反应，如恶心、呕吐、厌食等。

制剂和规格：片剂：每片 50mg 或 100mg。

索密痛

药剂名称：索密痛

别名：去痛片、Somedon

性状：

为每片内含氨基比林 150mg、非那西丁 150mg、咖啡因 50mg 及苯巴比妥 15mg 的复合制剂

药理和应用：

为解热、镇痛药。临床可用于发热、头痛、牙痛、痛经、神经痛、肌肉痛及关节痛等。

用法和用量：口服：每次 1 片。

不良反应和注意：

不宜长期服用，因可致粒细胞减少。并导致肾脏损害，严重时可致肾乳头坏死及尿毒症。

吲哚美辛

药剂名称：吲哚美辛

别名：消炎痛、Indometacin、Inteben、Indocin

性状：

为白色或微黄色结晶性粉末，无臭、微具收敛味。易溶于乙醇、丙醇，稍溶于乙醚，不溶于水。

药理和应用：

本品具有较强的解热、镇痛及抗炎作用，它是通过抑制体内前列腺素的合成而发挥作用的。临床主要用于类风湿性关节炎，强直性脊椎炎、骨关节等，也用于痛经、偏头痛、胆绞痛及癌症发热等。

用法和用量：口服：每次 25mg，每日 2～3 次，饭后服，必要时可每日增至 150mg

体内过程：

胃肠吸收迅速而完全，1～2 小时血药浓度达峰值，半衰期为 2.6～11.2 小时，血浆蛋白结合率为 97%，在肝、肾代谢，主要以葡萄糖醛酸结合物形式从尿中排泄，小量从粪便中排出，也可从乳汁中排出。

不良反应和注意：

本品不良反应发生率很高，常见的有胃肠道反应及头痛、眩晕、乏力、幻觉、神经错乱等。此外还有损于肝脏，影响血象及过敏反应等。孕妇、授乳妇女、儿童、消化道溃疡患者及对阿司匹林过敏者禁用。老年肾功不良、出血性疾患、癫痫及精神病患者慎用。

配伍禁忌：

本品不宜与丙磺舒合用，因可增强本品毒性反应，阿司匹林可减弱本品作用也不宜合用。

制剂和规格：片剂：胶囊剂：25mg/片（粒）。栓剂：100mg/枚

镇痛药

安痛定

药剂名称：安痛定

别名：复方氨基比林、Antondine

主要成分和含量：

需要全本请访问 www.ertongbook.com