国家基准药物实用手册（四）

闫新 编著

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　　录

中枢神经兴奋药 1
胞磷胆碱 1
甲氯花酯 2
抗癫痫药 3
苯妥英钠 3
丙戊酸钠 4
卡马西平 5
扑米酮 6
抗震颤麻痹药 7
苯海索 7
多巴丝肼 8
金刚烷胺 8
卡比多巴 9
卡比多巴-左旋多巴 10
溴隐亭 11
植物神经及神经肌内接 12
甲基硫酸新斯的明 12
溴吡斯的明 13
溴新斯的明 13
依酚氯铵 14
肝豆状核变状治疗药 15
硫酸锌 15
青霉胺 16
脑血管病治疗药及降颅 17
20%甘露醇 17
阿米三嗪-萝巴新联合制剂 18

吡拉西坦 19
吡罗昔康 20
二氢麦角碱 20
氟桂利嗪 21
甘油果糖输液 22
桂利嗪 23
培他司汀 24
羟乙基淀粉 25
噻氯匹啶 25
罂粟碱 26
右旋糖酐 40 27
藻酸双酯钠 28
镇痛药 29
安痛定 29
氨酚待因 30
苯噻啶 30
布桂嗪 31
地塞米松棕榈酸酯 32
芬太尼 32
吗啡 33
纳洛酮 34
哌替啶 35
强痛定 36
曲马多 37
去痛片 38
四氢帕马丁 38
四氢帕马丁 39
吲哚美辛 40

镇静催眠药.....41
苯巴比妥.....41
异戊巴比妥.....42
利尿药.....43
阿米洛利.....43
氨苯蝶啶.....44
布美他尼.....44
呋塞米.....46
螺内酯.....47
氢氯噻嗪.....48
前列腺素调节约.....49
非那甾胺.....49
尿路平滑机松驰药.....49
黄酮哌酯.....49
特拉唑嗪.....50
脱水药.....51
甘露醇.....51
消化类药.....52
安达美.....52
垂体后叶素.....52
东莨菪碱.....53
二甲硅油.....54
复合氨基酸.....55
口服补液盐.....56
凝血酶.....56
水乐维他.....57
维他利匹特.....58
英脱利匹特.....58

止泻药 60
地芬诺酯（苯乙哌啶） 60
复方樟脑酊 61
洛派丁胺 61
泻药 62
蓖麻油 62
地芬诺酯（苯乙哌啶） 63
酚酞 64
复方樟脑酊 65
甘油 65
开塞露 66
硫酸镁 66
洛派丁胺 67
液体石蜡 68
肝胆疾病辅助用药 69
苯丙醇 69
复合支链氨基酸 69
谷氨酸钾 70
谷氨酸钠 71
核糖核酸 72
精氨酸 72
联苯双酯 73
葡醛内酯 74
去氢胆酸 74
乳果糖 75
水飞蓟素 76
熊去氧胆酸 76
鱼肝油酸钠 78

需要全本请访问 www.ertongbook.com

肠道用药.....78
柳氮磺胺吡啶.....78
胃肠解痉及胃动力药.....79
阿朴吗啡.....79
阿托品.....80
颠茄.....81
丁溴东莨菪碱.....82
多潘立酮.....83
甲氧氯普胺.....84
山莨菪碱.....85
溴丙胺太林.....86
酶及菌帛剂.....87
多酶片.....87
干酵母.....87
乳酶生.....88
胃蛋白酶.....88
胰酶.....89
激素及内分沁类药.....90
垂体后叶素.....90
促皮质素.....91
促性腺激素释放激素激动剂.....92
加压素.....92
尿促性素.....93
绒促性素.....94
生长激素.....95
影响骨代谢药.....95
骨化三醇.....95
降钙素.....96

碳酸钙 97
维生素 D2 97
维生素 D3 98
甲状腺激素及抗甲状腺 99
丙硫氧嘧啶 99
复方碘口服溶液 100
甲巯咪唑 100
甲状腺片 101
左旋甲状腺素 102
肾上腺激素 102
氨鲁米特 102
倍氯米松 103
地塞米松 104
甲泼尼龙 105
可的松 106
泼尼松 106
泼尼松龙 107
氢化可的松 108
去氧皮质酮 109
肾上腺素能阻滞剂 110
酚苄明 110
酚妥拉明 111
降血糖药及胰岛素 112
苯乙双胍 112
二甲双胍 113
格列本脲 114
格列吡嗪 114
格列喹酮 115

格列齐特 116
胰岛素 117
雄激素及同化激素 118
苯丙酸诺龙 118
丙酸睾酮 119
十一酸睾酮 120
烧伤药 121
磺胺嘧啶锌 121
磺胺嘧啶银 121
多价精制气性坏疽抗毒素 122
精制白喉抗毒素 123
精制抗蝮蛇毒血清 123
精制抗狂犬病血清 124
精制抗炭疽血清 124
精制破伤风抗毒素 125
精制肉毒抗毒素 126
疫苗类 127
A 群脑膜炎球菌多糖菌苗 127
冻干黄热病活疫苗 127
冻干卡介苗 128
冻干流行性腮腺炎活疫苗 129
冻干流行性乙型脑炎活疫苗 130
冻干麻疹活疫苗 130
冻干人用布氏菌病活菌苗 131
冻干鼠疫活菌苗 132
钩端螺旋体菌苗 133
脊髓灰质炎活疫苗 133
流行性乙型脑炎灭活疫苗 136

人用狂犬病疫苗 137
森林脑炎疫苗 137
伤寒副伤寒甲乙菌苗 138
伤寒菌苗 139
炭疽活菌苗 140
类毒素类 140
乙型肝炎血源疫苗 141
吸附精制白喉、破伤风二联类毒素 142
吸附精制白喉类毒素 142
吸附精制破伤风类毒素 143
细胞精子类 144
冻干精制人白细胞干扰素 144
基因工程干扰素 a1 145
基因工程干扰素α-2a 145
基因工程干扰素α-2b 147

中枢神经兴奋药

胞磷胆碱

药剂名称：胞磷胆碱

别名：胞二磷胆碱、尼古林、Citicoline、Nicholin,Colite

性状：为白色粉末，无臭，有引湿性。易溶于水，几乎不溶于乙醇、丙酮、氯仿。

药理和应用：

本品为核苷衍生物，是一种能增加脑血流量，改善脑功能的中枢兴奋药，临床主要用于脑手术和颅脑外伤所引起的意识障碍以及其它中枢神经系统急性损伤引起的功能和意识障碍、震颤麻痹、耳鸣和神经性耳聋及安眠药中毒等。

用法和用量：

肌注：每日 0.1～0.3g。静注：每次 0.2～0.5g，每日 1～2 次，加入 25%葡萄糖液 20ml 中注入。静滴：每次 0.2～0.6g，每日 1 次，5～10 天为一疗程，用 5%葡萄糖液稀释后静滴。

不良反应和注意：

偶可有失眠、兴奋、面部潮红、给药时有发热感乏力等不良反应，但不影响继续用药。对严重脑干损伤与颅内出血时不宜大剂量给药，可以用小剂量多次给药法。

制剂和规格：注射液：0.1g/2ml，

0.2g/2ml,0.25g/2ml。

甲氯花酯

药剂名称：甲氯花酯

别 名：氯 酯 醒 、 遗 尿 丁 、 Meclofenoxate 、 Meclofenoxine,Meclon,Lucidril

性状：盐酸盐为白色粉末，味微苦。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于苯、氯仿。

药理和应用：

本品主要作用于大脑皮层，能促进脑细胞的代谢，增加对碳水化合物的利用，提高神经细胞的兴奋性。临床主要用于外伤性昏迷，老年性精神病、意识障碍，各种痴呆、昏迷，新生儿缺氧症，儿童遗尿症，酒精中毒及某些中枢和周围神经症状等。

用法和用量：

口服：每次 0.2g，每日 3 次，至少服 1 周。儿童每次 0.1g，每日 3 次，用于新生儿缺氧则需脐静脉注射。成人昏迷状态则需肌注。

不良反应和注意：

无明显不良反应，偶可引起兴奋和怠倦。过度兴奋和锥体外系症状患者禁用，高血压及有明显炎症者慎用。

制剂和规格：片剂：0.2g/片。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

抗癫痫药

苯妥英钠

药剂名称：苯妥英钠

别名：大仑丁、SodiumPhenytoin、Dilantin

性状：为白色粉末，无臭，味微苦。易溶于水，几乎不溶于乙醚或氯仿，在空气中易潮解。

药理和应用：

本品为乙内酰脲类抗癫痫大发作和抗精神运动性发作药。对大脑皮层运动区有高度选择性的抑制作用。防止了异常放电的传播、而奏抗癫痫作用。因本品对癫痫小发作无效。故临床主要用于大发作和精神运动发作。本品无催眠作用，对正常活动也无影响。又本品在脑组织中达有效浓度较慢，故出现疗效也慢。一般需连服数日后才开始出现疗效，而被用于维持和预防癫痫发作。本品也可用于抗高血压，心律失常及三叉神经痛和坐痛神经痛。

用法和用量：

口服：防止癫痫大发作和精神运动性发作，每次50-100mg，每日3次。用于三叉神经痛和坐骨神经痛每次100-200mg，每日2-3次。用于心律失常每次100-200mg，每日2-3次。用于高血压每次100mg，每日3次。

不良反应和注意：

本品不良反应较小，长期服用可有眩晕、头痛、恶

心、呕吐、厌食、皮疹等反应。偶有共济失调、白细胞减少、神经性震颤。严重时有视力障碍及精神错乱、紫癜等。再生障碍性贫血罕见。长期服用应定期检查血象。孕妇禁用。

制剂和规格：片剂：50mg/片，100mg/片。

丙戊酸钠

药剂名称：丙戊酸钠

别名：抗癫灵、二丙乙酸钠、SodiumValproate、Depakene

性状：

为白色结晶性粉末或颗粒，味微涩，有较强吸湿性。易溶于水、乙醇或甲醇，几乎不溶于丙酮。

药理和应用：

为广谱抗癫痫药。能提高大脑的兴奋阈，抑制痫性脑电的扩散，而有抗癫痫作用。临床可用于各种类型的癫痫。如大发作、小发作、局限性发作、肌阵挛、混合型癫痫等。

用法和用量：口服：每次 200-400mg，每日 2-3 次。

不良反应和注意：

可有嗜睡、厌食、恶心等不良反应。偶有血小板减少、脱发及共济失调等。肝功不良者慎用。孕妇禁用。用药期间应定期检查肝功能。

制剂和规格：片剂：200mg/片。糖浆剂：10g/200ml。

卡马西平

药剂名称：卡马西平

别名：痛惊宁、叉癫宁、酰胺咪嗪、Carbamazepine、Tegretol

性状：

为白色或几乎白色结晶性粉末，几乎无臭。易溶于氯仿，略溶于乙醇，几乎不溶于水或乙醚。

药理和应用：

为咪嗪类抗癫痫和抗三叉神经痛药。本品在抗癫痫方面对精神运动性发作最有效，对大发作、局限性发作和混合型癫痫也有效，能减轻精神异常，尤适用于伴有精神症状的癫痫。另本品除具有抗外周神经痛作用，对三叉神经痛有良效外，并具有抗利尿、抗躁狂抑郁和抗心律失常等作用。

用法和用量：口服：用于抗癫痫每次 100mg，开始时每日 2 次，以后可每日 3 次。

体内过程：

本品口服易吸收，作用迅速，血浆有效浓度为 2-12μg/ml，经肝脏代谢，胃排泄，半衰期大于 14 小时。

不良反应和注意：

常见的不良反应有头晕、嗜睡、乏力、恶心、偶见粒细胞减少，可逆性血小板减少，甚至引起再生障碍性贫血和中毒性肝炎，偶见过敏反应，甲状腺功能减退等。心、肝功能不全及孕妇、授乳妇女忌用。青光眼、心血管疾患及老年患者慎用。长期应用定期检查血象及肝、肾功能。

配伍禁忌：

大环内酯类抗生素，异烟肼，烟酰胺，西咪替丁及抗抑郁药等均可使卡巴西平血浓度升高，使之易出现毒性反应，宜避免同时使用。抗躁狂药锂盐，抗精神病药甲硫哒嗪与卡巴西平合用时，易致本品出现神经系统中毒症状。本品还可减弱抗凝血药华法林的抗凝作用。与口服避孕药合用，可发生阴道大出血及避孕失败，故合用时应特别注意。

制剂和规格：片剂：100mg/片，200mg/片。

扑米酮

药剂名称：扑米酮

别名：扑痫酮、去氧苯比妥、密苏林、Prinidone、Mysoline

性状：为白色结晶性粉末，无臭，味微苦。微溶于乙醇，几乎不溶于水、丙酮。

药理和应用：

巴比妥类抗癫痫大发作和精神运动性发作药。本品抗癫痫作用与苯巴比妥相似，但毒性反应较轻。临床用于苯巴比妥和苯妥英钠不能控制的癫痫大发作和精神运动性大发作。

用法和用量：

口服：每次量从0.05g开始，一周后逐渐增至0.25g，每日0.5-0.75g。极量每日1.5g。

不良反应和注意：

可有嗜睡、恶心、头晕、共济失调、复视等不良反应。偶有皮疹、巨幼红细胞性贫血、白细胞减少等现象。

肝，肾功能不良者禁用。不宜与苯巴比妥合用。

制剂和规格：片剂：100mg/片，250mg/片。

抗震颤麻痹药

苯海索

药剂名称：苯海索

别名：安坦、Trihexyphenidyl、Artane

性状：

其盐酸盐为白色轻质结晶性粉末，无臭，味微苦尔后有刺痛麻痹感。可溶于乙醇、氯仿，微溶于水。

药理和应用：

抗胆碱类抗震颤麻痹药。具有中枢性抗胆碱作用，可解除肌肉痉挛、僵直、运动障碍。临床用于中枢性或药物性震颤麻痹。本品对周围性抗胆碱作用较弱。

用法和用量：口服：每次 2mg，每日 5-10mg。一般每日不宜超过 10mg。

不良反应和注意：

可有口干、头晕、视物模糊、心率加快、便秘等不良反应。少数有烦躁不安、幻觉、谵妄等反应。有蓄积作用，用量应缓慢调整，停药的剂量应逐步递减。服药期间不腚从事危险工作。青光眼患者禁用。

制剂和规格：片剂：2mg/片。

多巴丝肼

药剂名称：多巴丝肼

别名：复方左旋多巴、美多巴、LevodopaBenserazide、LevodopaCompound

主要成分和含量：

为胶囊剂，每粒内含左旋多巴 100mg 或 200mg 和苄丝肼 25mg 或 50mg 的复方制剂。

药理和应用：

为抗震颤麻痹药。两种药物配伍可以减少左旋多巴用量，并可减少不良反应。适用于震颤麻痹及其综合征（脑炎后、动脉硬化性或中毒性），不包括药物引起的震颤麻痹症。

用法和用量：

口服：开始时先服低含量的每日 1 片，以后逐渐增量，每日量最多不超过 8 片，分 3-4 次服用。疗效稳定后改为高含量的片数减半。

不良反应和注意：

可有失眠、不安等不良反应。严重心血管疾患、内分泌失调、肝、肾疾病、精神病患者禁用。孕妇不宜用。

制剂和规格：胶囊剂：125mg/粒，250mg/粒。

金刚烷胺

药剂名称：金刚烷胺

别名：金刚胺、三环癸烷胺、Amantadine、AdamantaneAdamantanamine

需要全本请访问 www.ertongbook.com